

можно было ощущать въ маткѣ на томъ мѣстѣ, гдѣ его конецъ плотно укрѣпился, выше же въ полости матки это подвижное тѣло уступало дорогу головкѣ зовда.

А. Бухштабъ.

98. Hofmohl. *Vulnus lacerum mucosae vaginae ex coitu* (Medicinisch—Chirurg. Central-Blatt, 1891, № 3). Рваная рана слиз. оболочки влагалища, нанесенная при совокупленіи.

Больная, 17 лѣтъ отъ роду, поступила съ жалобами на кровотеченіе изъ влагалища, зудъ и чувство жженія въ наружныхъ половыхъ частяхъ. При наружномъ изслѣдованіи на наружныхъ частяхъ найдена масса пузырьковъ и экскоріацій (Herpes); при внутреннемъ изслѣдованіи Sims'скими зеркалами на правой боковой стѣнкѣ влагалища близъ свода найденъ большой, свѣжій кровавой сгустокъ, по удаленіи котораго открылась легко кровоточащая, ромбовидная, свѣжая разорванная рана слизистой оболочки влагалища приблизительно въ 4 cm. длины и 3 cm. ширины. Рана промыта 3% растворомъ карболовой кислоты и присыпана іодоформомъ; кровотеченіе остановилось. Слѣдующіе дни дѣлались спринцованія изъ сулемы—1:2000. Рана заросла черезъ 20 дней. Изъ анамнеза больной выяснилось, что причиной пораненія послужилъ форсированный coitus. Мужчина положилъ ее поперекъ кровати и поднялъ ея ноги себѣ на плечи и такимъ образомъ совершилъ совокупленіе, послѣ чего больная почувствовала сильную боль во влагалищѣ, и показалось кровотеченіе. Длина penis'a мужчины въ спокойномъ состояніи отъ корня равна 10 cm.

П. Садовскій.

99. В. А. Якубовскій. Острый случай *retroflexio uteri*, сопровождавшійся явленіями шока. (Труды Акушерско-Гинекологическаго Общества въ Москвѣ, 1890 г., № 4. Засѣданіе 27-го сентября 1890 г.).

Автору привелось наблюдать крайне рѣдкій случай остраго запрокидыванія назадъ матки съ очень тяжелыми сопутствующими явленіями. Больная 39 лѣтъ отъ роду, размѣры таза нормальны, menses всегда усилены, рожала 9 разъ, выкинула 1 разъ за двѣ недѣли до описываемаго случая. Больную эту авторъ знаетъ давно—послѣ выкидыша матка плохо инволютировалась, положеніе ея крайне не стойкое: то *retroversio*, то *anteflexio*. 11-го сентября 1885 года больная нагнулась за далеко стоящимъ подъ кроватью судномъ, причемъ внезапно появилась жгучая боль внизу живота, кровотеченіе и больная упала безъ чувствъ. Общее состояніе крайне тяжелое: синюха, конечности холодны, покрыты клейкимъ потомъ, пульсъ малъ и частъ, дыханіе затруднено. Возбуждающія. Изслѣдованіе показало: наружныя части покрыты свернувшейся кровью, влагалище выполнено сгустками, которыхъ къ сводамъ значительно больше. Между влагалищемъ и прямой кишкой помѣщается опухоль, выпячивающая какъ заднюю стѣнку влагалища, такъ и переднюю прямой кишки. Величина опухоли съ кулакъ, консистенція равномерно упругая, эластическая, форма грушевидная, причемъ широкая часть отстоитъ отъ входа во влагалище на $1\frac{1}{2}$ —2 сантиметра, а узкая переходитъ въ валикъ, который ведетъ въ каналъ, выполненный кровяными сгустками; отверстіе