

Широкія связки вовсе не соотвѣтствуютъ части механизма, удерживающаго въ равновѣсіи матку; роль ихъ по отношенію къ маткѣ пассивна; онѣ не имѣютъ причины тянуться за беременною маткою, т. е. растягиваться во время беременности, такъ какъ растутъ и сами соразмѣрно съ ростомъ матки: въ мышечной ткани ихъ также происходятъ процессы гипертрофіи и гиперплазіи, которые послѣ родовъ претерпѣваютъ обратное развитіе.

Изъ большаго числа произведенныхъ авторомъ операцій укороченія круглыхъ связокъ, онъ приводитъ 7 особенно доказательныхъ случаевъ, въ которыхъ операція эта, произведенная ради смѣщенія матки къзади, ничуть не препятствовала нормальному теченію послѣдующихъ родовъ и срочному родоразрѣшенію, равно какъ и смѣщеніе матки послѣ родовъ не рецидивировало.

Ф. Кюнь.

104. **С. К. Оленинъ. Случай выпаденія матки, излѣченнаго по способу Брандта.** (Проток. Тамбовск. Мед. Общ. 1891, № 1—3).

Авторъ примѣняетъ массажъ согласно приѣмамъ, описаннымъ у *Profanter'a*, *Ремизова*, *Nordstrom'a*, и наблюдавшимъ авторомъ въ клиникахъ проф. *Д. О. Отта* и *В. О. Снеирева*. Случай касается крестьянки 23 л., послѣ вторыхъ (послѣднихъ) родовъ, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> года назадъ, замѣтившей у себя выпаденіе матки, которое затѣмъ все болѣе и болѣе увеличивалось. При поступленіи въ больницу констатировано полное выпаденіе матки; матка увеличена, влагалищѣ вполне вывернуто. Вправление удается легко. Произведено поколачиваніе крестца и подниманіе матки безъ всякаго результата. Черезъ 2 дня повторено то же съ присоединеніемъ работы аддукторовъ. Матка остается на мѣстѣ цѣлый день. На слѣдующій день *неполное* выпаденіе. Сессансы повторяются черезъ 2 дня. Черезъ 7 дней послѣ начала лѣченія матка не выпадаетъ и во время хожденія. Появившіяся затѣмъ регулы протекли правильно и выпаденія не было, хотя лѣченье не примѣнялось 6 дней. Затѣмъ лѣченіе продолжалось, причемъ больная исполняла разныя тяжелыя работы. Выпаденія нѣтъ. Наступила прекрасная инволюція матки. Черезъ 3 мѣсяца возврата не послѣдовало.

Н. Какушкинъ.

105. **Л. Виноградова-Лукирская. Лѣченіе женскихъ болѣзней по способу Brandt'a.** («Медиц. Обозр.» № 24, 1890 г.).

Авторъ сообщаетъ результаты своихъ занятій у *Brandt'a*. *Brandt* при началѣ лѣченія изслѣдуетъ больныхъ въ стоячемъ положеніи, записываетъ кратко исторію болѣзни, состояніе половыхъ органовъ и назначаетъ ежедневно гимнастику подъ руководствомъ ассистентки. Лѣченіе ведетъ самъ и развѣ иногда присутствующій врачъ.

Массажъ *Brandt* дѣлитъ на слабый, средній и сильный и послѣдній никогда не примѣняетъ, думая, что онъ вызываетъ воспаленія и эксудаты. Слабый массажъ возбуждаетъ дѣятельность нервовъ, усиливаетъ кровообращеніе, улучшаетъ питаніе и потому примѣняется, гдѣ надо поднять питаніе ткани, а средній — съ гимнастикой уменьшаетъ притокъ крови къ органамъ и назначается, гдѣ нужно вызвать регрессивный метаморфозъ.