

# Р Е Ф Е Р А Т Ы.

---

1. **Guhman. A case of double uterus and vagina.** (Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1891 г. June 27). **Случай двойной матки и двойного влагалища.**

Этотъ случай двойной матки и двойного влагалища замѣчателенъ только тѣмъ, что аномалія эта авторомъ обнаружена лишь при вторыхъ родахъ пациентки, хотя онъ же самъ подавалъ акушерскую помощь и при первыхъ родахъ ея (вмѣстѣ съ другимъ акушеромъ). Мало того: авторъ сознается, что по поводу легкой флексіи шейки матки онъ уже и равьше производилъ изслѣдованіе этой пациентки какъ ручное, такъ и зеркаломъ, и все же не замѣтилъ ничего ненормальнаго. На основаніи этого авторъ полагаетъ, что подобныя аномаліи встрѣчаются гораздо чаще, чѣмъ мы думаемъ, потому что мы не всегда обнаруживаемъ ихъ.

Ф. Кюнъ.

2. **Westerschulte. Cas remarquable d'accouchement.—Formation rudimentaire d'un deuxieme foetus.—Inclusion d'un deuxieme foetus.—Foetus in foetu.** (Nouv. Arch. d'Obst. 1891 г. № 8). **Замѣчательный случай разрѣшенія foetu in foetu.**

Въ 1859 г. (? не опечатка ли?) автору пришлось принимать младенца, нормально сложеннаго за исключеніемъ слѣдующей рѣдкой аномаліи: младенецъ родился какъ-бы сидящимъ верхомъ на шарѣ. Anus отсутствуетъ; мѣшокъ, образуемый продолженіемъ кожи плода, занимаетъ ягодицы и заднія поверхности бедеръ до scrotum и спускается внизъ до середины голеней. Кожа, образующая оболочку этого мѣшка, нормальной толщины и синеваато-краснаго цвѣта, зависящаго отъ кровянисто-сывороточнаго содержимаго мѣшка и отъ обильно развитыхъ венъ. По разрѣзѣ оболочки и истеченіи сыворотки, рука натывается на плотную синеватую массу, богатую сосудами, которая по строенію своему не можетъ быть принята за что либо иное, какъ за плаценту (плацента младенца уже вышла). Масса эта была плотно прикрѣплена къ младенцу по всей ягодичной области его. Anus младенца открывался въ этотъ мѣ-