

7. G. Henricius. Ein Fall von Tetanus puerperalis. (Centr.-Bl. f. Gyn., 1891 г., № 33). Случай послѣродового столбняка.

Здоровая 25-лѣтняя женщина 17-ти лѣтъ перенесла скарлатину, годъ назадъ—инфлюэнцу, въ іюль 1890 г.—имѣла выкидышъ на 2-мъ мѣсяцѣ беременности. Послѣдніе регулы—въ октябрѣ 1890 г., 1 января 1891 г., кровотеченіе и боли. Больную изслѣдовали врачъ и акушерка. За 10 дней передъ этимъ врачъ лѣчилъ, а акушерка ухаживала за новорожденнымъ ребенкомъ, погибшимъ отъ столбняка. На 8-й день послѣ перваго изслѣдованія врачомъ и акушеркой, у больной развился столбнякъ, и она была доставлена въ клинику. Вопросъ о томъ, окончился ли выкидышъ, былъ открытъ, почему больной вводили въ клиникѣ бужи, сдѣлали выскабливаніе полости (оказалось, что яйцо уже вышло), и лѣчили столбнякъ наркотическими. Черезъ 2 дня по поступленіи въ клинику больная умерла. На вскрытіи найдено: *Oedema et Hyperaemia pulmonum. Hyperaemia cerebri et medullae oblongatae. Polypus uteri.*

Хотя случай не изслѣдованъ бактериоскопически, авторъ считаетъ его несомнѣннымъ послѣродовымъ столбнякомъ, предполагая, что больную заразила изслѣдовавшая ее акушерка, ухаживавшая, какъ уже упомянуто раньше, за умершимъ отъ столбняка ребенкомъ. (Врачъ, изслѣдовавшій больную, тоже былъ у ребенка, но не касался его, а только осматривалъ имѣвшуюся на мѣстѣ пупка язву).

А. Соловьевъ.

8. W. and Ch. Hamilton. Two cases of extra-uterine pregnancy. (N. I. Med. Journ. 1891 г. Aug. 22). Два случая внѣматочной беременности.

1) Mrs. F. 44 лѣтъ, 25 лѣтъ замужемъ; два выкидыша и 6 нормальныхъ родовъ, послѣдніе роды въ августѣ 1884 г. Аменоррея съ января 1890 г. по августъ включительно. Въ іюль въ теченіе двухъ недѣль водянистое истеченіе изъ половыхъ путей. За послѣдніе мѣсяцы груди набухли, въ августѣ же опять опали. Сильныя по временамъ боли въ животѣ прекратились вмѣстѣ съ прекращеніемъ движеній плода. Въ сентябрѣ легкая лихорадка. При изслѣдованіи констатируется въ животѣ несимметричная полуплотная опухоль. Шейка слегка увеличена, os cervicis умѣренно раскрытъ, растянутый cul-de sac, повидимому, содержитъ жидкость. 11-го ноября 1890 г. чревосѣченіе. Въ брюшную рану вставилась опухоль, изъ которой, по вскрытіи ея, извлеченъ мацерированный плодъ вѣсомъ въ  $9\frac{1}{2}$  фунтовъ съ hydro-cephalus и spina bifida. Пациентка выздоровѣвшею покинула госпиталь 7-го декабря 1890 г.

Случай этотъ авторъ относитъ къ типу graviditatis tubariae intraligamentosae.

2) Mrs. J. 30 лѣтъ; замужемъ 10 лѣтъ; 4 беременности; послѣдніе и единственно срочные роды въ 1885 г. Въ теченіе 7 лѣтъ страдала лейкорреею. За послѣднія недѣли груди набухли. Тошнота и рвота. 20 декабря 1890 г. изверженіе пленокъ, а на слѣдующій день сильное кровотеченіе. 5-го фев-