

1) въ среднемъ пуповища отпадаетъ на 6—7 день (независимо отъ пола и вѣса новорожденнаго и отъ толщины пуповины); 2) гипсъ и масло ускоряютъ отпаденіе пуповины (6. ч. на 5 день); 3) висмута-іодоформъ значительно замедляетъ отпаденіе пуповины; 4) наилучшіе результаты осмотра пупочной раны получились при способахъ автора и *Львова*, наихудшіе при гипсѣ, маслѣ и при гигроскопической ватѣ (осмотръ состоялъ въ микроскопическомъ изслѣдованіи отдѣляемаго раны на содержаніе въ немъ гноя); 5) ни одинъ способъ не далъ инфекціи. Авторъ считаетъ все способы неудовлетворительными.

Н. Какушкинъ.

34. Г. К. Теръ-Григоріанцъ. Ueber die Anwendung des Jodoformtannins bei flüssigen Exsudaten und Bortannins bei Blutungen. (Centrbl. f. Gyn., 1891, № 46). Примѣненіе іодоформнаго танина при жидкихъ эксудатахъ и борнаго танина при кровотеченияхъ.

Авторъ въ нѣсколькихъ случаяхъ убѣдился въ рассасывающемъ дѣйствіи іодоформнаго танина, примѣняемаго по способу *Fritsch'a*—въ формѣ мѣшечковъ. По быстротѣ дѣйствія это средство превосходитъ ихтиоль. Мѣшечки вкладываются въ соответствующій сводъ въ теченіи 3 дней, каждый разъ на 18—20 часовъ, съ предварительнымъ промываніемъ влагалища. Авторъ примѣнялъ это лѣченіе съ успѣхомъ при долгодѣйныхъ периметритическихъ выпотахъ и періоофоритахъ, при менструальномъ опуханіи яичниковъ, сопровождающемся болями, при свѣжихъ выпотахъ, въ 2 случаяхъ метрофлебита. При старыхъ сальпингитахъ это средство не оказало никакого дѣйствія.

Въ такомъ же видѣ примѣнялся имъ съ успѣхомъ и борный танинъ при кровотеченияхъ, гдѣ не помогали другія средства.

А. Гермоніусъ.

35. P. Giuliani. Soor der Vulva (Centrbl. f. Gyn., 1891, № 52). Молочница наружныхъ половыхъ органовъ.

24-лѣтняя женщина на 2—3 мѣсяцѣ беременности вдругъ стала ощущать жженіе и зудъ въ наружныхъ половыхъ органахъ, перешедшіе потомъ въ нестерпимую боль. При изслѣдованіи найдено припуханіе большихъ и малыхъ губъ; на темно-красной бархатистой слизистой оболочкѣ послѣднихъ замѣчается бѣловатый, въ видѣ островковъ, налетъ, который, при легкомъ удаленіи его ватой, оставляетъ по себѣ незначительные дефекты эпителия. Входъ свободенъ. Не смотря на примѣненіе 2% раствора *Zinci sulfur.* и карболовой кислоты, на слѣдующій день вся вульва и часть рукава покрыты довольно толстой оболочкой, напоминающей по виду пролитое молоко. Припухлость, повышенная t° и жженіе при мочеиспусканіи. При бактериологическомъ изслѣдованіи причины явленія, напоминавшего дифтеритъ, получены чистыя культуры грибка молочницы. Лѣченіе—свинцовыми примочками и карболовыми спринцеваніями—привели къ уменьшенію припухлости на 2-й день и къ исчезновенію грибка на 5-й. Одинъ изъ дѣтей этой женщины страдалъ за 2 мѣсяца до того молочницей полости рта.

А. Гермоніусъ.