

39. А. П. Головъ. Къ статистикѣ случаевъ самороднаго исцѣленія сложной фиброміомы матки. (Врачъ 1891 г. № 45).

Монахиня Л., 43 л., въ монастырѣ съ 14 лѣтъ. Мѣсячныя съ 15 лѣтъ, черезъ 3 недѣли по 3—4 дня, за день до кровей и во время ихъ сильныя боли: крови необильны и блѣдны. Авторъ знаетъ больную съ 1884 года; она много разъ обращалась къ нему за совѣтомъ по поводу сильныхъ болей въ животѣ, запоровъ, кровотеченій и горловыхъ болей, но изслѣдовать себя не позволяла. Авторъ могъ только замѣтить, что животъ у больной увеличенъ и что это увеличеніе прогрессировало. Наконецъ, только въ сентябрѣ 1888 года больная обратилась къ автору съ просьбою тщательно осмотрѣть ее, такъ какъ сильныя боли въ животѣ окончательно лишили ее сна, а обильныя по 5—6 дней крови истощили ее. При изслѣдованіи: матка увеличена, дно ея выше пупка, плотна, подвижна, справа болѣзненна, зѣвъ закрытъ, своды свободны, въ прямой кишкѣ каловыя массы; изслѣдованіе черезъ влагалище болѣзненно вслѣдствіе плохой податливости дѣйственной плевы. Въ концѣ ноября больная слегла въ постель, а въ концѣ декабра у нея появилась рвота желчью и схваткообразныя боли. 1-го января 1889 г. при сильныхъ боляхъ выпелъ сперва большой мясистый кусокъ, а чрезъ нѣсколько часовъ другой, меньшей величины; втеченіе слѣдующихъ 4-хъ дней вышло еще нѣсколько кусковъ, но уже гораздо меньшихъ. Выдѣленіе кусковъ сопровождалось обильнымъ кровотеченіемъ. Куски издавали страшное зловоніе. Опухоль сѣровато-бѣлаго цвѣта, мягка, поверхность неровная, бугристая, дольчатая; большой кусокъ имѣетъ размѣры 12—9—6 сент., по бокамъ его кое-гдѣ попадаются отростки въ 2—3 сент. длиною. Подъ микроскопомъ опухоль оказалась состоящей главнымъ образомъ изъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ, соединительной ткани немного, кровеносныхъ сосудовъ найти не удалось. Первые регулы пришли въ концѣ февраля, необильны, блѣдны. Авторъ видѣлъ больную въ концѣ 1889 года—она чувствуетъ себя прекрасно.

Рутковскій.

40. Я. Е. Выгодскій. Къ казуистикѣ лѣченія фиброміомъ матки по способу Apostoli. (Проток. засѣд. II. Виленскаго Мед. Общ. 1891 г. № 1).

Указавъ на то, что методъ Apostoli является далеко еще не законченнымъ ни съ теоретической, ни съ технической стороны, и что результаты лѣченія имъ неодинаковы не только въ разныхъ случаяхъ, но и у однихъ и тѣхъ же наблюдателей въ однородныхъ случаяхъ,—авторъ считаетъ необходимымъ дальнѣйшую разработку и усовершенствованіе этого эмпирическаго метода. Приведенные въ статьѣ два случая касаются элиминаціоннаго дѣйствія постоянного тока на заключенныя въ маткѣ подслизистыя міомы. 1. Больная 50 лѣтъ, 10 лѣтъ страдаетъ атиническими кровотечениями изъ матки. 7 разъ родила, послѣднато 14 лѣтъ назадъ. Довольно малокровна, истощена. Матка какъ въ 4 мѣсяца беременности, подвижна, нормальной консистенціи, въ легкой антифлексіи. Зондъ (на 12 смтм. проникаетъ) ощущаетъ въ полости матки какую-то опухоль. Лѣченіе по методу Apostoli: глиняный катодъ на животъ, прямой зондъ въ матку.