

50 МА., 6 минутъ. Втеченіе двухъ недѣль сила тока доведена до 220 МА. Перемѣнъ нѣтъ (даже усиленіе кровотоčenія). Зондъ замѣненъ угольнымъ электродомъ (hystérometre en charbon № II); 120 МА, 10 мин. Во время перваго сеанса замѣчено движеніе влагалищной части (вслѣдствіе сокращеній матки) вверхъ и внизъ по дугѣ, выпуклостью обращенной влѣво. Дня черезъ два шейка сгладилась, въ устьѣ показалась опухоль. 2-й сеансъ съ угольнымъ электродомъ (№ 5), 140 МА, 10 мин.; опухоль почти цѣликомъ выдѣлилась изъ матки и удалена экрзеромъ. 2. Больная 42 лѣтъ, много рожавшая, 5 лѣтъ больна меноррагіями, 3 года—атипическими кровотоčenіями; малокровна. На границѣ верхней и средней трети влагалища кольцеобразная стриктура влагалища, пропускающая палець. Матка соотвѣтствуетъ 3-х-мѣсячной беременности. Полость 12 снтм. Электротерапія, какъ въ предыдущемъ случаѣ 20—170 МА, 5—10 минутъ. Черезъ недѣлю зондъ замѣненъ угольнымъ электродомъ. Послѣ перваго сеанса съ послѣднимъ—шейка сглажена, изъ устья выдается сегментъ опухоли. Послѣдняя затѣмъ удалена отчасти экрзеромъ, отчасти вылуценіемъ.—Въ случаяхъ, подобныхъ описаннымъ, авторъ полагаетъ цѣлесообразнымъ на будущее время всегда, съ самаго начала, примѣнять угольный электродъ. Онъ думаетъ, что описанный способъ будетъ пригоденъ въ случаяхъ затяжнаго выкидыша и въ случаяхъ законнаго выкидыша, тѣмъ болѣе, что анодъ обладаетъ дезинфицирующими свойствами.

Н. Канукинъ.

41. С. I. Анановъ. О способахъ лѣченія заматочной кровяной опухоли. (Научныя бесѣды врачей Закавказскаго повивальнаго института. Годъ шестой. Тифлисъ. 1891. стр. 105).

Въ краткомъ историческомъ очеркѣ авторъ касается ученія о кровяной заматочной опухоли, причемъ разсматриваетъ ея этиологію, исходы и лѣченіе. Разсмотрѣвъ всѣ предлагаемые способы лѣченія, авторъ дѣлаетъ слѣдующіе выводы:

а) Haematocèle не слѣдуетъ оперировать:

1. При свѣжемъ кровоизліаніи, когда есть надежда на всасываніе.
2. При несомнѣнности всасыванія крови.
3. Когда haematocèle при каждой менструаціи увеличивается.

б) Операція показана:

1. При отсутствіи наклонности къ всасыванію втеченіе многихъ недѣль.
2. При припадкахъ, указывающихъ на ихорозное разложеніе излившейся крови.

Н. Канукинъ.

42. M. Popelin. Observation d'un cas de dégénérescence sarcomateuse des ovaires. (Bulletin de la société Belge de Gynéc. et d'obstétr. 1891 г. № 5). **Случай саркоматознаго перерожденія яичниковъ.**

Г-жа Г..., 1—рага, 40 л. Послѣдняя менструація, очень обильная и въ теченіи 15 дней, 6 мѣс. назадъ. Вскорѣ по прекращеніи регулъ замѣтила увеличеніе живота, которое постепенно достигло значительныхъ размѣровъ, при чемъ появились различныя болѣзненные симптомы: ошущеніе тяжести