

КАЗУИСТИКА.

IV.

UTERUS DUPLEX SEPARATUS S. DIDELPHYS.

Ф. Ф. Пionтковскаго

(Саранскъ, Пензенской г.).

Врожденное уродство *uterus duplex separatus* встрѣчается, по словамъ *Schröder'a*, на столько рѣдко, что его чаще находили на секціонномъ столѣ рядомъ съ такими уродствами, которыя дѣлали плодъ неспособнымъ жить и только въ послѣднее время опубликованъ рядъ случаевъ у взрослыхъ женщинъ. Въ моей шестилѣтней земской практикѣ на 87000 мужчинъ и женщинъ больныхъ всѣми вообще болѣзнями оно попадаетъ лишь второй разъ. Первый случай описать, къ сожалѣнію, не могу, потому что больная, оставленная для болѣе подробнаго изслѣдованія, ушла не записанная даже въ книгу; но оба случая на столько сходны, что невольно является мысль о полномъ тождествѣ больныхъ.

28 сентября 1891 года явилась въ пріемный покой при Саранской земской больницѣ больная № 18675, крестьянка д. Кулиновки Саранскаго уѣзда, 30 лѣтъ, русская, неграмотная, занимается земледѣліемъ и домашними работами, жалуется на боли внизу живота съ правой стороны. Въ дѣтствѣ перенесла оспу; ничѣмъ особеннымъ больна не была. Menstrua съ 16 лѣтъ, по 3 дня черезъ 27 дней. Замужемъ 10 лѣтъ; послѣ перваго coitus, по ея словамъ, не особенно сильное кровотеченіе, не

повторявшееся при слѣдующихъ. Родила 1 разъ на 9-мъ году замужества мертвого мальчика; роды трудные, трое сутокъ—обошлись безъ медицинскаго пособія; кровотеченіе во время и послѣ родовъ не сильное. Послѣ родовъ встала рано—на третій или на 4-й день, не болѣла; но уже послѣ окончанія послѣродового періода, во время мѣсячныхъ появлялись боли внизу живота; эти боли усиливались, появились и въ межменструальные промежутки и наконецъ къ нимъ присоединились и почти постоянныя бѣли.

Пациентка блондинка, средняго роста, подкожный жирный слой умѣренно развитъ, мышцы развиты удовлетворительно; костный скелетъ правильный. При выстукиваніи и выслушиваніи не найдено ничего не нормальнаго. Грудь очень малы и напоминаютъ груди только что начавшей развиваться дѣвочки лѣтъ 13—14. Волосы на лобкѣ довольно густы, длинны и въ нормальныхъ границахъ. Большія и малыя губы и клиторъ нормальны; устье уретры нормально, но кзади отъ него многочисленныя, мелкія поперечныя складки; отъ этихъ складокъ спускается кзади лоскутъ, покрытый слизистой оболочкой, на ощупь довольно плотный, толщиною около 3 mm; онъ имѣетъ видъ неравносторонняго трехугольника, достигаетъ задней стѣнки влагалища и выдается здѣсь почти на два сантим. внизъ межъ губами. Остатки дѣвственной плевы видны какъ на стѣнкахъ влагалища, такъ и на обѣихъ поверхностяхъ лоскута.

Тазъ, на сколько можно судить безъ инструментальнаго изслѣдованія, нормаленъ. Измѣреній инструментами я не производилъ, потому что крестьянки относятся къ подобнымъ измѣреніямъ очень подозрительно и боятся ихъ, и моя первая больная съ uterus duplex serar. ушла, испугавшись, что я пошелъ за инструментами.

При внутреннемъ изслѣдованіи на задней стѣнкѣ влагалища палецъ находитъ твердый рубцовый валикъ, идущій въ глубь влагалища; прямо противъ него съ передней стѣнки спускается лоскутъ, который мы видѣли уже и снаружи: сначала онъ виситъ свободно и прикасается къ задней стѣнкѣ, но въ послѣдней $\frac{1}{3}$ влагалища прирастаетъ къ ней, такъ что вагина оканчивается двумя слѣпыми мѣшками, изъ которыхъ каждый вмѣщаетъ ногтевой и почти половину слѣдующаго фаланга указательнаго пальца.

Въ лѣвомъ мѣшкѣ палецъ находитъ portio vaginalis съ круглымъ зѣвомъ; она значительно меньше нормальной и связана съ

маткой также уменьшенной и перетнутой влѣво почти подь прямымъ угломъ.

Въ правомъ мѣшкѣ тоже влагалищная часть съ разорваннымъ зѣвомъ; разрывъ идетъ по внутренней или лѣвой сторонѣ р. v.; зѣвъ пропускаетъ половину поглаваго фаланга; язва. Эта влагалищная часть связана съ другою маткой, перетнутой вправо; размѣры ея больше чѣмъ лѣвой, но значительно меньше нормальной рожавшей матки; въ обѣихъ маткахъ уменьшены главнымъ образомъ діаметры передне-задніе и боковые, тогда какъ длина ихъ близка къ нормѣ. Обѣ матки не имѣютъ никакой связи другъ съ другомъ; движенія ихъ передаются только на соотвѣтственные влагалищныя части. Надъ перегородкой ничего не прощупывается. Съ правой стороны прощупывается болѣзненный яичникъ величиною съ миндальный орѣхъ.

Menstrua пришли 13 октября и при осмотрѣ зеркаломъ оказалось, что менструируютъ обѣ матки, по видимому menstrua и начинаются и оканчиваются въ обѣихъ маткахъ въ одно и то же время. Первое изслѣдованіе при menstrua было произведено черезъ три часа по началѣ ихъ и менструировали уже обѣ матки а послѣднее, когда менструировали тоже еще обѣ матки часа за четыре до окончанія регулъ. Въ настоящемъ случаѣ мы имѣемъ такимъ образомъ двѣ матки, два влагалища и двѣ дѣвственныхъ плевы; перегородка, раздѣлявшая влагалища, никакой связи съ матками не имѣетъ, — она разрушена, на сколько теперь видимъ, во время родовъ и послужила препятствіемъ при родахъ.