

РЕФЕРАТЫ.

44. **E. Glaeser. Dermatol, kein Ersatz für Jodoform.** (Centr. f. Gynäk., 1891, № 40). **Дерматоль—не замѣна іодоформа.**

Вопросъ о значеніи дерматола, какъ перевязочнаго средства, еще не вполне выясненъ (см. статьи *Heinz'a* и *Liebrecht'a*, *O. Rosenthal'a*, *Sackur'a* въ «Berl. klin. Wochenschr.», 1891, № 24, 29, 30 и 32, и докладъ автора на послѣднемъ сѣздѣ нѣмецкаго гинекологическаго общества въ Боннѣ). Въ настоящей статьѣ, на основаніи дальнѣйшихъ наблюденій, авторъ стремится разграничить показанія къ примѣненію дерматола и іодоформа при сухихъ перевязкахъ. Въ общемъ онъ пришелъ къ тому выводу, что іодоформъ всего полезнѣе при гноящихся ранахъ, не очистившихся отъ омертвѣвающихъ частей тканей, тогда какъ дерматоль съ большимъ успѣхомъ примѣняется при хорошо гранулирующихъ, очистившихся полостныхъ ранахъ, а равно при свѣжихъ операціонныхъ ранахъ, особенно такихъ, которыя по топографическимъ условіямъ не допускаютъ наложенія *lege artis* антисептической перевязки (операции на влагалищѣ, промежности и т. п.). Заживленіе подъ присышкой толстаго слоя дерматола идетъ очень хорошо и быстро; какихъ-либо признаковъ отравленія или иныхъ побочныхъ явленій авторъ, не смотря на широкое примѣненіе дерматола, никогда не наблюдалъ.

А. Фишеръ.

45. **O. Vulpius. Ueber das Lysol und dessen Verwendbarkeit in der Chirurgie.** (Beiträge zur klin. Chirurgie. Bd. VIII, H. 1; рефератъ въ Centr. f. Gynäk., 1891, № 41). **Лизоль въ хирургіи.**

Авторъ путемъ точныхъ изслѣдованій констатировалъ, что лизоль съ точки зрѣнія умерщвленія бактерій по меньшей мѣрѣ равносильнъ карболовой кислотѣ, будучи въ то же время гораздо менѣе ядовитъ. Но его достоинства значительно умаляются тѣмъ обстоятельствомъ, что онъ дѣлаетъ крайне скользкими инструменты, руки и само поле операции, на столько, что напр. захватываніе кровотокающихъ сосудовъ торсіонными пинцетами и перевязываніе ихъ оказываются почти невозможными; въ одномъ случаѣ

ради этого пришлось прервать операцію и замѣнить лизоль другимъ дезинфицирующимъ средствомъ. Онъ совершенно пригоденъ для промываній, но не крѣпче, какъ въ 0,25—05% растворѣ, такъ какъ при большей концентрации появляется часто нестерпимое жжение. **А. Фишеръ.**

46. Ad. Pée. Ueber Ichtyol und Lysol in der Gynaekologie und Geburtshilfe (Deutsche medicin. Wochenschr. 1891, № 44). О примѣненіи ихтіола и лизола въ гинекологіи и акушерствѣ.

Авторъ, по предложенію *Martin'a*, испробовалъ дѣйствіе ихтіола въ 46 случаяхъ самыхъ разнообразныхъ формъ заболѣваній женской половой сферы.

Лѣченіе ихтіоломъ примѣнялось въ 9 случаяхъ эндометрита въ сопровожденіи съ эрозіями; въ 5—метрита; въ 11—фиксированнаго загиба матки назадъ; въ 3—остраго параметрита; въ 5—хроническаго параметрита; въ 10—заболѣванія яичниковъ, изъ которыхъ 8 сопровождались сальпингитами; въ 3—гонорреи.

Изъ всѣхъ этихъ 46 случаевъ въ 23—наблюдался еще периметритъ. Въ общемъ, примѣняя ихтіоль при мѣстныхъ заболѣваніяхъ, авторъ наблюдалъ неоспоримое болеутоляющее дѣйствіе ихтіола, особенно въ случаяхъ периметрита и гонорройнаго вагинита. Но на основное страданіе, по наблюденіямъ автора, ихтіоль оказываетъ сравнительно слабое дѣйствіе. Въ воспаленно-увеличенномъ органѣ ихтіоль подобно глицерину вызываетъ вначалѣ усиленную секрецію, но затѣмъ иногда даже послѣ 2-хъ недѣльнаго примѣненія ихтіола, старыя жалобы снова возвращаются и приходится прибѣгать къ другой болѣе радикальной терапіи.

При эрозіяхъ и гѣмorrhагическомъ эндометритѣ 50% растворъ или чистый ихтіоль, пользы не приносили и особенно при кровотеченіяхъ авторъ совѣтуетъ быть осторожнымъ съ примѣненіемъ ихтіола, такъ какъ больныя начинаютъ тогда жаловаться на обильныя и долго продолжающіяся регулы, на основаніи чего авторъ и оставилъ внутриматочное примѣненіе ихтіола.

При *retroflexio uteri fixata* въ 3-хъ случаяхъ отъ примѣненія ихтіоловыхъ тампоновъ получилась возможность констатировать освобожденіе матки отъ сращеній, причѣмъ матка заняла свое старое положеніе—впередъ, хотя авторъ и не рѣшается принисать подобный эффектъ дѣйствію ихтіола.

При сальпингитахъ, оофоритахъ особеннаго эффекта, кромѣ уменьшенія болей, авторъ не констатировалъ.

Что же касается рассасывающаго дѣйствія ихтіола при эксудатахъ, то и здѣсь авторъ не наблюдалъ удовлетворительныхъ результатовъ и дѣйствіе ихтіола ничѣмъ не превосходитъ результатовъ, получаемыхъ при примѣненіи іода и т. д. При гонорреѣ, какъ уже было сказано, боли исчезаютъ и секреція усиливается, но ростъ гонококковъ при этомъ нисколько не замедляется.

Въ концѣ концовъ авторъ считаетъ ихтіоль симптоматическимъ средствомъ, могущимъ оказать хорошія услуги только въ смыслѣ уменьшенія болей.

Въ клиникѣ *Martin'a* авторъ это средство примѣнялъ въ видѣ анпо-