

ских заболѣванійхъ придатковъ. И при міомахъ это средство можетъ быть примѣняемо, а также какъ послѣдовательное лѣченіе послѣ выскабливаній вмѣсто впрыскиванія въ полость матки іода.

Такимъ образомъ, по автору, гинекологическая терапія въ гидрастниці имѣетъ средство, которое по своему химическому строенію и физиологическому дѣйствію опредѣлено очень точно и въ соответствующихъ дозахъ, не обладая вредными побочными дѣйствіями, можетъ быть съ пользою примѣняемо при соответствующихъ заболѣваніяхъ женской половой сферы.

#### А. Брандтъ.

#### 48. О. Черномордикъ. Случай раннихъ мѣсячныхъ. (Врачъ, 1892 г., № 4).

Къ концу 1-го года жизни у дѣвочки П., дочери относительно здоровыхъ родителей, родившейся въ срокъ и ничѣмъ въ теченіе этого не болѣвшей, появился въ февралѣ 1891 года жаръ, на второй день по всему тѣлу показалась сыпь, принятая за крапивницу; на 3-й день жаръ уменьшился, но ребенокъ былъ очень непокоенъ и хватался руками за нижнюю часть живота. Къ концу этого дня изъ влагалища показалось незначительное истеченіе темной крови, которое продолжалось 5 дней и съ тѣхъ поръ каждыя 4 недѣли повторяются правильныя мѣсячныя, продолжающіяся по 4—5 дней. Во время мѣсячныхъ ребенокъ указываетъ на боли внизу живота, которыя, однако, не мѣшаютъ ему бѣгать и рѣзвиться, какъ обыкновенно.

#### А. Рутковскій.

#### 49. Г. К. Теръ-Григоріанцъ. Beiträge zur Abortbehandlung. (Centr. f. Gynäk., 1891, № 43). Къ лѣченію выкидышей.

Число наблюдавшихся выкидышей—60; изъ нихъ 8 лихорадили (38—41°) до поступленія въ пользованіе автора, при чемъ одна больная умерла черезъ 2 часа по удаленіи изъ матки разложившихся остатковъ плоднаго яйца (септической перитонитъ). Остальные 52 случая дали 3,7% заболѣваемости и 0 смертности.

Способъ дѣйствія автора заключался въ томъ, что при выкидышѣ въ первыя 6 недѣль беременности и при нормальной температурѣ онъ ограничивался назначеніемъ горячихъ душей 2—3 раза въ день и спорыны или *Wernich*овскаго эрготина; при кровотеченіи производилась тампонація (чего? матки или влагалища? *Реф.*) іодоформированною марлею. При болѣе позднихъ выкидышахъ или при повышенной температурѣ производилось удаленіе остатковъ плоднаго яйца, если зѣвъ былъ достаточно проходимъ—то пальцами, въ противномъ случаѣ—острою ложкою, послѣ предварительнаго расширенія шейки матки расширителями *Hegar*'а, или безъ такового; зеркала при этомъ не употреблялись. При нормальныхъ условіяхъ авторъ промываетъ влагалище и полость матки 3% карболовымъ растворомъ; въ сомнительныхъ-же случаяхъ (особенно при повышенной температурѣ) онъ пользуется слѣдующею жидкостью: *Hydrargyri bichlor. corrosivi* 0,1, *Ac. carbolicі* 20,0, *Ac. borici* 40,0, *Ac. salicylici* 5,0,