

части лобка, а половыя паружныя части видны только сзади; совокупленіе возможно лишь на собачій ладъ. Ростъ при наибольшемъ выпрямленіи 137 см. Окружность праваго бедра въ самой верхней трети 42 см., лѣваго въ томъ же мѣстѣ 44. Длина праваго бедра 38, а лѣваго 38¹/₂. Отъ колѣна до пятки съ обѣихъ сторонъ 36. При наибольшемъ выпрямленіи большой, приставленной къ стѣнѣ: отъ полу — до передней ости справа 70 слѣва 70¹/₂, до середины гребней справа 75, слѣва 74¹/₂, до вертлуговъ справа 67, слѣва 74¹/₂. Лѣвое колѣно стоитъ выше праваго на 3¹/₂ см. Ноги не могутъ быть разведены: разстоянія между ними при наибольшемъ разведеніи: сверху подъ полой щелью 5¹/₂ см., у колѣннаго сгиба 2¹/₂ см. Животъ отвислый, — размѣры: наибольшая окружность 84¹/₂ см., отъ лобка до пупка 29, высота дна матки подъ лобкомъ 35¹/₂; тазъ: окружность (черезъ ягодныя) 75, d. tr. 24, d. sp. и cr. по 21., conj. ect. 18, conj. diag. 8¹/₂, obl. d. 18, obl. sin. 21, d. sp. past. 7, высота крестца 10, dist. tuber. isch. 6. Пузырь цѣль, головка подвижна, надъ входомъ. Схватывающія хороши. Операция Porro. Разрѣзъ по бѣлой линіи, матка выведена наружу, разрѣзъ черезъ ея переднюю стѣнку и краевую часть послѣда, ребенокъ извлеченъ за плечи. Наложены жгуты и удаленъ послѣдъ. Полость матки прожжена 10% растворомъ карболовой кислоты; на 3¹/₂ пальца подъ жгутомъ матка отрезана и культи вшита въ брюшную рану и прижжена *Raquelin*'омъ. Живая дѣвочка нормальныхъ размѣровъ. Послѣдородовой періодъ вполне гладко.

А. Рутковскій.

55. Я. Т. Нейштабъ. *Parametritis puerperalis et influenza*. (Медицина, 1891 г. № 45).

Авторъ приводитъ случай *parametritis puerperalis*, осложненный *Influenza*, выразившейся головной болью, ознобомъ, кашлемъ и другими симптомами. Одновременное заболѣваніе другихъ членовъ семейства еще болѣе убѣдило автора въ существованіи въ данномъ случаѣ инфлюэнцы. Явленія параметрита сказывались значительнымъ инфильтратомъ въ заднемъ сводѣ, переходящимъ непосредственно въ клетчатку лѣвой тазовой области. На 6 день заболѣванія *influenza* разрѣшилась критическимъ потомъ и рѣзкимъ паденіемъ t°, но на слѣдующій день, благодаря существованію другой инфекции — пуэрперальной t° повысилась снова, оставаясь на высокихъ цифрахъ до 18 дня, послѣ чего опять появился критическій потъ съ слѣдующимъ пониженіемъ температуры и обратнымъ всасываніемъ параметригического эксудата.

Д. Рузи.

56. А. Mars. *Powiktanie potogu nadmierna bebnica skutkiem oprzniecia jelit do zatoki Douglasa* (Przegląd lekarski 1891, № 39).
Осложненіе послѣдородоваго періода чрезмѣрнымъ скопленіемъ газовъ въ кишкахъ вслѣдствіе западенія кишокъ въ Дугласово пространство.

У женщины 22 лѣтъ, послѣ нормально протекшихъ родовъ, на 3-й день нормально протекающаго послѣдородоваго періода, стало обнаруживаться быстро