

РЕФЕРАТЫ.

117. Д. П. Никольскій. О размѣрахъ женскаго башкирскаго таза. (Извѣстія Общ. Любителей Естествознанія при Московскомъ университетѣ. Дневникъ Антропологическаго Отдѣла. Вып. первый. 1891 г.).

Антропологическія измѣренія женскаго таза очень рѣдки и касаются немногихъ тазовъ и притомъ не живыхъ, а умершихъ женщинъ. Размѣры тазовъ различныхъ расъ отличаются другъ отъ друга. Особенно мало данныхъ имѣется о размѣрахъ женскаго таза у нашихъ инородцевъ. Такъ, извѣстно только измѣренія таза киргизокъ, произведенныя д-ромъ *Колбасенкомъ*. (Проток. Акуш.-гинекол. Общ. въ Кіевѣ. 1890 г. сентябрь).

Авторъ описываетъ размѣры одного женскаго башкирскаго таза, находящагося въ Екатеринбургскомъ Общ. Любителей естествознанія. Размѣры его слѣдующіе: Sp. superior—20,1 ц., Sp. inferior—16,1 ц., Sp. posterior—6,5; Sp. ischiadica—8,6; tuber ischiadic.—9,7; поперечный размѣръ входа 9,5; прямой размѣръ входа 8,8; conjugata 10,3; diameter transversus—10,4; diameter obliquus—11; cristalei—24,5. Сравнивая эти размѣры съ размѣрами, данными *Schröder*'омъ для кавказской расы, авторъ находитъ тазъ башкирокъ общесъуженнымъ и, на основаніи своей практики земскаго врача, утверждаетъ, что такіе тазы дѣйствительно встрѣчаются у башкирокъ.

Н. Какушкинъ.

118. F. Ahlfeld. Hyperemesis gravidarum, Psylismus. Hysterie (Centralb. f. Gynäkol. № 17. 1891). Рвота беременныхъ, слюнотеченіе, истерія.

Авторъ, соглашаясь отчасти съ воззрѣніемъ *Kaltenbach*'а, по которому рвота беременныхъ часто является послѣдствіемъ истеріи, приводитъ однако такіе случаи, гдѣ этой связи, повидимому, не существуетъ. Такъ изъ 5-ти наблюдавшихся имъ случаевъ тяжелыхъ заболѣваній беременныхъ, въ двухъ рвота и слюнотеченіе были осложненіемъ мѣстныхъ заболѣваній частью желудка, частью брюшины, два случая относились къ истерическимъ особамъ и, наконецъ, одинъ случай нельзя причислить ни къ той, ни къ другой