

РЕФЕРАТЫ.

137. Mesnard. *Dystocie par accidents syphilitiques du col.* (Arch. d. Toc. № 1. 1891). Неправильные роды вслѣдствіе сифилитическаго измѣненія шейки матки.

Авторъ описываетъ встрѣтившееся ему при родахъ измѣненіе губъ зѣва сифилитическаго происхожденія. По всей окружности зѣва, въ толщѣ губъ, прощупывались очень плотные узелки въ видѣ четокъ, захватывавшіе длинникъ шейки на $\frac{1}{2}$ сентм. Вслѣдствіе этихъ измѣненій зѣвъ не поддавался въ теченіе 31-го часа (первород.). Въ виду угрожающихъ явленій со стороны плода, при зѣвѣ на палець, сдѣланы 10 насѣчекъ и наложены щипцы. Въ послѣродовомъ состояніи у больной довольно серьезное пуэрперальное заболѣваніе; лѣченіе главнымъ образомъ внутриматочными спринцованіями.

Авторъ приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Сифилитическія измѣненія шейки могутъ обусловить неправильность родовъ.

2) Нѣтъ пуэрперальной септицеміи, которая не могла бы быть побѣждена быстрой, энергичной и частой антисептикой матки (?! *Ред.*).

Б. Фраткинъ.

138. M. Chaleix. *Curage digital de l'uterus dans un cas d'hémorragie grave consecutive a un avortement de trois mois* (Arch. d. Toc. № 1. 1891). Выскабливаніе пальцемъ матки въ одномъ случаѣ сильнаго кровотеченія, слѣдовавшаго за 3-хъ-мѣсячнымъ выкидышемъ.

Авторъ высказывается за дигитальное выскабливаніе матки при сильныхъ кровотеченияхъ послѣ выкидыша. Преимущества заключаются въ томъ, что пальцемъ гораздо легче опредѣляются и удаляются остатки, поддерживающіе кровотеченіе; при этомъ способѣ не требуется особаго положенія, что очень важно при сильномъ кровотеченіи и остромъ малокровіи. Кромѣ того, палець дѣйствуетъ еще раздражающимъ образомъ, вызывая сокращенія матки. Инструментальное выскабливаніе, напротивъ, не замѣнимо при вторичныхъ кровотеченияхъ или при инфекціи.

Б. Фраткинъ.