

чомъ стало постепенно подвигаться по родовому каналу, такъ что авторъ, готовый было уже прибѣгнуть къ хлороформированью, сталь надѣяться на окончаніе процесса силами природы, т. е. самоизворотомъ. И дѣйствительно, чрезъ 10 минутъ родился мертвый младенецъ.

Такой исходъ родовъ въ данномъ случаѣ произошелъ, по мнѣнію автора, только благодаря необыкновенной ширинѣ таза матери и малымъ размѣрамъ младенца. Двое предшествовавшихъ родовъ прошли нормально.

Ф. Кюнь.

72. J. Rosenthal. Ciecie Cesarskie metoda Saenger'a. (Gazeta Lekarska, 1891. № 44). Кесарское сѣченіе по Sanger'y.

Первородящая 28 лѣтъ, срочные роды продолжаютъ двое сутокъ. Въ дѣтствѣ рахитъ. Ребенокъ живъ; зѣвъ раскрытъ на величину серебрянаго рубля; пузырь цѣль, напряженъ, предлежитъ головка, вколочена во входъ; поперечный размѣръ головки совпадаетъ съ поперечнымъ размѣромъ входа въ тазъ. Размѣры таза: *Dist Spin*=24 *ctm.*; *Dist. Crist.*=22¹/₂; *Dist. trochanterica*=23, *conjugata externa*=15¹/₂ *ctm.* *conj.*; *diagonalis*=7¹/₂—8 *ctm.*; *vera*=5¹/₂—6 *ctm.* Т° 38,8°; Р.=88. Когда пузырь разорвался, наложены щипцы *Breus*'а; послѣ трехъ тщетныхъ тракцій щипцы сняты и пристулено къ консервативному кесарскому сѣченію. Послѣ вскрытія брюшной полости матка выведена наружу, подведенъ эластическій жгутъ и матка вскрыта; послѣ извлеченія ребенка за ягодицы, жгутъ затянутъ и кровотеченіе прекратилось.—Послѣдъ прикрѣплялся къ задней стѣнкѣ матки; удалена вся *decidua* и полость матки промыта растворомъ сулемы 1:3,000. Рана матки зашита слѣд. образомъ: 8 шелковыхъ швовъ, на разстояніи 1—1¹/₂ *ctm.* одинъ отъ другаго, не захватывающихъ ни слизистой полости матки, ни брюшины; эти швы пока не завязаны; далѣе непрерывный, двухъэтажный катгутовый шовъ, тоже не захватывающій ни брюшины, ни слизистой оболочки матки; теперь связаны шелковые швы; наконецъ серо-серозный шовъ по *Lambert*'у. Жгутъ снятъ, полость матки промыта сулемой со стороны влагалища и брюшная рана зашита.

Ребенокъ извлеченъ живымъ, женскаго пола, вѣсъ 3780 *grm.*; длина 51 *ctm.*

На 4-й день послѣ операци, при явленіяхъ септического перитонита,—смерть.

Вскрытіе показало: брюшная рана склеена на всемъ протяженіи, кишки вздуты, изъ брюшной полости выдѣлилась грязная жидкость; матка величиною съ головку 8-мѣсячнаго плода; на передней ея стѣнкѣ грязно—зеленоватый налетъ; серозный шовъ въ средней части разошелся; катгутовый шовъ цѣль и рана матки склеена; въ полости матки кровяной стокъ въ состояніи разложенія. *Endometritis et Peritonitis Septica.*

Ф. Краснопольскій.