

73. Б. Котелянский. Объ асептикѣ въ родильномъ и послѣродовомъ періодѣ. (Медицинское обозрѣніе № 19, томъ XXXVI, 1891 г.).

Авторъ приводитъ результаты, полученные при асептическомъ веденіи родовъ въ Екатеринбургскомъ Родильномъ домѣ. Примѣненіе асептики начато съ послѣродового періода. Въмѣсто употребляемой раньше для обмыванія половыхъ частей сулемы, стали брать кипяченую и чрезъ вату фильтрованную воду. Убѣдившись, что теченіе послѣродового періода при этомъ не ухудшается, асептика стала примѣняться и во время родовъ. Затѣмъ спринцеваніе влагалища послѣ изслѣдованія было совершенно оставлено, причемъ число изслѣдованій доведено до minimum'a. Оно производилось въ началѣ родовъ, затѣмъ послѣ излитія водъ и третью для опредѣленія момента полного открытія. Чтобы не быть голословнымъ, авторъ приводитъ слѣдующія таблицы:

1. Асептика послѣ родовъ—426 случаевъ. изъ нихъ:

Гладкихъ теченій t^0 не выше $37,5^0$	322	или	75,59%
Повышеніе t^0 до 38^0	73	»	17,13 »
» » » $38,5^0$	14	»	3,27 »
» » » 39^0	8	»	1,88 »
» » » 40^0	9	»	2,11 »
	426		100%

Въ 13 случаяхъ, т. е. 3,05% всего числа роженницъ, повышеніе t^0 было вызвано легкими пuerперальными заболѣваніями, какъ то трещины сосковъ, нагрубаніе грудей и нагноеніе швовъ. Случаевъ протекавшихъ безъ пuerперальныхъ заболѣваній 96,95%. Изъ этого числа роженницъ 98 (23,24%) оперированы, причемъ 16 разъ наблюдалось повышеніе t^0 .

2. Асептика во время родовъ—118 случаевъ.

Гладкихъ теченій	98	или	83,05%
Повышеніе t^0 до 38^0	10	»	8,48 »
» » » $38,5^0$	2	»	1,69 »
» » » 39^0	6	»	5,08 »
» » » 40^0	2	»	1,69 »

Въ этомъ числѣ лихорадящихъ заболѣваніе грудей встрѣтилось 2 раза. Заболѣваній со стороны малого таза не было ни разу.

Д. Рузи.

74. Д. И. Никольскій. Поздняя послѣродовая эклампсія (Русская медицина, № 48, 1891 г.).

Въ виду рѣдкости позднихъ послѣродовыхъ эклампсій, авторъ считаетъ не безынтереснымъ сообщить случай, гдѣ ему пришлось наблюдать припадки эклампсій на восьмой день послѣ родовъ. Въ ночь на 26 іюня прошлаго года авторъ былъ приглашенъ къ больной, которую засталъ въ полномъ сопорозномъ состояніи, лицо было блѣдно, у рта пѣна, глаза закатывались вверхъ, руки и ноги согнуты. Дыханіе 34 въ минуту, пульсъ 100, t^0 $38,4^0$. По словамъ акушерки, не задолго передъ тѣмъ было три припадка