

кокаиъ даетъ возможность избѣгать слѣдующей послѣ хлороформа или эфира рвоты, которая сама уже способна уничтожить плоды операціи, напр. послѣ зашиванія промежности. Ф. Кюнъ.

77. Sellmann. The use of vaginal tampons. (Journ. of the Amer. Med. Assoc. July 11, 1891). **Употребленіе влагалищныхъ тампоновъ.**

Цѣль этой статьи—обратить вниманіе гинекологовъ на опасности, сопряженныя съ употребленіемъ влагалищныхъ тампоновъ,—опасности, которыхъ гинекологи въ своемъ увлеченіи по сейчасъ не замѣчаютъ.

Для гѣмостатической цѣли рѣдко есть необходимость въ тампонахъ, которые въ этихъ случаяхъ могутъ принести больнымъ болѣе вреда, чѣмъ пользы. Авторъ оправдываетъ примѣненіе ихъ съ цѣлью вызвать сокращеніи матки или разрыхленіе шейки при производствѣ искусственныхъ преждевременныхъ родовъ, напримѣръ при *placenta praevia*. Иногда тампоны оправдываются и при кровотеченияхъ, зависящихъ отъ фиброидовъ матки.

Безразборчивое употребленіе тампоновъ нерѣдко ведетъ ко вреду пациентовъ. А между тѣмъ онъ не разъ вкладывался при кровотеченияхъ, зависящихъ отъ оставшихся въ маткѣ частей послѣда или отъ имѣющихся фунгозныхъ разраженій. Отыщите, говоритъ авторъ, причину кровотеченій, удалите ее, и кровотеченіе остановится. Придерживаясь этого правила, можно, подобно автору, въ теченіе 20 лѣтней практики ни разу не встрѣтить абсолютной необходимости въ тампонахъ ради кровотеченій.

Такой тампонъ, лежащій предъ самымъ *os cervicis*, конечно, задержать въ маткѣ не только кровь, но и всякое другое отдѣленіе. Скопленіе задержанныхъ жидкостей можетъ достигнуть такой степени, что, растянувъ матку *ad maximum*, онъ черезъ трубы проложатъ себя путь въ брюшную полость, гдѣ могутъ повести къ самымъ серьезнымъ заболѣваніямъ воспалительнаго характера. Кромѣ того тампонъ препятствуетъ нормальнымъ отправленіямъ пузыри и прямой кишки. Даже при ракѣ шейки примѣненіе кровоостанавливающаго средства *in loco* лучше тампона.

Напротивъ, при кровотеченияхъ изъ стѣнокъ влагалища тампонъ умѣстенъ, потому что давленіемъ своимъ на кровоточащія сосуды онъ вполне достигаетъ своего назначенія.

Нерѣдко влагалищный тампонъ употребляется съ цѣлью предохранить наружные половые органы отъ вѣднаго дѣйствія патологическаго секрета или нами же примѣненнаго лѣкарственнаго средства. И въ этихъ случаяхъ въ маткѣ можетъ произойти громадное скопленіе выдѣленій со всеми вышеуказанными грустными послѣдствіями. Вѣроятно, не разъ уже такимъ способомъ мы сами заставляли гоноррею распространиться съ нижнихъ отрѣзковъ половыхъ путей вверхъ по половому каналу.

Польза тампоновъ при ракѣ шейки, повторяю, очень сомнительна.

Болѣе смысла имѣетъ такой тампонъ при воспаленіяхъ придатковъ. Тутъ онъ, поддерживая и какъ бы фиксируя матку, предохраняетъ воспаленные органы отъ смѣщеній и влеченій ихъ маткою.

Лѣченіе тампонами воспаленій шейки и тѣла матки не оправдало тѣхъ

надеждъ, которыя возлагалъ на него *Engelmann*, предложившій этотъ способъ.

Въ заключеніе авторъ даетъ слѣдующія правила для употребленія тампоновъ:

1. На амбулаторномъ приемѣ, послѣ примѣненія какого-нибудь ѣдкаго средства, которое, вытекая, можетъ раздражать и разѣдать наружные органы, я прикладываю къ шейкѣ матки тонкую полоску гигроскопической ваты, достаточную, чтобы только впитать въ себя истекающую жидкость, и приказываю пациенткѣ, тотчасъ по возвращеніи домой удалить тампонъ.

2. Въ случаяхъ выпаденія матки или стѣнокъ влагалища я пользуюсь тампономъ, какъ пессаріемъ, при условіи, что нѣтъ катарра матки.

3. При пластическихъ операціяхъ во влагалищѣ, когда нѣтъ опасенія кровотеченій изъ мѣсты, лежащихъ выше тампона.

4. Въ случаяхъ гиперплазіи со скуднымъ отдѣлимымъ эндометрія я часто кладу къ шейкѣ матки узкій тампонъ, смоченный въ глицеринѣ, іодоглицеринѣ и т. п.

5. Способность тампоновъ исправлять смѣщенія матки очень сомнительна и наложеніе его съ этою цѣлью очень трудно. Между тѣмъ онъ можетъ препятствовать правильному кровообращенію въ тазу, и пациентки мои неоднократно жаловались на боли въ бедрѣ или внизу голени тотчасъ по вложеніи такого тампона.

Ф. Кюнь.

78. L. Baumel. L'aménorrhée et la metrorrhagie chez la jeune fille (*Gazette hebdomadaire des sciences medicales de Montpellier, 1891, № 42*)
Аменоррея и метроррагія у молодой дѣвушки.

Авторъ даетъ два интересныхъ наблюденія надъ установкой менструацій у молодыхъ дѣвушекъ.

1) Одна изъ нихъ 14 лѣтъ, въ дѣтствѣ всегда здоровая, только въ прошломъ году перенесшая инфлуэнцу, имѣла первыя менструаціи 9 ноября 1890 г. безъ всякихъ болей и недомоганія, продолжавшіяся 5 дней. Затѣмъ не менструировала 2 мѣсяца; вскорѣ же послѣ вторыхъ регулъ, онѣ появились у ней снова, на этотъ разъ въ формѣ кровотеченія, продолжавшагося 10 дней. Полный покой и ferr. sesquichlor. внутрь (10 кап. p. die) исполнѣ остановили кровотеченіе въ два дня. Тогда ferr. sesquichlor. замѣнено посредствомъ ferr. hydrogen. reduct., какъ tonicum (0,5 p. dos. 2 раза въ день передъ ѣдой).

2) Вторая больная 16¹/₂ л., перенесла оспу, тифъ и страдала солитеромъ, имѣла первыя менструаціи, продолжавшіяся 3 дня, 12 марта 1890 г. Затѣмъ втеченіи полгода ни регулъ, ни періодическихъ болей не было. Въ сентябрѣ того же года открылись вторыя регулы, сопровождаемыя разстройствомъ нервной системы (подозрѣваніе окружающихъ въ дурныхъ отзывкахъ, галлюцинаціи слуха, агитація, отказъ отъ пищи). Такое состояніе продолжалось 3 мѣс. до поступленія въ клинику (дек. 1890); регулъ за это время не было. Больная слабого тѣлосложенія, алѣмична; жалуется на головныя боли, слабость ногъ и боли въ бедрахъ; анурія и констипація.