

результатовъ, какъ и сильными, но кратковременными, и что первые гораздо лучше переносятся больными и представляютъ меньше опасностей. Широкий брюшной электродъ соединялся съ положительнымъ полюсомъ, влагалищный— съ отрицательнымъ. Результатами лѣченія, какъ уже сказано, авторъ очень доволенъ.

Во всѣхъ случаяхъ быстро ослабѣвали и исчезали тягостные субъективные симптомы, регулы стали являться правильно и безъ болей; самочувствіе больныхъ улучшалось поразительно.

Въ 1-мъ случаѣ фиксированная in retroversione матка сдѣлалась настолько подвижною, что могла быть приведена почти въ нормальное положеніе. Вскорѣ послѣ лѣченія наступила первая беременность.

Во 2-мъ случаѣ смѣщенные яичники заняли опять нормальное положеніе; retroflexio uteri значительно исправилось. Пациентка чувствуетъ себя «возрожденной» (прошло 2 года послѣ лѣченія).

Въ 4-мъ случаѣ сильно увеличенная и дряблая матка получила, благодаря лѣченію, свою нормальную величину и консистенцію.

Ф. Кюнь.

### 86. Wygodzki. Przyczynek do leczenia włókniaków i mięśniaków macicy metoda Apostoli'ego (Gazeta lekarska, 1891, № 46). Къ вопросу о лѣченіи фиброміомъ матки по способу Apostoli.

Авторъ приводитъ изъ собственнаго наблюденія 2 случая, гдѣ подъ вліяніемъ постояннаго тока произошло рожденіе подслизистыхъ фиброміомъ, въ силу чего стало возможнымъ оперативное ихъ удаленіе.

Случай 1-й. Больная, 50 л., родила 7 разъ. Жалуется на кровотеченіе. Небольшое cystocele, зѣва пропускаетъ конецъ пальца; матка на 4-мъ мѣсяцѣ беременности, подвижна, безболѣзненна, нормальной консистенціи; зондъ входитъ на 12 см.; причеиъ въ полости матки опредѣляется опухоль. Распознаваніе: подслизистая фиброміома.

Электризація постояннымъ токомъ; катодъ на животъ (электродъ изъ пластической глины), анодъ въ полость матки (зондъ). Послѣ пяти сеансовъ зондъ замѣненъ угольнымъ электродомъ, а послѣ 7 сеансовъ опухоль родилась во влагалище; она была величиною съ утиное яйцо и сидѣла на ножкѣ толщиной въ мизинецъ; опухоль безъ труда удалена. Примѣнялся токъ отъ 50—220 milliamp.

Случай 2-й. *Multipara*, 42 лѣтъ; страдаетъ отъ кровотеченій. Въ верхней трети влагалища кольцообразное суженіе, пропускающее палецъ; матка какъ на 3-мъ мѣсяцѣ беременности, плотной консистенціи; зондъ на высотѣ 6 см. встрѣчаетъ твердое тѣло, однако можетъ обойти препятствіе, войти на 12 см. Распознаваніе: *Myoma uteri*.

Электризація какъ и въ первомъ случаѣ. Послѣ пяти сеансовъ изъ наружнаго зѣва, раскрытаго на 2 пальца, показалась небольшая часть новообразованія, заключеннаго въ капсулу, исходящаго изъ дна. Еще два сеанса; опухоль въ такомъ же положеніи. Тогда помощью экразера отщеплена нижняя часть опухоли, а остальное вылучено пальцемъ. Больная выздоровѣла.

Ф. Краснопольскій.