

110. Hüter. Das Myom des Uterus als Geburts-Hinderniss. (Berliner klinische Wochenschrift, 1892, № 6). **Миома матки—какъ препятствіе для родовъ.**

При частотѣ міомъ матки, онѣ рѣдко являются препятствіями для родовъ, такъ какъ при большихъ міомахъ большею частью не происходитъ зачатіе, при малыхъ же—обыкновенно бываютъ выкидыши. Низко сидяція подслизистыя и междумышечныя міомы создаютъ механическія препятствія для родовъ, выше расположенныя—обусловливаютъ неправильности потугъ, задержаніе дѣтскаго мѣста и кровотеченія, небольшія же подбрюшинныя, сидяція на тонкой ножкѣ міомы—препятствій для родовъ не представляютъ.

Далѣе авторъ перечисляетъ обусловливаемые міомами аномаліи въ теченіи беременности, родовъ и послѣродового періода, приводитъ краткія данныя объ оперативныхъ пособіяхъ и смертности при родахъ, осложненныхъ міомами, изъ статистики *Süsserott's* и *Stratz's* и, въ заключеніе, описываетъ наблюдавшійся имъ случай родовъ при подслизистой міомѣ у 5-родящей женщины. Авторъ увидѣлъ ее, спустя нѣсколько дней послѣ отхода водъ. По расчету, роды должны были наступить 14 дней назадъ. Матка сильно растянута—доходитъ до *prol. ensiformis*. Головное въ лѣвой подвздошной впадинѣ, сердцебіенія плода нѣтъ. Зѣвъ открытъ пальца на 3 (въ монету въ 5 марокъ), и выполненъ твердой бугристой опухолью. Больная захлороформирована. Въ матку удалось провести руку (зѣвъ податливъ); поворотъ на ножку; экстракція мацерированнаго плода. Во влагалище выпятилась опухоль на ножкѣ, которая и была удалена. Затѣмъ авторъ нѣсколько разъ входилъ рукой въ полость матки, и вынулъ еще нѣсколько кусковъ опухоли, оказавшейся подъ микроскопомъ міомой. Всѣ куски опухоли вѣсили 5—6 кило. Послѣродовой періодъ нормальный. Кровотеченіе при родахъ было незначительное, что, по автору, объясняется тромбозомъ питающихъ міому сосудовъ, развившимся при безрезультатныхъ сокращеніяхъ матки въ началѣ родовъ. Вслѣдствіе недостатка питанія, опухоль, по автору, перешла въ состояніе мацерации, чѣмъ и объясняется легкость ея вылученія.

А. Соловьевъ.

111. Schwarz. Uterusrupturen, hervorgerufen durch äussere Gewaltanwendung. Cntrbl. f. Gyn., 1892, № 2). **Разрывы матки отъ внѣшняго насилія.**

Авторъ приводитъ два случая, бывшіе въ его наблюденіи. Въ 1-мъ случаѣ дѣло шло о здоровой, хорошо сложенной женщинѣ, бывшей 8 лѣтъ замужемъ. Первые ея восемь беременностей окончились—5 выкидышемъ и 3—рожденными въ срокъ, но мертвыми плодами. Причину этого, кромѣ значительной анеміи и вялости матки, авторъ думалъ найти въ сифилисѣ одного изъ родителей, но мать и ея родные не представляли ни малѣйшихъ признаковъ сифилиса, а отецъ положительно отрицалъ у себя всякія заболѣванія половыхъ органовъ, кромѣ триппера; впрочемъ, разрѣшеніе 9-й беременности ребенкомъ съ несомнѣнными признаками сифилиса доказало существованіе его у отца. На 5-мъ мѣсяцѣ этой беременности авторъ и былъ приглашенъ къ пациенткѣ, уже ослабленной выкидышами и кровопотерями. Имѣя въ виду