

matom'ы, авторъ обратилъ вниманіе на то, что акушерка, обмывая ребенка, сильно терла ему голову мокрой тряпкой. Это-то треніе, по мнѣнію автора, и послужило ближайшимъ поводомъ къ образованію кровяныхъ опухолей, тогда какъ условія для serphalhaematom'ъ были созданы разминаніемъ мягкихъ частей и perigranii во время соскальзыванія щипцовъ. Лѣченіе serphalhaematom'ъ—чисто выжидательное, но, въ случаѣ пораненія кожи, необходима самая тщательная антисептика, во избѣжаніе разложенія излившейся крови и гнойнаго менингита.

А. Соловьевъ.

115. Norton. Vicarius menstruation during pregnancy. (The American Journal of obstetrics. № 2). Викарная менструація во время беременности.

Магу Е..., 21-го года, малокровная, страдаетъ приступами истеріи. Первыя крови на 14 году, при чемъ въ теченіи нѣсколькихъ дней, до появленія регулъ, пациентка ощущала сильныя боли внизу живота, бѣли, появились приступы кашля съ отхаркиваніемъ крови, затѣмъ слабо окрашенное кровянистое истеченіе изъ полового канала. Каждый мѣсяць регулы, продолжаясь по 5—6 дней, сопровождалась сильными болями внизу живота, приступами кашля съ отдѣленіемъ крови. Магу лѣчилась безъ успѣха у многихъ врачей. Вышла замужъ 16 лѣтъ. Типъ менструацій не измѣнился. При внутреннемъ изслѣдованіи оказалось: матка стоитъ высоко, уменьшена въ объемѣ, но другихъ какихъ либо измѣненій не найдено.

Въ октябрѣ 89 г. *Norton* былъ приглашенъ и осмотрѣвши опредѣлили беременность 6 мѣсяцевъ; по словамъ пациентки въ продолженіи этого времени ежемѣсячно появлялась менструація и сопровождалась сильными приступами кашля съ отхаркиваніемъ крови. Роды наступили въ срокъ, были нормальны. Послѣ родовъ первыя регулы per vaginam, были обильны, и ощущались только незначительныя боли внизу живота.

А. Лапина.

116. A. Tannen. Ein Fall von Uterus duplex. (Cubl. f. Gyn., 1892, № 3). Случай двойной матки.

Г-жа R., 26 лѣтъ, замужемъ 2 года; регулы съ 20 лѣтъ черезъ 4—5 недѣль. Клифозъ, по ея словамъ, какъ слѣдствіе дурного обращенія въ дѣтствѣ. Со времени замужества мѣсячныя стали гораздо сильнѣе, будто бы отъ простуды, явились боли въ животѣ и крестцѣ, прекратившіяся послѣ *Secale* и *Hydræssit*. Бѣли. При изслѣдованіи: анемична, малаго роста, съ умѣренно развитой мышечной системой. Рукавъ широкъ; въ сводѣ небольшой, вялый, неправильно сформированный зѣвъ; влагалищной части нѣтъ; матка прощупывается неясно, въ ретропозиціи и ретроверсии. Въ зеркалѣ, кромѣ упомянутого зѣва, есть еще и другой, въ 2 см. отъ перваго вправо, также безъ влагалищной части, вялый и неправильный. *Per rectum*: матка нормальной формы, около 5 см. длиной, мягче обыкновеннаго, совершенно подвижна, загнута назадъ; зондъ, введенный въ правый зѣвъ, прощупывается здѣсь. Рядомъ съ ней лежитъ тѣло продолговато круглой формы, вдвое меньше сосѣдней матки, но болѣе твердое и менѣе подвижное; ясно прощупываемая размягченная полоса отдѣляетъ его отъ матки. Зондъ,