

XIV.

Д-ра мед. В. Н. Массена,

врача-акушера Приюта.

(Продолженіе).

Узкіе тазы.

На все число родовъ мы имѣли 197 случаевъ узкаго таза или 10,29%.
Иными словами на каждые 9,8 таза одинъ былъ узкій.

По годамъ частота узкаго таза встрѣчалась въ слѣдующей степени:

въ 1888 (II-е полугодіе)	. . .	19 случаевъ
» 1889	» . . .	64 случая
» 1890	» . . .	46 случаевъ
> 1891	» . . .	49 »
» 1892 (I-е полугодіе)	. . .	19 »
		<hr/>
		197 случаевъ.

По числу предшествовавшихъ беременностей роженицы съ узкимъ тазомъ разпредѣляются на:

первородящихъ	73	} 197.
многородящихъ	124	

По возрасту роженицы съ узкимъ тазомъ были:

моложе 20-ти лѣтъ было . . .	10	} 197.
отъ 21 до 30 лѣтъ.	139	
» 31 » 40 »	44	
старше 40 лѣтъ	4	

Преждевременныхъ родовъ было 30.

Предлежания были:

1-е зат. пер. видъ	115 = 58,7%	} = 96,5
1-е » задн. »	18 = 9,0%	
2-е » пер. видъ	9 = 4,6%	
2-е » задн. »	48 = 24,3%	
1-е ягод. пер. видъ	1	} 3,5%
1-е » задн. »	1	
2-е ягод. пер. видъ	1	
2-е » задн. »	1	
1-е поположеніе	1	
1-е лицевое пер. видъ	1	
2-е » задн. »	1	
Уличные роды	1	
	<hr/>	
	197	

Сравнивая полученные цифры съ данными для частоты различныхъ предлежаній при всѣхъ вообще нашихъ родахъ, видимъ, что при узкихъ тазяхъ затылочные предлежания встрѣчаются чаще чѣмъ обыкновенно (96,5 противъ 94,2); чаще также встрѣчаются и вообще предлежания головнымъ концемъ (97,46% противъ общаго средняго 94,7%).

Осложненія въ теченіи родовъ были: кровотеченіе *sub partu* 2 раза; *ecclampsia* 1 разъ; выпаденіе ручки 1 разъ.

Далѣе отмѣчено: *placenta marginata* 1 разъ; чрезмѣрно-чувствительныя боли 1 разъ; раннее отхожденіе околоплодныхъ водъ (до начала родовъ) 9 разъ; чрезмѣрное *Naegle*'вское стибаніе головки 1 разъ; слабыя боли 14 разъ.

Операциі произведены слѣдующія:

<i>Extractio foetus</i>	3
<i>Forceps</i>	15
<i>Perforatio</i> (послѣдующей головки)	1
<i>Solutio placentae man.</i>	5
<i>Versio foetus in pedes</i>	4
<i>Perineorrhaphia</i>	14
	<hr/>
	42

Кромѣ того два раза зашиты разрывы нащѣчекъ губъ.

Для вычисленія % оперативныхъ родовъ при узкомъ тазѣ мы беремъ: *extractio*—3 раза, *forceps*—15, *versio in pedes*—5 и *perforatio*—1, итого 23 случая на 197, что составляетъ 11,7%. Такимъ образомъ оперативная помощь потребовалась въ 11,7% всѣхъ случаевъ узкихъ тазовъ.

Средняя продолжительность срочных родов при узких тазах была ¹⁾:
 у первородящей 14 ч. 21 м. короче общей средней для I—рага на 1 ч. 44 м.
 у второродящей 9 ч. 42 м. длиннее » » » II—рага » 1 ч. 07 м.
 у многородящей 10 ч. 14 м. » » » » M—рага » 1 ч. 11 м.

Средняя продолжительность преждевременных родов при узких тазах:
 у первородящей 8 ч. 09 м. короче общей средней для I—рага на 5 ч. 15 м.
 у второродящей 6 ч. 54 м. » » » » II—рага » — 30 м.
 у многородящей 8 ч. 53 м. » » » » M—рага » 1 ч. 10 м.

Родилось мальчиков 95, девочек 102, т. е. отношение, как 1 : 1,07.

Из них родилось: $\left. \begin{array}{l} \text{живыми.} \\ \text{мертвыми} \\ \text{мацерированными.} \end{array} \right\} 197.$

Послѣродовой периодъ протекалъ слѣдующимъ образомъ:

Здоровыхъ 143 = 72,8%
 Лихорадившихъ: $\left\{ \begin{array}{l} \text{однократно} \\ \text{двукратно} \\ \text{многократно} \end{array} \right. \begin{array}{l} 24 = 12,1\% \\ 6 = 3,0\% \\ 24 = 12,1\% \end{array}$
 Болѣло: $\left\{ \begin{array}{l} \text{послѣродов. забол.} \\ \text{не послѣродов. забол.} \end{array} \right. \begin{array}{l} 8 = 4\% \\ 4 = 2\% \end{array}$
 Умершихъ не было.

Средній вѣсъ плода при узкихъ тазахъ былъ слѣдующій:

	Срочные роды.		Преждевременные роды.	
	Мальчикъ.	Дѣвочка.	Мальчикъ.	Дѣвочка.
I—рага.	2854	2812	1783	2216
II—рага.	3270	2971	2733	2033
M—рага.	3231	3198	—	2033
Средній	3118	2993	2258	2155
Общій вѣсъ	3055		2206	

Остальные данные относительно родов при узких тазах можно найти въ прилагаемой при семъ таблицѣ:

¹⁾ При высчитываніи средней продолжительности принимались въ расчетъ только роды, окончившіеся силами природы.

1888	230	2	27	24	26	17	—	30	R.	3200	33
„	231	1	29	24	28	17,5	—	30	R.	3500	52
„	237	1	22	23	25,5	17,5	—	28,5	M.	1100	26
„	239	1	21	23	27	17,5	—	29	R.	3000	52
„	246	1	24	24	27	17,5	—	31	R.	3350	55
„	250	3	26	21	26	17,5	—	32	M.	3450	51
„	267	3	22	24	27	17	—	30	R.	3200	52
„	276	2	30	22	26	17,5	—	29	M.	3450	53
„	238	5	28	21	24	17,5	—	28	M.	2900	50
„	327	3	21	23	26	17,5	—	29	M.	3100	53
„	340	1	22	22	25	17	—	29,5	M.	3250	51
„	406	1	23	22	24	17	—	28	M.	3000	51
„	410	7	37	23	26	17,5	—	29	R.	3200	52
„	415	1	29	21	23	17	—	29	R.	3100	47
„	425	2	28	21	23,5	17,5	—	29,5	M.	3250	52
„	452	2	25	22,5	24	16,5	9	29,5	R.	2750	51
„	466	1	24	21	23	16,5	—	29	M.	2500	46
„	475	1	30	22	24	17	—	29,5	M.	3100	52
„	478	2	21	24	27	17,5	—	27	M.	3100	50
1889	2	2	24	23	25	17	—	33	M.	2500	47
„	6	3	23	23	25	17	—	26	R.	2800	48
„	33	8	44	23,5	26,5	17,5	—	29,5	R.	3600	52
„	35	5	31	24	27	17,5	—	30	R.	3200	51
„	40	3	30	22	25	16,5	—	23	M.	3250	50
„	41	2	28	20	24	17	—	27	M.	3100	50
„	45	1	22	24	27,	17	—	27	R.	2900	50

Г О Д Ъ.

№№ родовъ.

Который разъ
беременна.

Возрастъ роже-
ницы.

Sp. il.

Cr. il.

Conj. ext.

Conj. diag.

Troch.

Р А З М Ъ Р Ы Т А З А .

Поль.

Вѣсь.

Длина.

М Л А Д Е

Н Е Ц Ъ.			Положеніе п л о д а.	Теченіе родовъ, ихъ продолжительность, терапія.	Послѣродовой періодъ.
Овружность головки.		Живой или мертвый.			
Прямая.	Косая.				
34	39	живой	1 зат. пер. в.	4 ч. 10 м.	Norma.
35	40	мертвый	2 ягод. > >	19 ч. 35 м. Extractio foet Solutio placentae man.	Norma.
26	28	живой	1 зат. > >	Прежд. 9 ч. 8 м. Вскр. пл. пуз.	На 4 сут. t° 38,6; на 5 сут. 39,4; на 6 сут. 39,4
35	39	>	1 > > >	4 ч. 55 м. Прежд.	На вт. сут. t° 38,2 Endometritis levis.
34	40	>	2 > > >	13 ч. 10 м.	Norma.
35	39	>	1 > > >	3 ч. 8 м.	>
32	38	>	1 > > >	5 ч. 2 м.	>
35	40	>	1 > > >	28 ч. 58 м.	>
32	37	>	2 > > >	12 ч. 59 м. Пуз. вскр.	>
34	39	>	2 > зад. >	7 ч. 10 м.	>
35	39	>	1 > пер. >	12 ч. 50 м.	>
34	37	>	1 > > >	14 ч. 26 м.	>
34	37	асф. ож.	1 > > >	8 ч. 27 м.	>
34	38	живой	1 > > >	15 ч. 53 м. Пуз. вскр.	>
35	39	>	2 > зад. >	11 ч. 36 м.	>
32	36	мертвый	1 > > >	25 ч. 35 м. Повор. на ножку. Перфор. послѣдую- щей головки.	На 4 сут. t° 38,2; на 5 с. 38,4; на 7 с. 38,1.
34	38	живой	2 > > >	19 ч. 25 м.	Norma.
34	39	>	1 > > >	19 ч. 25 м. Форсепс.	На 4 сут. t° 38,2.
35	38	>	1 > > >	5 ч. 5 м.	Norma.
32	35	асф. ож.	1 > > >	5 ч. 20 м. Прежд.	1 сут. t° 38,1.
34	38	живой	2 > зад. >	2 ч. 40 м.	Norma.
34	39	>	1 > пер. >	7 ч. 20 м.	1 сут. t° 38,2.
34	38	>	1 > > >	9 ч. 12 м.	Norma.
33	38	>	1 > > >	6 ч. 7 м. Пуз. вскр.	>
35	40	>	1 > > >	6 ч. 21. Episiotomia.	На 4 сут t° 38,5
32	38	>	1 > > >	Foreceps, Solut. plac. man. 16 час. 50 м.	Norma.

Г о д ы.	№№ родовъ.	Который разъ беремена.	Возрастъ роже- нныи.	РАЗМЕРЫ ТАЗА.					М Л А Д Е		
				Sp. il.	Cr. il.	Conj. ext.	Conj. diag.	Troch.	Полъ.	Вѣсъ.	Длина
1889	46	3	26	23	24	17,5	—	27	м.	3250	53
»	61	3	20	24	26	17	—	26	м.	3250	50
»	65	4	26	22	23	17,5	—	28	м.	2850	49
»	81	7	39	23	23	16	—	23	м.	3000	48
»	98	1	21	22	23,5	17	—	27,5	м.	2950	48
»	105	1	22	25	26	16	—	24	д.	2700	48
»	108	9	41	22	27	17,5	—	33	м.	4000	52
»	116	3	33	21	25	17,5	—	28,5	д.	3500	50
»	120	2	33	22	26	17	—	27	м.	2400	50
»	124	2	33	23	26	17	—	26	д.	2800	49
»	131	3	24	22,5	25	17	—	31	д.	3450	52
»	135	1	24	24	26	17,5	—	31	д.	2800	49
»	148	3	31	23	25,5	17,5	—	28,5	м.	2900	50
»	149	2	25	23	25	17,5	—	28	м.	3100	51
»	153	2	25	22,5	25	17	—	27	д.	2600	47
»	157	2	31	23	26	17,5	—	30	д.	2550	48
»	164	1	20	19	21	15	10	25	м.	1950	47
»	167	2	38	19,5	21	16	—	26,5	м.	2250	47
»	169	2	25	21	23	16	—	28,5	д.	2850	51
»	171	4	26	24	27	16	—	25	д.	2500	49
»	189	1	29	20,5	23	17,5	—	27,5	м.	2800	53
»	193	9	36	24	27	17	—	25	м.	2400	48
»	195	1	24	23	25	17	—	27	д.	2500	50
»	201	2	27	21	24	16	—	29	м.	2950	49
»	223	2	27	23	26	17,5	—	25	м.	3700	52
»	224	3	26	22	24	17	9,5	24	м.	3700	52

Н Е Ц Ь.		Живой или мертвой.	Положение плода.	Течение родов, их продолжительность, терапия.	Послеродовой периодъ.
Окружность головки.					
Прямая.	Косая.				
34	38	Живой	1 зат. зад. .	4 ч. 1 м.	Norma.
33	37	»	2 » » в.	8 ч. 14 м.	»
32	37	»	2 » » »	6 ч. 36 м.	»
84	37	»	1 » пер. в.	12 ч.	»
34	37	асф. неож.	1 » » »	17 ч. 30 м.	Многокр. пов. t ^o . Param. inc. dextr.
32	36	живой	1 » » »	22 ч. 51 м., вскр. пуз.	Norma.
38	41	асф. ож.	1 » » »	13 ч. 35 ч. Форсепс.	Многокр. пов. t ^o . Param. duplex.
31	39	живой	1 » » »	9 ч. 50 м.	Norma.
35	39	»	2 зат. зад. в.	12 ч. 50 м.	1 сут. t ^o 38,3
33	36	»	1 зат. пер. в.	6 ч. 9 м. Пуз. вскр. прежд.	1 сут. t ^o 38,2.
34	39	»	2 зат. зад. в.	6 ч. 34 м.	Norma.
33	36	»	1 зат. пер. в.	11 ч. 48 м. Форсепс.	1, 2, 3, 4 сут. t ^o пов. отъ 38,2 до 40,3.
33	36	»	Уличн. роды.	1 ч. 40 мин.	1 сут. t ^o 33,4; 4 с. 38,5.
33	37	»	1 зат. пер. в.	3 ч. 23 м.	1, 2, 3 и 4 с. пов. t ^o отъ 38,1 до 38,6.
32	36	»	1 » » »	9 ч. 39 м. пуз. вскр.	Norma.
33	36	»	1 » » »	4 ч. 33 м.	»
31	34	асф. неож.	1 » » »	16 ч. 30 м. Почти вся ворс. обол. осталась. Прежд.	Многокр. пов. t ^o отъ 38,1 до 40,5. Endom.
33	36	живой	1 » » »	12 ч. 16 м. Прежд.	Norma.
33	37	»	1 » » »	4 ч. 58 м.	1 сут. t ^o 38,2.
33	37	»	1 » » »	8 ч. 20 м. Преждевр. Solut. plac. man.	Norma.
33	38	»	1 » » »	20 ч. 15 м. Форсепс.	»
32	35	»	2 зат. зад. в.	6 ч. 55 м.	7 дней t ^o повыш. отъ 38,1 до 39,5 Catarr. intest.
33	36	»	2 » » »	22 ч. 30 м.	На 4 сут. t ^o 38,2.
33	37	»	1 зат. пер. в.	10 ч. 22 м.	Norma.
36	39	»	1 » » »	10 ч. 8 м. Пуз. вскр. Форсепс.	Многокр. пов. t ^o отъ 38, до 40,1. Endometritis!
34	38	»	1 » » »	32 ч. 2 м. Пуз. вскр. Повор. на ножки.	Norma.

1889	225	1	23	23	25	16	—	24	д.	3000	50
»	227	2	22	22	25	16,5	—	28	м.	3400	50
»	231	2	25	22,5	23	16,5	—	28	м.	3450	53
»	234	2	23	23	25	16,5	—	25	м.	3400	52
»	235	10	38	22	26	17,5	—	30	д.	3700	52
»	236	1	19	20	23	16	—	29,5	м.	2750	50
»	243	1	25	22	25	16,5	—	29	д.	2600	50
»	250	1	23	23	27	17	—	26	м.	3100	50
»	260	3	24	23	26	17,5	—	31	д.	3000	49
»	274	5	28	23	26	16,5	—	30	м.	3300	50
»	280	6	36	25	27	17	—	33	м.	3700	52
»	283	7	34	21	25	17	—	29,5	д.	3500	50
»	292	2	23	23	27	17	—	27	д.	3300	52
»	294	2	26	22	25	17	—	22	м.	2900	50
»	300	5	33	23	27	17	—	26	м.	3500	53
»	322	1	22	24	26	17	—	26	д.	2700	48
»	336	4	26	23	26	17	—	30	д.	3000	53
»	352	1	31	21	25	17	—	29	м.	3600	52
»	366	2	29	24	27	17	—	23	д.	1500	42
»	382	1	41	23	26,5	17	—	29	м.	3050	51
»	408	4	23	23	25	16,5	9,5	29	д.	3000	50
»	409	1	23	23	25	17	(vera)	31	д.	3300	50
»	415	4	24	22	25	17	—	30,5	м.	3700	52
»	420	2	28	22,5	24,5	17	—	27,5	м.	3400	52
»	440	1	29	22	24	15,5	—	28	д.	2600	49
»	443	1	21	23	25	16,5	—	24	м.	3600	54

Г О Д Ъ.

№№ родовъ.

Который разъ
беременна.

Возрастъ реже-
ницы.

Sp. il.

Cr. il.

Conj. ext.

Conj. diag.

Troch.

РАЗМѢРЫ ТАЗА.

Полъ.

Вѣсъ.

Длина.

МѢРА ДѢ

Н Е Ц Ъ.		Живой или мертвый.	П о л о ж е н и е п л о д а.	Течение родовъ, ихъ продолжительность, терапия.	Послѣродовой п е р и о д ъ.
Окружность головки.					
Правая.	Левая.				
34	37	Живой	1 зат. пер. в.	4 ч. 30 м.	Norma.
34	39	»	1 » » »	13 ч. 22 м.	На 5 сут. t° 38,8.
34	37	»	1 » » »	5 ч. Прежд.	Norma
35	39	»	2 » зад. »	32 ч. 38 м.	»
34	38	»	2 » » »	10 ч. 47 м. Пуз. вскр.	»
35	38	»	1 » » »	13 ч. 50 м. Epis. bilat.	»
33	38	»	1 » пер. »	17 ч. 54 м. Пуз. вскр.	»
34	38	»	1 » » »	Epis. bilat. 26 ч. 32 м.	»
32	34	»	2 » » »	20 ч. 45 м. Пуз. вскр.	»
33	38	мним. ожив.	1 » » »	12 ч. 43 м. поворотъ.	»
34	38	живой	1 » зад. »	20 ч. 27 м.	»
34	38	»	неполное ногопо- ложение.	3 ч. 55 м. Extractio- foet.	»
35	39	»	2 » зад. в.	10 ч. 36 м.	»
34	37	»	1 зат. пер. в.	2 ч. 52 м.	»
35	38	»	2 » » »	18 ч. 18 м.	»
34	38	»	1 » » »	8 ч. 27 м.	Множкратное повыш. t° (max. 39,6).
34	39	»	1 » » »	4 ч. 50 м.	Norma.
35	40	»	1 » » »	12 ч. 35 м.	Однократное повыш. t° (38,2), ¹
29	33	мертвый недон.	1 » » »	7 ч. 36 м. Partus praematurus.	Norma.
34	38	живой	1 » » »	10 ч. 48 м.	Множкратное повыш. t° (max. 39°).
32	37	»	1 » » »	12 ч. 40 м.	Norma.
33	38	»	1 » » »	26 ч. 15 м.	»
35	39	»	1 » » »	10 ч.	»
35	40	»	1 » » »	24 ч. 30 м.	»
34	38	»	1 » » »	9 ч. 45 м.	»
36	40	»	2 » зад. »	25 ч. 1 м. Forceps. Ruptura per. 2-e ord.	Множкратное повыш. t° (max. 39,7).

1889	456	2	31	22	26	16,5	—	28	М.	3500	51
»	465	1	36	25	27	17,5	—	26	М.	2200	43
»	470	2	26	22	25	17	—	25	М.	3300	51
»	483	1	28	20	22,5	17	—	28,5	М.	2900	51
»	517	1	23	23	26	17	—	26	М.	2300	45
1890	20	1	24	22	26	17,5	—	31	Д.	2700	50
»	16	2	21	09	24	16,5	—	28,5	Д.	3200	52
»	47	3	25	23	25	17,5	—	30,5	Д.	3400	52
»	50	1	27	25	26,5	17	—	29	М.	2300	49
»	51	2	25	24	24,5	17	—	29,5	М.	3400	50
»	81	1	18	21	23,5	16,5	—	28	Д.	2050	48
»	95	1	22	22	26	17,5	—	30	М.	3500	54
»	98	1	26	23	27	17,5	—	29	Д.	3000	50
»	104	1	24	22,5	24,5	17,5	—	30	Д.	2800	50
»	107	2	26	22	25	17	—	29	М.	2900	50
»	135	3	27	21	23	16,5	—	28	Д.	3400	53
»	149	3	29	22	25	17,5	—	30	М.	3200	50
»	152	2	29	19	22	16	—	28	Д.	2500	48
»	153	6	30	20	24	16	—	28	М.	2900	50
»	154	3	39	22	26	17	—	29	М.	2900	50
»	191	5	28	21	25	17,5	—	31	Д.	3400	52
»	194	2	24	24	26	17	—	29	М.	3300	51
»	203	3	26	22	25	17,5	—	28	Д.	3000	49
»	213	2	24	22,5	25	17,5	—	34	М.	3100	50
»	208	3	35	18	24	17,5	—	30	Д.	2500	48
»	219	1	34	23	24	17	—	28	Д.	2800	48

Г О Д Ъ.

№№ родовъ.

Который разъ
беременна.

Возрастъ роже-
ницы.

Sp. il.

Cr. il.

Conj. ext.

Conj. diag.

Troch.

Полъ.

Вѣсъ.

Длина.

Р А З М Ъ Р Ы
Г л о в ѣ .

М ѣ т р ѣ
д л и н ѣ .

952

Н Е Ц Ъ.		Живой или мертвый.	Положение плода.	Течение родов, их продолжительность, терапия.	Послѣродовой периодъ.
Прямая.	Косая.				
35	38	Живой	1 ягод. пер. в.	19 ч. 19 м. Extractio-fact. alta.	Norma.
34	37	»	1 зат. пер. в.	11 ч. 45 м.	»
33	36	»	1 » » »	4 ч. 41 м.	»
34	40	»	2 зат. зад. в.	14 ч. 45 м. Forceps. Ruptura perin. 2-е ord.	Множкратное повыш. t ^o (max. 38,4).
33	36	»	2 зат. пер. в.	6 ч. 8 м.; пуз. вскрыть. Partus praematurus.	Norma.
34	39	Мним. ум. ожив. живой	2 зат. зад. в.	29 ч. 55 м.	Множкратное повыш. t ^o (max. 39,8). Jcterus cat.
34	39	»	1 зат. пер. в.	13 ч. 50 м.	Norma.
33	37	»	1 зат. зад. в.	4 ч. 15 м.	»
—	—	мацер.	2 ягод. зад. в.	9 ч. 15 м.	»
36	42	живой	2 зат. зад. в.	6 ч. 32 м. Ruptura vaginas.	»
31	34	»	1 » » »	6 ч. 4 м.; пуз. вскрыть. Partus praematurus.	»
35	39	Мним. ум. ожив. живой	2 » » »	28 ч. 10 м.	»
33,5	40	»	1 зат. пер. в.	10 ч. 35 м. Rup. perinei incompl.; 2-е ord.	3-кратное пов. t ^o .
33	38	»	2 зат. зад. в.	7 ч. 40 м.	Norma.
33	36	»	2 зат. пер. в.	10 ч. 32 м.	»
34	38	»	1 » » »	3 ч. 45 м.	»
34	38	»	1 » » »	6 30 ч. м.; пуз. вскр.	2-кратное пов. t ^o до 39,3 38,1.
31	37	»	1 » » »	6 ч. 45 м. Solutio placentaе man.	Norma.
35	37	»	2 зат. зад. в.	5 ч. 8 м.; пуз. вскрыть.	»
39	38	»	1 зат. пер. в.	11 ч. 18 м. Задержкаіе chorion.	»
35	37	»	2 зат. зад. в.	1 ч. 35 м. Ruptura perin. incompl. 2-ае ord.	1-кратное повыш. t ^o до 38,1.
34	39	»	1 зат. пер. в.	13 ч. 20 м.	Norma.
33	37	»	1 зат. зад. в.	6 ч. 55 м.	»
34	39	»	1 зат. пер. в.	5 ч. 15 м.	»
33	36	»	2 зат. зад. в.	10 ч. 25 м.	»
32	37	»	1 зат. пер. в.	12 ч. Forceps. Ruptura perin. incompl. 2-е ord.	»

1890	221	2	27	20	25	17,5	—	29	м.	4100	52
»	222	3	21	20	24	17	—	30	м.	3200	54
»	230	2	25	22	25	17,5	—	30	м.	3600	52
»	249	1	30	21	22	16	—	27	м.	2600	47
»	282	6	31	22	25	17,5	—	28,5	м.	3000	52
»	289	1	24	24	27	17,5	—	29	д.	3150	52
»	292	2	23	22	26	17,5	—	28	м.	3500	54
»	295	6	30	22	25	17	—	32	д.	2500	48
»	308	1	29	20	25	17,5	—	29,5	д.	2900	50
»	314	1	23	24	27	17,5	—	30	д.	2900	49
»	320	3	30	22,5	24,5	16,5	—	27	д.	3000	50
»	321	3	24	23	25	17	—	27	д.	3000	50
»	336	5	34	22	26	17,5	—	31,5	м.	3800	52
»	338	2	22	21	25	17	—	29	м.	3600	52
»	367	2	25	21	25	17	—	28	м.	4000	54
»	392	9	38	23	25,5	17,5	—	28,5	д.	2750	50
»	398	1	20	22	26	17,5	—	30	м.	2500	50
»	409	6	35	22	27	17,5	—	30	м.	3300	48
»	413	1	21	22	25	17	—	30	м.	1300	40
»	418	7	35	21	25	17	—	31	м.	3400	52
»	443	3	33	24	26,5	17	—	27	д.	3000	50
»	448	1	23	21	24	17,5	—	28	д.	1600	42
»	490	1	27	22	24	17,5	—	29	д.	3300	53
»	500	1	26	22	26	17	—	30	д.	2900	50
»	523	2	29	22	26	17,5	—	31	д.	1800	46

Г О Д Ъ.

№№ родовъ.

Который разъ
беременна.

Возрастъ роже-
ницы.

Sp. il.

Cr. il.

Conj. ext.

Conj. diag.

Troch.

Полъ.

Вѣсъ.

Длина.

Г
Л
А
З
М
Ъ
Р
Ы
Г
Л
А
З
А.

М
Г
Л
А
Д
Е

Н Е Ц Ъ.		Живой или мертвый.	Положеніе плода.	Течение родовъ, ихъ продолжительность, геранія.	Послѣродовой періодъ.
Окружность головки.					
Прямая.	Косая.				
36	41	Живой	1 зат. пер. в.	3 ч. 53 м. Ruptura perin. 2-e ord.	Norma.
34	39	»	1 » » »	11 ч. 03 м. Пуз. вскр.	»
35	39	»	1 » »	10 ч. 07 м. Пуз. вскр.	»
35	39	»	1 » зад. »	17 ч. 6 м. Ruptura perin. incompl. 2-e ord.	Однократное повыш. t° до 38,1.
36	40	»	1 » » »	10 ч. 56 м.	Однократное повыш. t° до 38,3.
34	37	»	1 » пер. »	15 ч. 26 м.	Однократное повыш. t° до 38,1.
35	40	»	1 » » »	12 ч. 20 м. Пуз. вскр.	Однократное повыш. t° до 38,1.
32	38	живой	1 » » »	4 ч. Plac. marginata. Partus praematurus.	Norma.
33	37	»	1 » » »	5 ч.	»
33	38	»	1 » » »	15 ч. 35 м.	»
35	39	»	2 » зад. »	8 ч. 20 м. Ручное от- дѣленіе послѣда.	Многokратное повыш. t° до 39,9. Mastitis.
34	37	»	2 » » »	11 ч. 36 м.	Norma.
34	39	»	1 » пер. »	3 ч. 35 м. Пуз. вскр.	»
36	40	»	1 » » »	6 ч. 42 м. Пуз. вскр.	»
36	40	»	1 » » »	6 ч. 42 м.	»
33	37	»	2 » зад. »	6 ч. 57 м.	»
33	36	»	1 » » »	18 ч. 25 м.	»
33	37	»	1 » пер. »	10 ч.	»
30	32	мацерир.	1 » » »	16 ч. 50 м.	Многokратное повыш. t° до 38,8.
35	39	живой.	1 » » »	22 ч. 54 м. Разрывъ промежности.	Norma.
34	38	»	1 » » »	8 ч. 47 м.	Двукратное повыш. t° до 38,8.
27	31	»	1 » зад. »	Преждеврем. роды. 6 ч. 11 м. При поступлен. кро- вотеч. Тампонада до пол- наго зѣва.	Norma.
34	38	»	1 » пер. »	11 ч. 28 м.	»
34	38	»	1 » зад. »	23 ч. 12 м.	»
32	37	»	1 » пер. »	5 ч. 6 м. Part. praem.	»

1891	3	6	22	24	26	17,5	—	28	м.	4100	55
»	25	3	31	21	25	17,5	—	31	д.	3150	51
»	31	1	22	21	25	17,5	—	29,5	м.	3050	50
»	29	1	24	22	25	17	—	32	д.	2000	42
»	68	1	21	20	22	17	—	27	д.	2600	49
»	26	1	24	20	23	17	—	28	д.	3000	50
»	75	1	28	22,5	25	17	—	28	м.	3050	50
»	91	1	25	22	25	16,5	—	28	д.	3300	50
»	102	3	29	24	26	17	—	28	д.	2600	48
»	136	2	37	22,5	25	17	—	27	д.	2500	48
»	142	5	39	23	25	17	—	28	м.	2900	51
»	148	1	29	23	26	17	—	32	м.	2200	—
»	149	3	27	24	28	17,5	—	30	м.	4050	52
»	152	6	28	22	23	17,5	—	28	д.	3500	54
»	197	3	29	22	25,5	16,5	—	29	м.	3400	—
»	198	2	33	20	24	17,5	—	29	д.	2700	50
»	217	1	21	23	27	17	—	29	м.	2800	50
»	218	1	31	23	25	16	—	27	д.	2650	48
»	222	1	25	23	25	17,5	—	29	д.	3300	50
»	243	3	36	21	25	17,5	—	29	м.	3400	52
»	248	2	27	23	25	16	—	28	д.	2800	49
»	252	2	20	22	25	17,5	—	28	д.	3000	49
»	254	2	33	22	24,5	17	—	27	д.	3500	50
»	259	5	33	21	25	17,5	—	29,5	д.	3710	50
»	260	1	23	20	25	17	—	27	д.	3500	52
»	278	1	21	21,5	24,5	17,5	—	29	м.	2000	45

Г О Д Ъ.

№№ родовъ.

Который разъ
беременна.

Возрасть роже-
ницы.

Sp. il.

Cr. il.

Conj. ext.

Conj. diag.

Troch.

Полъ.

Вѣсъ.

Длина.

Р А З М Ъ Р Ы Т А З А .

М Л А Д Е

Н Е Ц Ъ.			Положеніе п л о д а.	Теченіе родовъ, ихъ продолжительность, терапия.	Послѣродовой п е р і о д ъ.
Окружность г о л о в к и.		Живой или мертвый.			
Прямая.	Косая.				
34	39	Живой.	1 зат. пер. в.	12 ч.	Норма
31	37	>	2 зат. пер. в.	16 ч. 20 м.	2-кратное повыш. до 39.
35	40	>	1 зат. зад. в.	13 ч. 5 м.	Многokратное повыш. до 38,9.
31	35	>	1 зат. пер. в.	18 ч. 15 мин.	Норма
34	38	>	1 зат. зад. в.	7 ч. 23 м.	>
33	37	>	1 зат. зад. в.	9 ч. 57 м.	>
34	—	>	2 > > >	8 ч. 55 м.	>
34	38	>	1 зат. пер. в.	7 ч. 15 м.	1-кратное повыш. до 38,1.
32	37	>	2 зат. зад. в.	7 ч. 35 м.	1-кратное пов. шах. 38,3.
31	39	>	1 зат. пер. в.	Щипцы. Eclampsia sub partu 60 ч. 38 м.	Норма
34	37	>	1 > > >	1 ч. 58 м. пуз. вскр.	>
—	—	Мертвый. мацерир. живой.	1 > > >	5 ч. 40 м. пуз. вскр.	>
34	41	>	1 > > >	3 ч. 55 мин.	>
33	38	>	1 > > >	7 ч. 20 м.	>
—	—	мертвый	1 лиц. > >	11 ч. 55 м.	Многokратное повыш. (до 39,4.
33	37	живой.	1 зат. > >	9 час. 33 м.	Норма
35	40	>	1 > > >	29 ч. 15 м.	>
31	37	>	1 > > >	9 ч. 47 м.	>
33	39	>	1 > > >	11 ч. 30 мин.	Многokр. повыш. t° до 39° (ante и post part.).
36	40	>	1 > > >	14 ч. 55 м. Кровоте- чение sub partu.	Норма
32	37	>	2 зат. зад. в.	5 ч. 42 м.	>
33	37	>	2 зат. зад. в.	5 ч. 36 м.	>
34	39	>	1 зат. п. в.	10 ч. 50 м.	>
36	39	>	2 лиц. зад. в.	21 ч. 10 м.	1-кратн. пов. t° до 38,1.
36	40	>	1 зат. пер. в.	11 ч. 15 мин.	1-кратное пов. t°.
29	32	>	1 зат. зад. в.	14 ч. 5 мин.	Норма.

1891	279	2	26	22	26	17,5	—	30	д.	3500	53
»	284	9	39	23	26	17	—	29	д.	3250	52
»	292	1	19	22	26	17	—	29,5	д.	3400	52
»	297	2	26	20	24	17	—	31	м.	3300	50
»	301	3	28	20	24	17	—	26,5	м.	2950	50
»	306	1	25	27	23	17	—	31	м.	3100	53
»	312	9	28	21	25	17	—	31	м.	3400	50
»	307	1	21	21	25	17	—	28	д.	2500	46
»	316	3	27	20	24	17,5	—	30	д.	3050	50
»	325	2	24	22	25	17,5	—	30	д.	3000	50
»	340	1	19	20	25	16,5	—	30	д.	3100	50
»	350	5	25	20	24	17	—	27	д.	2700	50
»	371	1	18	23	25	17	—	28	м.	2850	50
»	388	3	22	24	25	17	—	28,5	д.	3000	49
»	393	1	25	23	27	17,5	—	30	д.	3500	49
»	399	3	26	24,5	26	16,5	—	27,5	д.	3500	50
»	403	1	27	20	25	16,5	—	27,5	м.	3100	50
»	408	1	26	25	27	16	—	29	д.	3150	52
»	409	2	26	24	26	17	—	29	д.	3600	53
»	410	7	29	22	25	16,5	—	28	д.	2900	50
»	444	1	26	23	25	17,5	—	30	м.	3100	51
»	450	2	35	22	24	16,5	—	21	д.	2800	51
»	459	5	29	23	25	16	—	27,5	д.	3100	50
1892	4	13	39	21	22	17,5	—	29	д.	4000	55

Г О Д Ъ.

№№ родовъ.

Который разъ
беременна.

Возрастъ роже-
ницы.

Sp. il.

Cr. il.

Conj. ext.

Conj. diag.

Troch.

Р А З М Ъ Р Ы Г Л А З А.

Полъ.

Вѣсъ.

Длина.

М Л А Д Е

Н Е Ц Ъ.			Положеніе п л о д а.	Течение родовъ, ихъ продолжительность, терапия.	Послѣродовой п е р і о д ъ.
Окружность головки.		Живой или мертвой.			
Прямая.	Косая.				
33	39	Живой	2 зат. зад. в.	6 ч.	Norma.
33	37	»	2 » » »	7 час.	»
34	38	»	2 » » «	10 ч. 45 м. Пуз. вскр.	Двукратное повыш. t° (max. 39,1).
33	37	»	1 зат. пер. в.	9 ч. 45 м.	Norma.
31	36	»	2 » зад. »	37 час.	»
33	40	»	1 » пер. »	13 ч. 10 м.	Двукратное повыш. t°
35	40	»	2 » зад. »	9 ч. 35 мин.	Трехкратное повыш. t° (max. 38,3).
34	36	»	2 » » »	4 ч. 20 м.	Norma.
32	37	»	2 » » »	6 ч. 38 м. Пуз. вскр.	»
33	39	»	2 » » »	7 ч. 35 м.	»
—	—	Асфикс. неожив. живой	2 » » »	24 ч. 05 м.	Множкратное повыш. t° (Parametr.).
33	37	»	1 » пер. »	17 ч. 30 м.	Norma.
31	35	»	2 » зад. »	4 час.	Norma.
33	39	»	1 » пер. »	4 час.	»
34	38	»	1 » » »	22 ч. 23 м. Debilitas dolorum. Forceps. Ruptura vaginae.	»
33	37	»	2 » зад. »	15 ч. 10 м.	»
34	39	»	2 » » »	12 час. 15 мин. Debilitas dolorum. Forceps. Ruptura perin. inc. 2-ord.	«
33	39	»	1 » пер. »	8 ч. 48 мин.	»
34	40	»	1 » » »	4 часа.	»
33	38	»	2 » зад. »	10 ч. 40 м.	»
34	38	»	2 » » »	21 ч. 28 ч. Debilitas dolorum. Forceps. Ruptura perineii.	»
33	36	»	1 » пер. »	15 ч. 15 м. Forceps.	1-кратное повыш. t° до 38,3°.
33	38	»	1 » » »	3 ч. 40 м.	1-кратное повыш. t° до 38,3°.
36	41	»	1 » « »	4 ч. 58 м.	Norma.

Г О Д Ъ.	Мѣ родовъ.	Который разъ беремена.	Возрастъ роженицы.	РАЗМѢРЫ ТАЗА.					М Л А Д Е		
				Sp. il.	Cr. il.	Conj. ext.	Conj. diag.	Troch.	Полъ.	Вѣсъ.	Длина.
1892.	16	1	27	27	28	17	—	31	д.	3000	50
»	18	1	26	19	23	17	—	27	д.	3000	50
»	37	11	44	19	24	17,5	—	28	м.	3000	50
»	49	2	19	23	25,5	16	—	28	д.	3300	—
»	56	1	27	24	26	17,5	—	29	д.	3000	52
»	62	2	29	24	25	16	—	28	м.	3000	50
»	85	6	38	23	26	17,5	—	29	д.	3000	48
»	88	2	29	22	23	16	—	25,5	д.	3200	47
»	93	1	33	23	26	17,5	—	30	м.	3150	50
»	105	8	36	19	23	17	—	28	м.	3700	52
»	114	1	38	21	26	17,5	—	31,5	м.	2900	50
»	112	5	31	21	23	15	—	25	д.	1700	43
»	117	4	33	20	24	17	—	28	д.	1900	—
»	118	1	20	20	24	17,5	—	29,5	д.	2800	52
»	129	2	32	24	27	17	—	30	м.	3100	50
»	130	1	21	22	25	17	—	29	д.	2700	50
»	139	3	37	23	25,5	17,5	—	28,5	м.	2800	48
»	137	2	29	22	25,5	15	—	27	д.	3800	51

¹⁾ Мы взяли на себя смѣлость изложить in extenso весь нашъ матеріалъ по узкому таѣ въ качествѣ главнаго матеріала объ одной изъ важнѣйшихъ главъ практическаго акушерства, къ ученію чего, конечно, нельзя было-бы сдѣлать при обычномъ изложеніи однихъ лишь итоговъ.

Н Е Ц Ъ.			П о л о ж е н и е п л о д а.	Теченіе родовъ, ихъ продолжительность, терапия.	Послѣродовой періодъ.
Окружность головки.		Живой или мертвый.			
Прямая.	Косая.				
32	38	Живой.	1 зат. пер. в.	7 часовъ.	38,6 кратное повыш. до Norma.
34	38	»	1 » » »	11 ч. 45 м. Ruptura vaginae.	
34	38	»	1 » » »	21 ч. 20 м. Судорож- ныя боли. Медленное откр. зѣва. Поворотъ.	»
—	—	»	1 » » »	8 ч. 15 м	»
35	38	Мертвый	2 зат. зад. в.	11 ч. 25 м. Раннее излитіе водъ. Сильныя боли; чрезм. Naegele'вск. сгибан. гол. Forssers.	»
35	39	» живой.	1 » » »	4 ч. 59 м.	»
38	40	»	2 » » »	29 ч. 5 мин.	»
32	37	»	2 » » »	3 ч. 50 мин.	»
34	38	»	2 » » »	20 часовъ.	Многokr. пов. t° до 40,4 Endometr. puerperalis. Norma.
36	40	»	2 » » »	6 ч. 55 м. Пуз. вскр.	
35	38	»	1 зат. пер. в.	47 ч. 30 мин. Ruptura perin. incompl. 2-й степ.	38,2. 1-кратное повыш. t°
30	33	»	2 зат. зад. в.	13 ч. 10 мин.	
—	—	мацериров.	1 » » »	9 ч. 35 мин.	»
34	39	живой	1 » » »	9 ч. 35 мин.	»
35	38	»	2 » » »	15 ч. 50 мин. пуз. вскрыть.	»
35	37	»	2 зат. зад. в.	9 ч. 43 мин.	»
33	39	»	1 зат. пер. в.	5 ч. 35 мин.	»
35	40	»	2 зат. зад. в.	11 ч. 45 мин.	3-кратное повыш. t° 39,1)

тъ можетъ, мы заняли слишкомъ много мѣста. Оправданіемъ этому служить то обстоятельство, что
дахъ при узкомъ тазѣ, намъ хотѣлось представить наши данныя возможно полнѣе и нагляднѣе.

Неправильности со стороны мягких родовых путей.

Отекъ большихъ губъ и вульвы въ рѣзкой формѣ наблюдался три раза, при чемъ въ одномъ случаѣ были одиночные срочные роды, безъ всякихъ осложнений; въ другомъ была eclampsia у первородящей (общій отекъ) и наконецъ у третьей больной, подробно описанной мною въ другомъ мѣстѣ ¹⁾, послѣ наложенія щипцовъ умѣренный отекъ большихъ губъ и промежности, существовававшій до родовъ, быстро увеличился до громадныхъ размѣровъ.

Вафикозныя расширенія большихъ губъ у многородящей (одновременно съ расширеніемъ подкожныхъ венъ внутренней поверхности бедра и голеней) встрѣтился намъ въ рѣзкой формѣ однажды.

Жировикъ большой лѣвой губы величиной со сливу встрѣтился у 34-лѣтней VI—para. Продолжительность родовъ равнялась 3 ч. 35 м., послѣродовой періодъ—погта.

Выпаденіе обѣихъ стѣнокъ влагалища у многородящей въ сильной степени (одновременно существовалъ старый разрывъ промежности) также мы наблюдали всего одинъ разъ. Обѣ стѣнки sub partu представлялись отечными. Слабость болей. Роды затянулись. Въ другомъ случаѣ, у II—para, небольшое выпаденіе обѣихъ стѣнокъ влагалища существовало одновременно со старымъ разрывомъ промежности.

Ригидность и нерастяжимость зѣва въ рѣзкой формѣ встрѣтились два раза, оба у второродящихъ.

Отечность зѣва въ эквизитной формѣ также мы наблюдали дважды, обѣ роженицы были первородящія.

Неправильности изгоняющихъ силъ.

Слабыя боли въ чистой формѣ встрѣтились 101 разъ, при чемъ на долю I—para пришлось 46 случаевъ, II—para—15 и III—para 40 сл. Возрасты роженицъ были: до 20 лѣтъ—6, отъ 21—30—66 сл., отъ 31—40—25 сл., старше 41—4. Головныхъ положеній плода было—99, тазовыхъ—8. Двоенъ—6. Изъ осложнений во время родовъ отмѣчено: узкій тазъ—14 разъ, раннее отхожденіе водъ 10, многоводіе 12, отекъ зѣва два раза. Въ 45 случаяхъ потребовалось оперативное вмѣшательство, а именно: щипцы—въ 35 сл., экстракція высокая два раза, внутренній поворотъ на ножку—два раза, solutio placentae man.—2 раза, кольцеиринтеръ—два раза и кровавое расширеніе зѣва—два раза. Вся продолжительность родовъ была:

¹⁾ Къ казуистикѣ уродствъ плода. Журналъ Акушерства и Женскихъ болѣзней. Томъ IV, № 10 (1890 г.).

у I—	рага	23 ч.	24 м.	(больше общей на 7 ч. 19 мин.).
у II—	>	14 >	39 >	(> > > 6 > 04 >
у M—	>	17 >	40 >	(> > > 8 > 37 >

Родилось младенцев 107, из них мальчиков 55 и девочек 52; живых 98, мертвых 8 и мацерированных 1.

Послѣродовой періодъ у матерей въ 62 случаяхъ протекалъ безъ повышения t° (61,3 $^{\circ}$ /о), въ 13 случаяхъ было 1-кратное повышение t° , въ 4-хъ двукратное и въ 22 (21,7 $^{\circ}$ /о) многократное. Изъ послѣдней категоріи 10 родильницъ болѣли послѣродовою формою (10 $^{\circ}$ /о) и 4 непослѣродовою. Умерла одна родильница отъ септического перитонита (1 $^{\circ}$ /о).

Судорожныя боли наблюдались у 15 роженицъ: I—рага—10, II—рага—3 и M—рага—2. Между 21—30 годами было 12, 31—40—одна и старше 41 г. двѣ. Во всѣхъ 15-ти случаяхъ было головное предлежаніе. Узкій тазъ наблюдался въ 4-хъ случаяхъ, многоводіе во 2-хъ, раннее излитіе водъ въ 3-хъ. Изъ оперативныхъ пособій примѣнено: щипцы—1 разъ, поворотъ—2 раза, кровавое расширеніе зѣва 1 разъ и кольпейринтеръ—1 разъ.

Роды продолжались:

у I	рага.	36 ч.	54 м.	(больше средн. на 20 ч. 49 м.).
у II	>	10 ч.	04 м.	(тоже > > 1 ч. 29 м.).
у M	>	9 ч.	47 м.	(тоже > > 0 ч. 44 м.).

Родилось младенцевъ 15. (мальчиковъ 5, девочекъ 10). Живыхъ 14, мацерированный—1.

Изъ терапевтическихъ средствъ при слабыхъ боляхъ употреблялись ванны, массажъ матки, горячіе души, хининъ. При неправильныхъ же судорожныхъ боляхъ—*narcotica*, преимущественно прямокишечныя *suppositoria* съ морфіемъ. Мы видѣли также хорошій успѣхъ отъ продолжительныхъ теплыхъ ваннъ (29 $^{\circ}$ R).

Неправильности механизма родовъ.

Головка плода родилась въ заднемъ видѣ въ 19 случаяхъ, а именно: у 6 первородящихъ, 6 второродящихъ и 7 многородящихъ; 7 разъ при 1-омъ затылочномъ положеніи и 12 при второяхъ. Изъ 19 родовъ 16 были срочные и 3 недоношенные. Въ 8-ми случаяхъ роды были окончены щипцами. Въ двухъ случаяхъ кромѣ того головка при помощи щипцовъ переведена изъ задняго вида въ передній.

Недостаточный внутренній поворотъ головки наблюдался въ трехъ случаяхъ, у 1-ой первородящей и у двухъ второродящихъ. Въ двухъ случаяхъ головка родилась въ косомъ размѣрѣ и одинъ разъ въ поперечномъ. Всѣ роды были срочные.

Чрезмѣрный внутренній поворотъ головки отмѣченъ въ 30 случаяхъ: у 12-ти первородящихъ, 8-ми второродящихъ и 10-ти многородящихъ.

Въ 27 случаяхъ плодъ былъ доношенъ, въ 3-хъ были преждевременные роды.

Чрезвычайное Naegелевское сгибание головки встрѣтилось всего пять разъ, 3 раза у первородящихъ и 2 раза у второродящихъ. Въ двухъ случаяхъ было 1-ое затылочное положеніе и въ трехъ—второе. Въ четырехъ случаяхъ были срочные роды, въ 1 случаѣ преждевременные. Одинъ разъ были наложены щипцы ¹⁾.

Плечики прорѣзались въ поперечномъ размѣрѣ выхода таза въ 64 случаяхъ, а именно у 11 первородящихъ, 17 второродящихъ и 36 многородящихъ. Въ 62 случаяхъ роды были доношенные, въ двухъ преждевременные. Въ 1 случаѣ роженица поступила въ пріютъ съ родившейся уже головкою плода.

Неправильности членорасположенія плода.

Лобное положеніе встрѣтилось намъ всего два раза, что на все число родовъ (1921) составитъ лишь 0,10%. Въ одномъ случаѣ эта аномалія наблюдалась у 29-ти лѣтней женщины, рожавшей въ 4-й разъ. Распознано 2-е лобное положеніе задній видъ. Въ этомъ видѣ и родился живой младенецъ женскаго пола, вѣс. 3000 grm. Въ послѣродовомъ періодѣ наблюдалось 2-кратное повышеніе t° до 38,5 вслѣдствіе нагрубанія груди. Въ другомъ случаѣ лобное положеніе наблюдалось при двойняхъ у 2-го плода (1-е лобное передній видъ). Роженица I—para, 21 г. Тазъ 24;27; 19,5; 33. Роды совершились силами природы, безъ всякихъ затрудненій. Родился живой доношенный младенецъ женскаго пола, вѣсомъ въ 2500 grm. Произшедшій во время родовъ неполный разрывъ 2-й степени зашитъ lege artis. У матери въ puerperium—однократное повышеніе t° до 38,1.

Лицевыя положенія.

Случаевъ этой аномаліи мы имѣли восемь, что составляетъ 0,41%. Изъ восьми роженицъ трое рожали въ первый разъ (возрастъ: 19,32, 34 г.), трое во второй (27, 37 и 43 г.), одна въ пятый разъ (33 л.) и одна въ восьмой (36 л.). Всѣ роды были срочные. Conjugata externa въ 17 сант. была 1 разъ, въ 17,5—1 разъ, въ 18 с.—1 разъ, въ 19 сант.—4 раза и въ 20 с.—1 разъ.

Виды лицеваго положенія были:

1-е лицевое передн. видъ	4
1-е » задн. »	2
2-е » передн. видъ	1
1-е » задн. »	1

¹⁾ Этотъ случай подробно описанъ мною въ статьѣ «Къ казуистикѣ уродствъ плода». Журналъ Ак. и Ж. бол. Томъ IV, № 10 (1890 г.).

Двойни наблюдались въ одномъ случаѣ (лицевое положеніе 2-го плода съ выпаденіемъ лѣвой ручки; роды окончены поворотомъ на ножки).

Продолжительность родовъ у I—para—26 ч. 14 м. (т. е. больше общей средней на 10 ч. 09 м.); у II—para—9 ч. 11 м. (т. е. больше на 36 м.) и у M—para 29 ч. 42 м. (больше на 20 ч. 39 м.).

Такимъ образомъ изъ изложенныхъ выше данныхъ мы видимъ, что лицевыя положенія встрѣчались по преимуществу у молодыхъ роженицъ (средній возрастъ равняется 32,6), что въ 25% имѣлось суженіе таза въ прямомъ размѣрѣ входа и что роды оказались значительно затянувшимися сравнительно съ нормой.

Изъ операций при лицевыхъ положеніяхъ было примѣнено: поворотъ на ножку 1 разъ, щипцы—1 разъ, зашивание разрыва промежности—3 раза. Изъ осложненій отмѣчено: многоводіе 1 разъ, запрокидываніе ручекъ за спинку—1 разъ, обвитіе пуповины около шеи два раза—1 разъ. Всего родилось: мальчиковъ 4, дѣвочекъ 4. Всѣ плоды живые. Средній вѣсъ плода: мальчика=3487, дѣвочки=3575 грм.

Нормально провели послѣродовой періодъ 4 родильницы (50%), одна лихорадила 1 разъ, одна—два раза и двѣ многократно: обѣ болѣли пuerperальнымъ параметритомъ (25%).

Въ заключеніе главы о лицевыхъ положеніяхъ считаемъ не безинтереснымъ привести двѣ исторіи родовъ при заднихъ видахъ лицевыхъ положеній, изъ которыхъ одни окончились силами природы, а другіе потребовали оперативной помощи.

Случай первый. 10-го янв. 1891 г., въ 1 ч. 20 мин. н., въ пріютъ принята Аннася И—ва, 27 л. отъ роду, крестьянка. II—para. Послѣдніе роды 1 г. т. н. протекли хорошо. Послѣднія регулы въ февралѣ 1891 г. При изслѣдованіи шейка сглажена, открыта на 2½ пальца, пузыря нѣтъ, предлежитъ головка (лицевое положеніе) t°—36,7, пульсъ—70, дых. 26. Тазъ: 23; 25,5; 20, troch. 29.

2 ч. н. Когда роженица вышла изъ ванны и переведена была въ родильную, тамъ распознано первое лицевое положеніе, задній видъ, при чемъ длинникъ лица приближался къ поперечному діаметру входа. Головка стояла довольно высоко (во входѣ въ малый тазъ) и была умѣренно подвижна.

3 ч. 45 м. н. Длинникъ лица совпадаетъ съ правымъ косямъ размѣромъ. Головка опустилась нѣсколько ниже, но все еще подвижна. Матка открыта пальца на 4.

5 ч. 15 м. н. Схватки хорошія. Сердцебіеніе плода ясное. Края зѣва еще прощупываются. Головка опускается, но все еще удерживаетъ подвижность. Во взаимныхъ отношеніяхъ головки къ тазу измѣненій нѣтъ. Попытка произвести флексію головки наружно-внутренними приѣмами осталась безъ результата.

7 ч. 15 м. у. Положеніе безъ измѣненій. Въ виду слабой наклонности головки перейти подбородкомъ къ лонному сращенію и истощенія роженицы рѣшено было, прождавъ еще немного, кончить роды путемъ операціи.

Въ 8 ч. утра были правильнѣе и сильнѣе.

Въ 9 ч. у. во время схватокъ головка опускается, напирать на промежность. Въ 9 ч. 10 м. совершился внутренній поворотъ головки подбородкомъ

къ лонной дугѣ и роды совершились по обычному механизму для лицевыхъ положеній.

Случай второй. 28 марта 1891 г. въ 5 ч. 30 м. н. поступила къ родамъ Марина В—ва, солдатка, прислуга, 37 лѣтъ. II пара. Тазъ 22,5; 25, conj. ext 17, tr. 27. При внутреннемъ изслѣдованіи шейка почти сглажена, зѣвъ открытъ на палецъ, воды стоятъ, предлежить головка; t° 37,5, пульсъ 68. дх. 28. Послѣ ванны роженица переведена въ родильную комнату и здѣсь поставленъ діагнозъ лицевого положенія, при чемъ точный діагнозъ (благодаря малому открытію шейки и пузыря), могъ быть выясненъ лишь при дальнѣйшемъ теченіи родовъ. Оказалось, что подбородокъ находится у *supr. sacroiliaca dextr.*, а лобъ у *tuberc. il.-pub. sin.*, т. е. длинникъ лица расположился по правому косому разбѣру. Такъ какъ родовыя боли были хорошія, то роды велись выжидательно, пока въ 10 ч. 25 м. утра (зѣвъ на 2 поп. пальца) не появился припадокъ *эклампси*. Вдыханіе хлороформа успокоило этотъ припадокъ, въ общемъ оказавшійся средней силы. Въ дальнѣйшемъ открытіе матки подвигалось, хотя и весьма медленно. Припадки *эклампси* не повторялись. Въ 3 ч. 30 м. дня въ виду прекращенія дальнѣйшаго открытія матки, въ виду истощенія роженицы, а главное въ виду того, что головка не выходила изъ своего положенія, указанного выше, рѣшено было сдѣлать попытку замѣнить сказанное стояніе головки наиболее удобнымъ для прохождения черезъ родовой каналъ. Полный хлороформенный наркозъ. Попытка сдѣлать поворотъ на ножку не удалась, благодаря сильному тоническому состоянію *Contractionsring'a*. Равнымъ образомъ оказалась безуспѣшной попытка сдѣлать флексію головки, т. е. предоставленная сама себѣ она возвращалась къ прежнему положенію. Единственно чего достигли мы ручными манипуляціями съ предлежащей частью—это то, что головка была переведена въ поперечное стояніе. Въ виду того, что дальнѣйшее выжиданіе въ ходѣ родовъ могло бы оказаться опаснымъ для матери и плода,—рѣшено было кончить роды щипцами. Они были наложены въ прямомъ разбѣрѣ, и легли безъ особыхъ затрудненій. Послѣ нѣсколькихъ тракцій, когда головка уже оказалась нѣсколько болѣе опущена, а длинникъ сталъ приближаться къ лѣвому косому разбѣру,—щипцы были переложены въ правой косой разбѣрѣ и въ этомъ разбѣрѣ оставались до конца родовъ. Вся операція заняла 14 минутъ и въ общемъ оказалась довольно трудной. Въ 4 ч. 20 м. дня родилась въ асфиксін, но скоро была оживлена доношенная дѣвочка вѣсомъ въ 2500 grm.; полость матки промыта растворомъ *acid. carb. 2%*, а на животъ положенъ ледъ; послѣоперационный періодъ прошелъ безъ повышеній t° (не было выше 37,3), роженица выписана здоровой на 6-я сутки вмѣстѣ съ ребенкомъ. Случай этотъ представляется намъ поучительнымъ. Еще до сихъ поръ въ акушерствѣ преобладаетъ мнѣніе, что накладываніе щипцовъ при заднихъ видахъ лицевыхъ положеній, когда подбородокъ обращенъ къ крестцу или находится у конца *diam. transversi*, не ведетъ ни къ чему и что въ такихъ случаяхъ, тамъ, гдѣ попытка сдѣлать поворотъ на головку, равно какъ замѣна лицевого положенія лобнымъ или затылочнымъ—оказываются неудачными, приходится прибѣгать къ перфорацин. Въ нашемъ случаѣ перфорация тѣмъ болѣе оказывалась показанной, что мы имѣли мѣсто съ общесъуженнымъ плоскимъ тазомъ, при наружной конъюгатѣ въ 17 сант. Успѣхъ нашей операціи (щипцы) мы объясняемъ малыми разбѣрами совершенно, однако, доношеннаго плода и самымъ способомъ послѣдовательнаго перекладыванія щипцовъ послѣ того, какъ головка, благодаря влеченію щипцами, вышла изъ своего поперечнаго стоянія.

Задержаніе большихъ частей плодныхъ оболочекъ.

Эта аномалія на все число родовъ имѣла мѣсто въ 134 случаяхъ (6,9%), изъ которыхъ 44 приходится на долю первородящихъ, 32 на долю второродящихъ и 58—многородящихъ. Въ 124 случаяхъ роды были срочные, въ 10-ти преждевременные. Въ 16 случаяхъ оболочки въ послѣродовомъ періодѣ выдѣлились сами собой. Въ послѣродовомъ періодѣ—92 находились въ нормальномъ состояніи, 11 лихорадили однократно, восемь двукратно и 23—многократно. Изъ лихорадившихъ многократно—десять женщинъ болѣло послѣродовыми болѣзнями (endometritis puerp.—6, parametritis—4), двѣ болѣли непослѣродовыми болѣзнями (тифъ и илеверитъ). Остальныя повышенія обязаны различнымъ скоро преходящимъ причинамъ (трещины сосковъ—7, налеты на ссадинахъ губъ—1 разъ, запоръ—1 разъ и пр.).

Терапія при задержаніи оболочекъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ была исключительно выжидательная. При повышеніи 1° принимался ледъ на нижнюю часть живота; при появленіи запаха въ лохіяхъ—матка промывалась кромѣ того дезинфицирующими растворами.

(Продолженіе слѣдуетъ).