

Въ теченіе болѣе 10 лѣтъной моей практической акушерской дѣятельности и руководился въ отношеніи употребленія хлороформа при родахъ принципами выработанными мною въ Новивальномъ Инст. и могу только сказать, что хлороформъ оказывалъ неоцѣнимыя услуги при чувствительныхъ боляхъ, мало мальски неправильныхъ боляхъ и т. д. и никогда я не видѣлъ какихъ либо непріятныхъ осложнений.

Референтъ.

123. Newmarch. Retroflexion of gravid uterus. — Hyperdistension of bladder. — Cystitis. — Cystotomy. — Recovery. (Austral. Med. Gazette, Jan. 15. 1892). **Ретрофлексія беременной матки. — Чрезмѣрно растянутый мочевой пузырь. — Циститъ. — Цистотомія. — Выздоровленіе.**

М. С. 32 лѣтъ; поступила въ госпиталь 30-го іюля 1891 г. До сихъ поръ пользовалась хорошимъ здоровьемъ; мать пяти здоровыхъ дѣтей; теперь вновь беременна на 5—6 мѣсяцѣхъ. Двѣ недѣли тому назадъ животь сталъ быстро расти, появились болѣе частыя позывы на дефекацію, боли въ животь, моча стала давать ощущеніе жженія.

При изслѣдованіи величина живота равна концу беременности; ясная флюктуация; самопроизвольно истекающая *per urethram* моча съ сильнымъ амміачнымъ запахомъ; пульсъ 118, $t^{\circ}=100^{\circ}$. *Per vaginam* ощупывается эластическая, подвижному флюктуирующая опухоль, выполняющая собою все влагалище и задній *cul-de-sac*. Катетеромъ выведено $5\frac{1}{2}$ унцъ кровавой, чрезвычайно зловонной амміачной мочи. Послѣ этого исправлено положеніе перегнутой къзади матки, и лѣченіе назначено выжидательное. Моча продолжала вытекать самопроизвольно.

9-го августа 6-ти мѣсячный выкидышъ съ грознымъ кровотеченіемъ; наркозъ, — извлеченіе плаценты. Гвога послѣ всякой шаги; зловонное выдѣленіе *per vaginam*; сильнѣйшая анемія и истощеніе. Мочи можеть удерживать только 5 унцъ; она продолжаетъ по кашиямъ истекать до $38\frac{1}{2}$ унцъ въ сутки; но характеръ мочи постепенно мѣняется: кровь по немногу исчезаетъ и въ ней появляется гной.

5-го сентября въ отверстіе мочеиспускательнаго канала вставился большой доскутъ оболочки, препятствовавшій введенію катетера. По удаленіи части его введенный палець легко ощупалъ значительный доскутъ, только частью отдѣлившійся. На слѣдующій день подъ наркозомъ произведена цистотомія чрезъ влагалище. Изъ дня въ день удалялись куски оболочки.

16-го сентября выдѣленіе ключевъ прекратилось, гной изъ мочи исчезъ, зловоніе меньше; общее состояніе значительно лучше. Моча удерживается до извѣстнаго количества; влагалищная рана подвижному зажила.

23-го октября по собственному желанію была выписана, хотя моча продолжала по временамъ вытекать самопроизвольно по каплямъ.

При новомъ изслѣдованіи черезъ нѣсколько дней по вышкѣ автору удалось отыскать во влагалищной ранѣ крошечное съ булавочную головку отверстіе, черезъ которое и сочилась моча. По наложеніи шва на него наступило полное выздоровленіе.

Ф. Кюнъ.