

и истонченной брюшины недостаточна для такой задачи, и кровь и содержимое трубы извергаются въ брюшную полость. Итакъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ мы не смѣемъ надѣяться на самопроизвольную остановку кровотечения и, въ виду грозящей опасности, обязаны немедленно приступить къ операціи для перевязки кровоточащихъ сосудовъ.

Бываютъ однако случаи, гдѣ вышедшій изъ трубы, черезъ разрывъ или безъ онаго, плодъ достигаетъ періода жизнеспособности прежде, чѣмъ пациентка подпадаетъ подъ наблюденіе врача. Въ такихъ случаяхъ плодъ пріобрѣтаетъ права, которыя мы обязаны уважать, и матерямъ должно позволить донашивать до срока подъ условіемъ, конечно, самаго тщательнаго наблюденія со стороны врача, который въ каждый данный моментъ долженъ быть вполне подготовленъ къ операціи.

Что касается вопроса объ удаленіи и другой трубы, то авторъ склоняется въ пользу удаленія ея. Въ большинствѣ случаевъ, говоритъ онъ, трубная беременность зависитъ отъ *salpingitis desquamativa*, которая обыкновенно поражаетъ обѣ стороны, и въ интересахъ больной, чтобы предупредить возможность новой *graviditatis tubariae*, слѣдуетъ удалить и другую трубу, если она представляетъ какія либо патологическія измѣненія и если состояніе пациентки допускаетъ произведеніе операціи.

Наконецъ авторъ настаиваетъ на замѣнѣ общепринятаго въ случаяхъ разрыва названія «шока» словомъ «кровотеченіе» («*haemorrhage*»). При настоящемъ «шокѣ» (напр. при желѣзнодорожномъ крушеніи «шокъ» безъ мѣстныхъ или общихъ поврежденій) первенствующую роль играетъ сотрясеніе, а при разрывѣ трубы внезапное кровотеченіе со всеми его послѣдствіями для кровеносной системы и дыхательнаго аппарата. Словомъ, и причина и слѣдствія въ обоихъ этихъ случаяхъ такъ рѣзко различаются, что примѣненіе одного и того же названія для обоихъ случаевъ, по мнѣнію автора, неудачно и ничѣмъ не оправдывается.

Ф. Кюнь.

126. A. Edis. Abstract of a lecture on the treatment of metrorrhagia.
(Brit. Med. Journ March 26. 1892). Къ вопросу о лѣченіи метроррагій.

Напомнимъ, что маточное кровотеченіе никогда не представляетъ самостоятельной болѣзни, а всегда служитъ лишь симптомомъ общаго или мѣстнаго заболѣванія, авторъ настаиваетъ на возможно тщательномъ въ каждомъ случаѣ метроррагій діагнозѣ, который и устанавливаетъ рачіональную терапію.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ болѣзней сердца умеренное маточное кровотеченіе не только не вредитъ, но даже улучшаетъ явленія со стороны сердца, и слѣдовательно спѣшить остановкою его въ подобныхъ случаяхъ было бы не цѣлесообразно. Различныя сердечныя средства (*kalium* или *natrium brom.*, *digitalis*, *strophantus* etc.) тутъ болѣе могущественны, чѣмъ *adstringentia* или *haemostatica*. То же должно сказать и о болѣзняхъ печени и почекъ, гдѣ терапія, направленная противъ основнаго страданія, сдѣлаетъ больше, чѣмъ специальное лѣченіе метроррагій. При

общих конституциональных страданиях лѣчение должно главнымъ образомъ направиться на поднятіе общаго питанія; здѣсь тонизирующія средства дадутъ лучший результатъ, чѣмъ кровоостанавливающія.

Изъ средствъ, дѣйствующихъ непосредственно противъ кровотеченій, авторъ называетъ: эрготинъ, который онъ считаетъ могущественнымъ средствомъ при всѣхъ способахъ его примѣненія; *hydrastis* есть цѣнный препаратъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ маточныхъ фиброидовъ, но онъ, по мнѣнію автора, еще мало испытанъ; *Hamamelis* тоже иногда полезенъ; хиппінъ и стрихнинъ вмѣстѣ или порознь рекомендуются въ тѣхъ случаяхъ, когда организмъ истощенъ повторными или продолжительными потерями крови. Препараты брома при геморрагическомъ хлорозѣ, раздражительности яичниковъ (*ovarian irritation*) и даже при *haematocele*, по автору, оказываютъ иногда большія услуги, чѣмъ *haemostatica*. *Canabis indica* имѣетъ тоже своихъ защитниковъ.

При грозныхъ и продолжительныхъ потеряхъ крови опій, особливо комбинированный съ хиппиномъ, даетъ поразительный восстанавлиющій эффектъ («*has a wonderful restorative effect*»). Желѣзо оказываетъ хорошія услуги при анеміи *resp.* гидреміи, происшедшей отъ предшествовавшихъ кровопотерь.

Изъ мѣстныхъ средствъ авторъ хвалитъ въ подходящихъ случаяхъ: горячіе влагалищныя души (110° — 115°), покойное горизонтальное положеніе, скарификаціи шейки матки. Ляминаріи или карболизованныя губки не только способствуютъ остановкѣ кровотеченій, но и облегчаютъ послѣдующее изслѣдованіе полости матки. Тампонацію влагалища («*plugging the vagina*») авторъ называетъ «способомъ бесполезнымъ и ненаучнымъ» («*a very useless and unscientific procedure*»), на который не должно полагаться. Если кровотеченіе продолжается, несмотря на всѣ примѣненныя нами средства, то не должно медлить расширеніемъ шейки и изслѣдованіемъ полости матки. Уже не разъ вскрытія слишкомъ поздно убѣждали гинекологовъ, что детальный исходъ могъ быть избѣгнутъ своевременнымъ болѣе энергическимъ вмѣшательствомъ, напр. удаленіемъ полиповъ матки, подслизистыхъ фиброидъ, фунгозныхъ разраженій или задержанныхъ продуктовъ беременности.

Ф. Кюнь.

127. Andrea F. Currier. Amputation of the vaginal portion of the cervix-uteri in cases of suspected carcinoma. (N. Y. Med. Journ. March. 12, 1892). Ампутація влагалищной части шейки матки въ случаяхъ подозрѣваемаго рака.

Успѣхъ хирургическаго лѣченія злокачественныхъ болѣзней матки сплошь и рядомъ зависитъ отъ ранняго распознаванія ихъ. Между тѣмъ какъ выскабливаніе, такъ и вырѣзаніе небольшого кусочка ткани для микроскопическаго изслѣдованія часто не даетъ достаточно точныхъ указаній ни на характеръ болѣзни, ни на степень ея распространенія. Поэтому во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ, благодаря неточности діагноза, мы поставлены въ необходимость выбирать или полное удаленіе матки («съ послѣдующимъ раскаяньемъ въ своей