

быть обращено на кровотечение, которое при известныхъ обстоятельствахъ всетаки можетъ угрожать жизни. Вообще же врачъ въ послѣродовомъ періодѣ подобныхъ случаевъ долженъ ограничиться выжиданіемъ.

XIV.

МЕДИЦИНСКІЙ ОТЧЕТЪ ПО ГАВАНЬСКОМУ РОДИЛЬНОМУ ПРИУТУ ЗА ВРЕМЯ СЪ 17 АВГУСТА 1888 Г. ПО 1 МАЯ 1892 Г.

Д-ра мед. В. Н. Массена,

врача-акушера Приюта.

(Продолженіе).

Роды.

На все число дѣйствительно совершившихся родовъ (1921) предлежанія и положенія были зарегистрированы въ 1909 случаяхъ. Изъ остальныхъ 20-ти родовъ—въ 10 случаяхъ положеніе констатировать не удалось, а въ 10 роды были уличны.

Изъ 1909 точно опредѣленныхъ положеній было:

вертикальных	1894
косыхъ и поперечныхъ . . .	15
	<u>1909</u>

т. е. одно поперечное, геср. косое положеніе приходилось на 126,2 вертикальныхъ.

Изъ вертикальныхъ было:

предлежаній головнымъ концемъ	1809
» тазовымъ »	85
	<u>1894</u>

т. е. одно предлежаніе тазовымъ концомъ приходится на 21, 29 головныхъ

Средняя *продолжительность* родовъ была:

у первородящей	16 ч. 05 м.
у второродящей	8 » 35 »
у многородящей	9 » 03 »

Средняя продолжительность родов вообще у всѣхъ роженицъ равнялась 11 ч. 20 мин.

Роды продолжались ¹⁾:

	I—рага.		II—рага.		M—рага.		Всего.
	Число случаевъ.	‰	Число случаевъ.	‰	Число случаевъ.	‰	
Меньше 6 часовъ.	48	9,16	152	32,06	342	37,8	542
6—12 часовъ.	157	20,4	206	43,45	359	38,8	722
12—24 часовъ.	239	45,6	97	20,46	175	18,9	511
болѣе 24 часовъ.	79	1,52	15	3,16	28	3,03	121
Неопредѣлено.	1	1,90	4	0,84	20	2,17	25
	524	—	474	—	923	—	1921

Эта таблица лишній разъ иллюстрируетъ намъ, какъ съ числомъ предшествующихъ родовъ укорачивается длительность акта дѣтороженія. Въ то время какъ почти половина I—рага (45,6‰) разрѣшаются въ теченіе 12—24 часовъ, а большинство (67‰) тратитъ на этотъ актъ никакъ не менѣе 6—24 часовъ, II—рага въ количествѣ почти $\frac{1}{3}$ тратитъ на это не болѣе 6 часовъ и въ главной своей массѣ (75,51‰) не болѣе 12 часовъ, M—рага въ количествѣ 37,8‰ оканчиваютъ свои роды меньше чѣмъ въ 6 часовъ, а большинство (76,6‰) во всякомъ случаѣ скорѣе чѣмъ въ 12 часовъ.

По времени сутокъ роды распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	I—рага.	II—рага.	M—рага.	Всего.
Отъ 6 ч. у.—12 дня.	134	122	224	480
» 12 ч. д.—6 вечера.	118	101	204	423
» 6 ч. в.—12 ночи.	147	110	226	483
» 12 ч. н.—6 утра.	125	138	258	521
Неизвѣстно.	—	3	11	14
Всего	524	474	923	1921

Т. е. больше всего родовъ произошло между 12 ч. н. и 6 ч. утра и меньше между 12 ч. дня и 6 ч. вечера. Maximum же количества родовъ у I—рага приходится на время между 6 ч. вечера и 12 ч. ночи, у II—рага же и M—рага между 12 ч. н. и 6 ч. утра больше всего.

¹⁾ Въ эту таблицу вошли также преждевременные роды и выкидыши.

Всѣхъ затылочныхъ положеній было 1798, что на общее число всѣхъ зарегистрированныхъ положеній (1909) составляетъ 94,2^o/о.

Виды затылочнаго положенія содержатся слѣдующимъ образомъ:

1-е положеніе передній видъ	1096
» » задній »	144, т. е. 1240
или 68,2 ^o /о всѣхъ затылочныхъ положеній.	
2-е положеніе передній видъ	114
» » задній »	444, т. е. 558
или 31,8 ^o /о всѣхъ затылочныхъ положеній.	

Сравнивая полученные нами данныя относительно взаимнаго отношенія между 1-мъ и 2-мъ видами затылочнаго положенія съ данными русскихъ авторовъ видимъ, что цифры наши почти идентичны съ цифрами *И. А. Вольфа* ¹⁾, который на 3154 затылочныхъ положенія первые виды имѣлъ въ 68,7^o/о, вторые—31,3^o/о. Изъ другихъ авторовъ къ нимъ довольно близко стоятъ цифры *Парышева* (69,3^o/о и 30,6^o/о) ²⁾ и *Агафонова* (69,8 и 30,2) ³⁾.

Предлежанія тазовымъ концомъ.

Предлежаній тазовымъ концомъ у насъ встрѣтилось (за исключеніемъ, разумѣется, многоплодныхъ родовъ)—*шестнадцать одно*, что на все число (1909) точно опредѣленныхъ предлежаній составляетъ 3,19^o/о, или одно предлежаніе тазовымъ концомъ приходится на 31,3 другихъ предлежаній. Исключивъ же изъ общаго числа неправильныя предлежанія въ количествѣ 14-ти (см. дальше), получимъ, что одно тазовое предлежаніе приходится на 31,06 правильныхъ предлежаній.

Изъ цифръ авторовъ, вычислившихъ при аналогичныхъ съ нами условіяхъ частоту тазовыхъ предлежаній, къ нашимъ даннымъ болѣе всего приближаются цифры *Львова* ⁴⁾, опредѣлившаго ^o/о тазовыхъ предлежаній въ 3,2^o/о, *Столыпинскаго* ⁵⁾ и *Ескова* ⁶⁾ съ 3,3^o/о и наконецъ *Шмидта* ⁷⁾ съ 3,4^o/о.

¹⁾ *И. А. Вольфъ*. Медицинскій Отчетъ акушерскаго отдѣленія клиники акушерства и женскихъ болѣзней при В. М. Академіи. 1891. Дисс.

²⁾ *Д. А. Парышевъ*. Мед. Отчетъ акуш. отдѣленія Академической акушерско-гинекологической клиники. 1887. Дисс.

³⁾ *С. И. Агафоновъ*. Мед. Отчетъ акушерской клиники проф. *Славянского* съ 1877—1884.

⁴⁾ *И. Львовъ*. Мед. Отчетъ по родильному отдѣленію казанской губернской больницы съ 1889—1890 г.

⁵⁾ *Г. А. Столыпинскій*. Мед. отчетъ акуш. клиники проф. *Феноменова* съ 1876—1887 г.

⁶⁾ *С. И. Есковъ*. Отчетъ о движеніи родовъ по Гаваньскому родильному Приюту за 1887—1888 г.

⁷⁾ *А. Э. Шмидтъ*. Мед отчетъ Маріинскаго Родовспомогательнаго Дома съ 1870—81. Спб. 1886 г.

Изъ всего числа рожениць съ тазовымъ предлежаніемъ 14 рожало въ первый разъ (22,9%) и 47 повторно (77,1%) или отношеніе было какъ 1:3,3.

По возрасту роженицы располагаются слѣдующимъ образомъ.

	I—рага.	% общаго числа.	II—рага.	% общаго числа.
Менѣе 20-ти лѣтъ	2	3,2%	2	3,2%
20—25 »	5	8,2%	8	13,2%
26—30 »	5	8,2%	13	21,4%
31—35 »	2	3,2%	15	24,7%
36—40 »	—	—	8	13,1%
болѣе 40 <	—	—	1	1,6%
Всего . . .	14	—	47	—

По виду тазовыя предлежанія расположились такъ:

1-е	ягодичное	передній видъ	—	17	} 46 = 75,4%
»	»	задній »	—	2	
2-е	»	передній »	—	10	
»	»	задній »	—	17	
1-е	ногоположеніе	передній »	—	7	} 15 = 24,6%
»	»	задній »	—	2	
2-е	»	передній »	—	4	
»	»	задній »	—	2	
					61

Большое количество околоплодныхъ водъ отмѣчено въ 4 случаяхъ, а узкій тазъ не наблюдался ни разу.

При ягодичныхъ предлежаніяхъ въ 16 случаяхъ было оказано оперативное пособіе, а именно экстракція высокая примѣнена 5 разъ, а обыкновенная 11 разъ. Такимъ образомъ % оперативныхъ родовъ при ягодичномъ предлежаніи = 26,2%. Въ остальныхъ случаяхъ помощь при родахъ ограничивалась легкимъ ручнымъ пособіемъ, главнымъ образомъ, конечно, при рожденіи головки. Въ трехъ случаяхъ дѣтское мѣсто оказалось приращеннымъ и потребовало искусственнаго его отдѣленія. Разрывы промежности произошли въ одиннадцати случаяхъ, что даетъ 18,03% ¹⁾. Въ числѣ осложнений при ягодичныхъ предлежаніяхъ мы имѣли два раза выпаденіе пуповины, то составляетъ 3,278%. Въ одномъ изъ этихъ случаевъ младенецъ родился живой, въ другомъ мертвый.

¹⁾ Какъ въ этомъ случаѣ, такъ и въ нѣкоторыхъ другихъ (см. далѣе) % разрывовъ промежности у насъ получился очень высокій. Это обстоятельство отчасти объясняется тѣмъ, что къ категоріи разрывовъ у насъ отнесены глубокія трещины входа и губъ, что мы имѣемъ обыкновеніе зашивать.

Исходъ родовъ съ тазовымъ предлежаніемъ относительно плодовъ былъ слѣдующій:

Который разъ родила.	Родилось живыхъ младенцъ.		Мертвыхъ.		Мацерированныхъ.		Итого.	
	Доношенныхъ.	Недоношенныхъ.	Доношенныхъ.	Недоношенныхъ.	Доношенныхъ.	Недоношенныхъ.	Доношенныхъ.	Недоношенныхъ.
I—рага.	7	3	5	—	—	1	12	4
II—рага.	5	5	1	—	—	5	6	10
M—рага.	16	3	3	1	—	6	19	10
Итого.	28	11	9	1	—	12	37	24
	39=63,8%		10=16,3%		12=19,9%		61	

Такимъ образомъ потеря дѣтей во время родовъ равна 16,3%.

Относительно матерей послѣдствія родовъ обнаружались слѣдующимъ образомъ:

Который разъ родила.	Количество родовъ.	Norma.	Лихорадило.		Болезнь послѣ родового формою.		Болезнь послѣ родового формою.		
			%	%	%	%			
I—рага.	14	11	78,5	3	21,4	2	1,4	1	0,7
M—рага.	47	33	70,2	14	29,7	12	25,5	2	4,2
Итого.	61	44	72,2	17	27,8	14	22,9	3	4,9

Косыя и поперечныя положенія.

Всѣхъ косыхъ и поперечныхъ положеній мы имѣли *четырнадцать*, что на общее число точно установленныхъ положеній и предлежаній (1609) составляетъ 0,73% или одно косое, resp. поперечное положеніе относится къ вертикальному какъ 1 : 136,(36). Найденное нами %ное отношеніе почти соответствуетъ среднему числу изъ данныхъ *Муратова* ¹⁾ для Петербурга и Москвы (0,76% и 0,68%).

¹⁾ *Муратовъ*. Матеріалы для акушерской статистики города Москвы. Двѣс.

Въ числѣ нашихъ неправильныхъ положеній у насъ встрѣтилось:

1-ое поперечное	передній	видъ	1
»	»	задній »	1
2-ое	»	передній »	3
»	»	задній »	6
1-ое косое	передній	»	3
			14

Переднихъ видовъ . . .	7	1-е положеніе . . .	5 разъ
Заднихъ » . . .	7	2-ое « . . .	9 »

По числу предшествовавшихъ родовъ роженицы были:

I—para . . . 3; M—para . . . 11

По возрасту:

Отъ 20—30 лѣтъ . . . 7; отъ 31—40 . . . 7.

Срочныхъ родовъ было 11; преждевременныхъ 3.

Узкихъ тазовъ не было. Многоводія также не наблюдалась ни разу. Въ одномъ случаѣ отмѣчено *uterus arcuatus* въ другомъ *uterus bicornis*. Въ одномъ случаѣ роды окончились самоизворотомъ. Въ остальныхъ потребовалось оперативное пособіе (поворотъ) подъ хлороформомъ, при чемъ въ шести случаяхъ воды излились до операціи и въ семи пузырь вскрытъ искусственно *sub operatione*. Поворотъ въ 12 случаяхъ совершенъ на одну ножку (семь разъ на правую и пять на лѣвую) и въ одномъ случаѣ на обѣ ножки. Полость матки промывалась послѣ операціи растворомъ $1/40^0/0$ сулемы, $2^0/0$ растворомъ *acidı carbol.*, растворами креолина или лизоля.

Въ одномъ случаѣ (IV—para, 22 л. отъ роду, преждевременные роды) дѣтское мѣсто оказалось приращеннымъ и потребовало операціи (*solutio placentae manualis*).—Въ одномъ случаѣ (I—para, 25 лѣтъ) было краевое предлежаніе *placentae*.

Изъ родившихся младенцевъ было:

Живыхъ доношенныхъ	7	} 9	} 14
« недоношенныхъ	2		
Мертвыхъ доношенныхъ	1	} 2	
» недоношенныхъ	1		
Мацерированныхъ доношенныхъ	2	} 3	
» недоношенныхъ	1		

Послѣоперационный періодъ у 10-ти протекъ совершенно безлихорадочно. Одна имѣла на 1-ыя сутки однократное (до 38,3) поднятіе t^0 , а 3 имѣли повторное повышеніе t^0 , зависѣвшее во всѣхъ случаяхъ отъ нагрубанія грудей и трещинъ сосковъ.

Двойни.

На все число родовъ (1921) наблюдался 51 случай двуплодной беременности, что составляет 2,65% или 1 роды двойнями приходится на 37,6) одноплодныхъ родовъ. Сопоставляя наши данныя съ данными *И. А. Вольфа*, вычислившаго (см. Дисс., стр. 31) среднюю цифру частоты двойней изъ 158533 родовъ и равную 1 : 46,56, видимъ, что нашему приюту пришлось имѣть дѣло съ двойнями несравненно чаще, чѣмъ это обыкновенно встрѣчается.

Изъ числа нашихъ роженецъ было:

I пара . . . 13	IV пара . . . 5	VIII пара . . . 1
II пара . . . 10	V пара . . . 7	X пара . . . 2
III пара . . . 10	VI пара . . . 2	XII пара . . . 1,

что даетъ 13 первородящихъ на 38 повторнородящихъ или отношеніе 1 : 2,92

По возрасту роженницы располагаются слѣдующимъ образомъ:

	I пара.	M—пара.	Всего.
до 20 - ти лѣтъ	4	—	4
» 21—25 »	7	3	10
» 26—30 »	1	14	15
» 31—35 »	1	11	12
» 36—40 »	—	8	8
» 41—45 »	—	2	2
Итого . .	13	38	51

Изъ всего числа родовъ срочныхъ было 32 и преждевременныхъ 19. Выкидышей не наблюдалось.

Предлежанія плода были слѣдующія:

Оба головкой	19 разъ
Одинъ головкой, другой тазомъ . . .	20 »
Одинъ головкой, другой поперечно . .	1 »
Оба тазомъ	5 »
Одинъ неопредѣленно, другой головкой .	5 »
Неопредѣленно (уличные роды) . . .	1 »
Всего .	51 разъ

Средній вѣсъ перваго плода вообще при всѣхъ 51 родахъ = 2344, втораго 2312 или разница въ вѣсѣ въ пользу перваго = 32 граммамъ, величинѣ, которой можно почти пренебречь и считать, что средніе плоды

были равновѣсны. Средній же вѣсъ 1-го плода при однихъ только срочныхъ родахъ равенъ 2655, а втораго 2852 грм., т. е. разница въ пользу 2-го выражается—197 грм.

Первый плодъ былъ тяжелѣе 2-го въ 28 случаяхъ
 Второй » » » 1-го » 19 »
 Оба были равновѣсны » 4 »

Разница въ вѣсѣ была:

0 грм.	4	500 грм.	2
50 »	4	550 »	2
100 »	7	600 »	1
150 »	2	750 »	1
200 »	6	800 »	2
250 »	4	900 »	1
300 »	6	1000 »	1
400 »	4	1050 »	1
450 »	1	1900 »	1

Изъ осложненій при родахъ двойнями отмѣчено:

Eclampsia 3 раза; изъ нихъ до родовъ 2 случая (въ 1-мъ припадкѣ продолжались и послѣ родовъ) и 1 разъ eclampsia была послѣродовая.

Кровотечение въ послѣродовомъ періодѣ 1 разъ.

Операции: вскрытіе плоднаго пузыря—16; экстракція простая—4; щипцы—4; поворотъ—3; solutio placentae man.—1; зашиваніе разрывовъ промежности—4 раза.

Послѣродовой періодъ былъ слѣдующій:

	I—para.	M—para.	Всего.
Norma	5	24	29 или 56,9%
Однократное повышение .	5	10	15 » 29,5%
Двукратное »	2	2	4 » 7,8%
Множественное »	1	2	3 » 5,8%
	<hr/> 13	<hr/> 38	<hr/> 51

Подробныя свѣдѣнія, относящіяся къ родамъ двойнями, можно видѣть изъ прилагаемой при семъ общей таблицы:

Которая беремен- ность и возраст роженницы.	М Л А Д Е Н Ц Ы.						Промеж. между 2- рождения	
	Поль.		Въсл.		Живые или мерт- вые.	Предлежаніе п положеніе.		
1888—89.								
1 род., 21 г.	М.	Д.	1050	1000	жив.	1 з. п. в.	1 з. п. в.	8 м.
4—33 л.	»	»	1500	1500	»	1 »	1ягод.з.в.	16 м.
2—33 »	»	М.	1700	2000	»	1 »	2 з. з. в.	14 м.
1—26 »	Д.	»	2200	2250	»	2 »	2 з. п. в.	46 м.
1—20 »	М.	»	2800	2050	»	1 »	2 з. з. в.	45 м.
2—28 »	»	Д.	2350	2650	»	2 з. з. в.	1 »	10 м.
1—20 »	»	М.	2400	3200	»	1 з. п. в.	1 з. п. в.	19 м.
2—25 »	Д.	Д.	2300	2150	»	1 »	2нож.з.в.	15 м.
3—32 »	М.	М.	2500	2700	»	1 »	2 з. з. в.	10 м.
3—36 »	Д.	Д.	2300	2100	»	1нож.з.в.	2 з. п. в.	20 м.
2—38 »	»	»	1500	1750	»	1 з. п. в.	1 »	22 м.
1889—90.								
4—26 л.	»	»	3000	2950	Мер. Мер.	2 з. з. в.	1 »	45 м.
3—26 »	М.	М.	1950	1950	жив.	неопред.	2 з. з. в.	33 м.
6—36 »	Д.	Д.	2000	2200	»	2 з. з. в.	1 з. п. в.	1 ч. 0 м
2—28 »	М.	»	2600	2500	»	1 з. п. в.	неопред.	25 м.
2—26 »	Д.	М.	1950	1500	»	у л и ч н ы е р о д ы		
12—40 »	М.	Д.	3100	3400	»	1 з. п. в.	2 з. п. в.	34 м.
1—24 »	Д.	»	2800	900	Жив.Мац.	1 »	2 »	13 м.
3—22 »	М.	М.	500	400	жив.	2 з. з. в.	2 »	5 м.
2—28 »	»	Д.	1050	1050	»	1 з. п. в.	1 »	40 м.
10—40 »	Д.	»	2100	3000	»	2 з. з. в.	2 з. з. в.	27 м.
8—40 »	»	М.	2200	2400	»	2 »	2 з. п. в.	52 м.
1—21 »	М.	»	1800	1900	»	1 з. п. в.	1 з. з. в.	31 м.

Продолжительность родовъ и оперативное пособіе.	Теченіе послѣродоваго періода.	П О С Л Ѣ Д Ъ.		
		Оболочки и дѣтское мѣсто.	Пуповина: длина и прикрѣпленіе.	
			I плодь.	II плодь.
2 ч. 49 м., пуз. вскр.	Norma.	2 chor. 2 amn. посл. общій.	34 с., эксц.	35 с., краевое.
2 ч. 35 м. (эстрак. 2-го).	Norma.	2 chor. 2 amn. посл. общій.	43 с., эксц.	34 с., эксц.
13 ч. 30 м.	1 кр. пов.	2 chor. 2 am. plac. общая.	59 с., вравое.	53 с., эксц.
1 ч. 39 м., экл. щипцы.	1 кр. пов. Экл.	2 chor. 2 am. pl. общая.	42 с., краев.	32 с., эксц.
66 ч. 22 м.	Norma.	1 chor. 2 amn. pl. общая.	41 с., эксц.	44 с., эксц.
5 ч. 43 м.	1 кр. повыш.	2 chor. 2 am. pl. 2. соедин. обол.	50 с., эксц.	65 с., эксц.
5 ч. 35 м.	2 кр. повыш.	1 chor. 2 amn. pl. общая.	44 с., эксц.	57 с., эксц.
7 ч. 38 м.	1 кр. повыш.	2 chor. 2 am. pl. 2 соедин. обол.	40 с., эксц.	43 с., эксц.
2 ч. 25 м.; пуз. вскр.	Norma.	2 chor. 2 am. pl. общая.	50 с., эксц.	54 с., краевое.
2 ч. 22 м.; пуз. вскр.	Norma. Экл.	2 chor. 2 am. pl. общая.	45 с., эксц.	50 с., эксц.
6 ч. 52 м.	Norma.	1 chor. 2 am. pl. общая.	39 с., эксц.	39 с., эксц.
5 ч. 15 м. щипцы.	Norma.	послѣдъ общій.	51 с., эксц.	61 с., эксц.
2 ч.	Мн. кр. пов. t° (max. 39,4)	2 chor. 2 am. pl. общая	39 с., эксц.	38 с., эксц.
3 ч. 25 м.; пуз. вскр.	Norma.	plac. общая.	66 с., эксц.	61 с., краев.
2 ч. 15 м.; пуз. вскр.	Norma.	plac. общая.	44 с., центр.	35 с., эксц.
2 ч. 20 м.	1 кр. пов. t°.	2 chor. 2 amn. plac 2.	39 с., эксц.	44 с., краевое.
13 ч. 31 м.; п. в. Слаб. бол.	Norma.	2 chor. 2 amn. plac. общая.	37 с., эксц.	35 с., центр.
11 ч. 15 м.	Norma.	2 chor. 2 am, plac. 2 отд.	32 с., эксц.	17 с., краев.
6 ч. 3 м.; пуз. вскр.	1 кр. п. до 38,2.	plac. общая.	35 с., эксц.	30 с., эксц.
6 ч. 32 м.	1 кр. до 38,4.	2 chor. 2 am. pl. общая.	32 с., эксц.	40 с., центр.
1 ч. 15 м.; пуз. вскр.	Norma.	2 chor. 2 am. pl. общая.	43 с., эксц.	50 с., эксц.
5 ч. 30 м.; пуз. вскр. (sol. plac.).	2 кр. п. до 39,2.	2 chor. 2 am. pl. 2.	42 с., эксц.	50 с., эксц.
5 ч. 26 м. пуз. вскр.	Мн. кр. п. до 40,1	plac. общая.	60 с., эксц.	52 с., эксц.

Которая беремен- ность и возрастъ роженцы.	М Л А Д Е Н Ц Ы.						Промежут. между 2-мъ рождениями.
	Поль.	Вѣсь.	Живые или мерт- вые.	Предлежаніе и положеніе.			
3—30 л.	Д.	Д.	2400	2150	жив.	2 яг. п. в. 1 з. п. в.	15 м.
1—21 г.	»	М.	1300	2300	»	1 ног.з.в. 2 з. з. в.	2 ч. 46 м.
4—29 л.	М.	»	2550	2500	Ж. М.	1 з. п. в. 2 ног.п.в.	4 ч. 1 м.
2—23 »	Д.	»	1400	1950	жив.	1 » 2 яг. п. в.	20 м.
3—47 »	»	Д.	2800	2700	»	2 з. з. в. 1 нож.з.в.	15 м.
1—22 »	М.	М.	2250	1700	»	1 з. п. в. 2 нож.п.в.	3 м.
1890—91.							
10—43 л.	»	Д.	2800	2700	»	2 яг. п. в. 2 з. п. в.	4 ч. 48 м.
5—35 »	»	»	3000	3000	»	1 нож.п.в. 2 »	6 м.
1—22 »	»	»	1900	1700	»	2 яг. з. в. 1 з. з. в.	20 м.
5—33 »	Д.	»	1150	650	»	2 » 1 яг. п. в.	10 м.
3—28 »	М.	М.	2800	2700	Ж. Мер.	2 яг. п. в. 1 з. п. в.	8 м.
1—21 г.	»	Д.	2900	2500	жив.	2 з. з. в. 1 лоб.п.в.	33 м.
1—19 л.	»	»	3500	3200	»	2 » 1 лиц.п.в.	12 ч. 7 м.
1891—92.							
2—26 л.	»	М.	3000	2600	»	1 з. п. в. ?	27 м.
2—27 »	»	Д.	2400	2000	»	2 з. з. в. 1 нож.п.в.	20 м.
2—31 г.	»	»	1900	1750	»	1 нож.п.в. 2 яг. п. в.	13 м.
1—20 л.	Д.	»	2100	1500	»	2 з. з. в. 1 з. п. в.	5 м.
4—31 г.	М.	М.	3100	3650	»	2 яг. п. в. 2 »	4 м.
1—22 л.	»	Д.	2800	2500	Мер. Ж.	2 нож.з.в. 1 »	20 м.
5—31 г.	»	»	3400	2600	жив.	1 з. п. в. 1 нож.з.в.	5 м.
4—29 л.	»	М.	2400	2650	»	1 » 1 нож.п.в.	5 м.

Продолжительность родовъ и оперативное пособие.	Течение послѣродового періода.	П О С Л Ъ Д Ъ.			
		Оболочки и дѣтское мѣсто.	Пуповина: длина и прикрѣпленіе.		
			I плодъ.	II плодъ.	
11 ч. 25 м. пуз. вкр.	Norma.	Тоже плас. общая.	44 с., краев.	36 с., краев.	
13 ч. 42 м.; эстр. 1-го, щипцы 2-го; разр. пром.	1 кр.п. до 38,3.	Тоже плас. общая.	55 с., экв.	50 с., экв.	
8 ч. 20 м.	1 кр. до 38,3.	2 chor. 2 ам. плас. 2.	48 с., экв.	44 с., экв.	
2 ч. 7 м.	1 кр. до 38,2.	2 chor. 2 ам. pl. общая.	43 с., экв.	40 с., экв.	
4 ч. 11 м.	Norma.	2 chor. 2 ам. pl. 2.	39 с., экв.	40 с., центр.	
10 ч. 7 м. разр. пр.	Norma.	1 chor. 2 ам. pl. общая.	47 с., краев.	39 с., къ оболочкамъ.	
17 ч. 8 м. сл.; боли, щипцы на гол. 2 пл.	Norma.	2 chor. 2 ам. pl. общая.	49 с., экв.	50 с., экв.	
4 ч. 45 м.	1 кр. до 38,2	2 chor. 2 ам. pl. общая.	35 с., экв.	50 с., экв.	
4 ч. 55 м.	Norma.	2 chor. 2 ам. pl. общая.	45 с., экв.	30 с., экв.	
8 ч. 10 м.; пуз. вкр.	1 кр.п. до 38,5	2 chor. 2 ам. pl. общая.	54 с., экв.	50 с., къ оболочкамъ.	
26 ч. 40 м., пуз. вкр. эстрак. 1-го пл.	Norma.	Тоже плас. общая.	67 с., экв.	64 с., центр.	
25 ч. 27 м. сл. боли. разр. пр.	1 кр. до 38,1.	2 chor. 2 ам. плас. 2 отдѣл.	50 с., экв.	50 с., экв.	
22 ч. 55 м. слаб. бол. поворотъ 2-го плода.	38,2	2 chor. 2 ам. плас. 2 отд.	76 с., краев.	77 с., экв.	
5 ч. 25 м.	Norma.	Тоже.	70 с., экв.	67 с., экв.	
4 ч. 10 м.	Norma.	2 chor. 2 ам. pl. общая.	56 с., краев.	36 с., краев.	
8 ч. 15 м.	Norma.	2 chor. 2 ам. плас. 2 съ перегородкой.	72 с., экв.	44 с., экв.	
8 ч. 32 м.	1 кр. повыш.	Тоже.	68 с., экв.	70 с., экв.	
2 ч. 20 м., пуз. вкр. эстр. 1-го	Norma.	2 chor. 2 ам. pl. 2 отд.	60 с., краев.	54 с., экв.	
5 ч., эстрак. 1-го и щипцы на послѣд. головку поворотъ 2-го разр. пром. 2-й ст. (эклампсія)	1 кр. пов. t ^o .	2 chor. 2 ам. pl. 2 отд.	62 с., экв.	58 с., экв.	
13 ч. 5 м. пуз. вкр.	Norma.	2 chor. 2 ам. pl. общая.	50 с., экв.	33 с., экв.	
13 ч. 23 м.	Norma.	2 chor. 2 ам. pl. общая.	70 с., экв.	61 с., экв.	

Которая беремен- ность и возраст роженцы.	М Л А Д Е Н Ц Ы.						Промежут. между 2-мя рождениями.	
	Поль.		Вѣсь.		Живые или мерт- вые.	Предлсжаніе и положеніе.		
5—33 л.	М.	Д.	2500	3000	жив.	1 з. п. в.	1 з. п. в.	20 м.
3—39 »	»	»	2000	1800	»	1 »	?	10 м.
3—30 »	Д.	»	2600	2750	»	2 »	1 поп.з.в.	1 часъ.
6—33 »	М.	»	1850	2100	»	1 »	2 яг. »	16 м.
5—26 »	»	М.	2850	2700	»	2 з. з. в.	1 з. п. в.	—
3—27 »	Д.	Д.	2850	3300	»	1 яг. п. в.	1 »	1 ч. 13 м.
5—33 »	»	»	2450	2950	»	не успѣли.	1 з. з. в.	7 м.

Несвоевременные роды.

Всѣхъ родовъ, гдѣ беременность была прервана раньше срока, у насъ наблюдалось 260; изъ этого числа выкидышей было 43 и преждевременныхъ родовъ 217. Такимъ образомъ беременность прерывалась раньше срока въ 1,3% всѣхъ случаевъ или 1 рановременные роды приходились на 7,39 срочныхъ.

Выкидыши.

Всѣхъ выкидышей (считая въ этомъ случаѣ прерываніе беременности до 28-ой недѣли) у насъ было 43¹⁾ или на все число родовъ это составляетъ 2,23%.

По мѣсяцамъ, въ которые произошли выкидыши, наши случаи распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	1888—89.	1889—90.	1890—91.	1891—92.	Всего.
августъ	—	—	—	3	3
сентябрь	—	—	—	1	1
октябрь	—	—	—	1	1
ноябрь	—	1	2	1	4
декабрь	2	4	2	3	11
январь	3	—	—	—	3
февраль	1	—	—	2	3
мартъ	1	—	3	1	5
апрѣль	—	1	1	2	4
май	2	4	—	—	6
іюнь	—	2	—	—	2
Итого	9	12	8	14	43

¹⁾ Изъ нихъ одинъ мясистый заносъ.

Продолжительность родовъ и оперативное пособие.	Течение послѣродового периода.	П О С Л Ъ Д Ъ.			
		оболочки и дѣтское мѣсто.	Пушвина, длина и прикрѣпленіе.		
			I плодь.	II плодь.	
5 ч. 15 м.	Norma.	Тоже.	47 с., эксц.	72 с., эксц.	
17 ч. 45 м.	Norma.	Тоже.	35 с., эксц.	45 с., эксц.	
4 ч. 23 м. пов. 2.	Norma.	Тоже.	36 с., эксц.	48 с., эксц.	
2 ч. 53 м. пуз. вскр.	Norma.	2 chor. 2 am. pl. 2 соедин. на небольшомъ разстоян.	42 с., центр.	42 с. центр.	
4 ч.	Norma.	2 chor. 2am. pl. соед. обол.	39 с., эксц.	53 с., эксц.	
13 ч. 5 м.	Мног. max. 39,9.	2 chor. 2 am. pl. общая.	65 с., эксц.	56 с., къ оболочкамъ.	
1 ч 23 м.; кров. въ послѣдовомъ пер.	2кр.max.38,5	2 chor. 2 am. pl. общая.	35 с., эксц.	40 с., краев.	

Такимъ образомъ самое большое число выкидышей приходится на декабрь (11), затѣмъ на май (6) и мартъ (5).

По времени, на которомъ беременность была прервана, наши случаи раздѣляются:

на II мѣсяцѣ . . .	7	на V мѣсяцѣ . . .	2
» III » . . .	18	» VI » . . .	6
» IV » . . .	6	неопредѣленно. . .	4

Такимъ образомъ беременность всего чаще прерывалась на III-мъ мѣсяцѣ. По числу предшествовавшихъ беременностей наши случаи распредѣляются:

I—рага	4	VII—рага	6
II »	9	VIII »	1
III »	7	IX »	1
IV »	6	XI »	2
VI »	5	XII »	2

Замужнихъ было 39, незамужнихъ — 4.

Моложе 20-ти лѣтъ	2
отъ 21 до 30 »	20
» 31 » 40 »	17
старше 40 »	4

Причину выкидыша можно было констатировать лишь въ немногихъ случаяхъ, а именно въ двухъ случаяхъ было поставлено распознаваніе тифа и въ одномъ абортъ былъ вызванъ поднятіемъ тяжести. Въ девяти случаяхъ въ анамнезѣ отмѣчены раньше бывшіе выкидыши.

Которая беременность и возраст роженицы.	М Л А Д Е Н Ц Ы.							Промежут. между 2-мя рожденими.
	Поль.		Въсь.		Живые или мертвые.	Предлежаніе и положеніе.		
5—33 л.	М.	Д.	2500	3000	жив.	1 з. п. в.	1 з. п. в.	20 м.
3—39 »	»	»	2000	1800	»	1 »	?	10 м.
3—30 »	Д.	»	2600	2750	»	2 »	1 поп.з.в.	1 часъ.
6—33 »	М.	»	1850	2100	»	1 »	2 яг. »	16 м.
5—26 »	»	М.	2850	2700	»	2 з. з. в.	1 з. п. в.	—
3—27 »	Д.	Д.	2850	3300	»	1 яг. п. в.	1 »	1 ч. 13 м.
5—33 »	»	»	2450	2950	»	не успѣли.	1 з. з. в.	7 м.

Несвоевременные роды.

Всѣхъ родовъ, гдѣ беременность была прервана раньше срока, у насъ наблюдалось 260; изъ этого числа выкидышей было 43 и преждевременныхъ родовъ 217. Такимъ образомъ беременность прерывалась раньше срока въ 1,3% всѣхъ случаевъ или 1 рановременные роды приходились на 7,39 срочныхъ.

Выкидыши.

Всѣхъ выкидышей (считая въ этомъ случаѣ прерываніе беременности до 28-ой недѣли) у насъ было 43¹⁾ или на все число родовъ это составляетъ 2,23%.

По мѣсяцамъ, въ которые произошли выкидыши, наши случаи распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	1888—89.	1889—90.	1890—91.	1891—92.	Всего.
августъ	—	—	—	3	3
сентябрь	—	—	—	1	1
октябрь	—	—	—	1	1
ноябрь	—	1	2	1	4
декабрь	2	4	2	3	11
январь	3	—	—	—	3
февраль	1	—	—	2	3
мартъ	1	—	3	1	5
апрѣль	—	1	1	2	4
май	2	4	—	—	6
іюнь	—	2	—	—	2
Итого.	9	12	8	14	43

¹⁾ Изъ нихъ одинъ мясистый заносъ.

Продолжительность родовъ и оперативное пособие.	Течение послѣродового періода.	П О С Л Б Д Ъ.			
		оболочки и дѣтское мѣсто.		Пушвина, длина и прикрѣпленіе.	
				I плодъ.	II плодъ.
5 ч. 15 м.	Norma.	Тоже.		47 с., экск.	72 с., экск.
17 ч. 45 м.	Norma.	Тоже.		35 с., экск.	45 с., экск.
4 ч. 23 м. пов. 2.	Norma.	Тоже.		36 с., экск.	48 с., экск.
2 ч. 53 м. пуз. вскр.	Norma.	2 chor. 2 am. pl. 2 соедин. на небольшомъ разстоян.		42 с., центр.	42 с. центр.
4 ч.	Norma.	2 chor. 2am. pl. соед. обол.		39 с., экск.	53 с., экск.
13 ч. 5 м.	Мног. max. 39,9.	2 chor. 2 am. pl. общая.		65 с., экск.	56 с., къ оболочкамъ.
1 ч 23 м.; кров. въ послѣдовомъ пер.	2кр.max.38,5	2 chor. 2 am. pl. общая.		35 с., экск.	40 с., краев.

Такимъ образомъ самое большое число выкидышей приходится на декабрь (11), затѣмъ на май (6) и мартъ (5).

По времени, на которомъ беременность была прервана, наши случаи раздѣляются:

на II мѣсяцѣ . . .	7	на V мѣсяцѣ . . .	2
» III » . . .	18	» VI » . . .	6
» IV » . . .	6	неопредѣленно . . .	4

Такимъ образомъ беременность всего чаще прерывалась на III-мъ мѣсяцѣ. По числу предшествовавшихъ беременностей наши случаи распредѣляются:

I—рага	4	VII—рага	6
II »	9	VIII »	1
III »	7	IX »	1
IV »	6	XI »	2
VI »	5	XII »	2

Замужнихъ было 39, незамужнихъ — 4.

Моложе 20-ти лѣтъ	2
отъ 21 до 30 »	20
» 31 » 40 »	17
старше 40 »	4

Причину выкидыша можно было констатировать лишь въ немногихъ случаяхъ, а именно въ двухъ случаяхъ было поставлено распознаваніе тифа и въ одномъ абортъ былъ вызванъ поднятіемъ тяжести. Въ девяти случаяхъ въ анамнезѣ отмѣчены раньше бывшіе выкидыши.

Терапія выкидыша тамъ, гдѣ была хоть какаля-нибудь надежда на удержаніе плоднаго яйца въ полости матки состояла въ примѣненіи льда на нижнюю часть живота и рыхлой тампонадѣ влагалища сулемово-іодоформенными тампонами. Если же кровотеченіе продолжалось настойчиво и мы находили яйцо свободнымъ въ полости матки, то выдѣляли плодъ пальцемъ и промывали полость матки дезинфицирующими растворами. При окончившемся же extra muros выкидышѣ и именно тамъ, гдѣ было подозрѣніе, что не все яйцо выдѣлилось или гдѣ мы сами почему-либо не были въ состояніи выдѣлить абортрованное яйцо сполна, мы охотно прибѣгали къ выскабливанію lege artis слизистой оболочки полости матки съ послѣдующей тампонадой ея іодоформенной марлей и влагалища сулемовыми тампонами. Такихъ выскабливаній было произведено нами 13¹⁾. Послѣродовой періодъ у абортировавшихъ протекалъ слѣдующимъ образомъ:

Безъ повышенія t°	33	раза	или	76,9%
Съ однократнымъ повышеніемъ . . .	2	»	»	4,6%
» двукратнымъ »	2	»	»	4,6%
» многократнымъ »	6	»	»	13,9%

Среди случаевъ многократнаго повышенія — два обязаны параметритамъ. остальные же не зависѣли отъ заболѣванія половыхъ органовъ.

Преждевременные роды.

Всѣхъ преждевременныхъ родовъ было 217, что на все число родовъ составляетъ 11,2%. Эти случаи по возрасту и по числу предшествовавшихъ беременностей роженицъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	до 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—50 л.	Итого.
I пара.	16	36	16	3	3	—	74 или 34,1%
II »	2	20	24	7	5	1	59 » 26,2%
III »	2	6	15	2	4	—	29
IV »	—	3	10	9	—	2	24
V »	—	—	3	8	1	—	12
VI »	—	1	2	2	3	—	8
VII »	—	—	1	1	1	—	3
VIII »	—	—	—	2	4	—	6
XIII »	—	—	—	—	—	1	1
XV »	—	—	—	—	1	—	1
Итого.	20	66	71	34	22	4	217

¹⁾ А именно у 1 первородящей, у 1 второродящей и у 11 многородящихъ (изъ нихъ у двухъ 12—пара). У девяти поднятія t° не было, у одной она поднималась дважды до 38,7 (нагрубаніе груди), а у трехъ многократно (изъ нихъ двѣ болѣли) parametritis и parametritis et abscessus perineae). Выписались 2 на 4-й день, 3 на 5-й, 6 на 6-й, 1 на 9-й и 1 на 12-й.

Такимъ образомъ беременность чаще всего прерывалась у первородящихъ въ возрастѣ 21—25 лѣтъ (16,5%).

По сроку, на которомъ прерывалась беременность, наши случаи расположились:

На VII мѣсяцѣ	25 разъ.	На IX мѣсяцѣ	66 разъ.
» VIII »	39 »	» X »	49 »
		неизвѣстно ¹⁾	38 »

На все число преждевременныхъ родовъ одноплодныхъ было 192 и двойничныхъ 25. Предлежаній головнымъ концемъ 195, тазовымъ 37, поперечныхъ положеній 4, уличныхъ родовъ 3, предлежаніе неопредѣлено 3 раза. Узкій тазъ наблюдался въ 30-ти случаяхъ. Осложненія были: чахотка легкихъ—1 разъ, сифилисъ—1 разъ, кровотеченіе ante et sub partu—1 разъ, sub partu 1 разъ, многоводіе 23 раза, раннее отхожденіе околоплодныхъ водъ 8 разъ, слабыя боли 1 разъ, eclampsia—3 раза, предлежаніе дѣтскаго мѣста 2 раза, выпаденіе пуповины 2 раза. Изъ операций было произведено: extractio foetus—2 раза, applicatio forcipis—7 разъ, solutio placentae manualis 4 раза, versio in pedes 7 разъ, perineorrhaphia—14 разъ, episiotomia 2 раза. Средняя продолжительность родовъ у I пара равнялась 13 ч. 24 м. (меньше общей на 2 ч. 41 м.), у II пара 7 ч. 24 м. (меньше общей на 1 ч. 11 м.) и у M—пара 10 ч. 03 м. (больше средней на 1 часть).

Всего родилось младенцевъ 242; изъ нихъ мальчиковъ было 123 и дѣвочекъ 119. Изъ этого числа родилось живыхъ 199, мертвыхъ 9, мацерированныхъ 34. Изъ родившихся живыми въ пріютѣ умерло 25 (или 10,3%). Такимъ образомъ судьба дѣтей не можетъ считаться благоприятной.

Относительно матерей, послѣдствія родовъ въ ригрегріумъ сказались въ слѣдующемъ:

Norma—	152 или 70%.
1 кратное повыш. t°—	35.
2 » » » »	9.
Много » » » »	22.
Волѣло	{ послѣродовыми формами 9 или 4,1%.
	{ непосредственными » 16 » 7,3%.

(Продолженіе будетъ).

¹⁾ Свѣдѣній относительно срока послѣдней менструаціи получить не удалось. Надо считать беременность прерванною на одномъ изъ 2-хъ послѣднихъ мѣсяцевъ.