

Могущіе понадобятся во время родовъ вата (тампоны) и марля должны быть стерилизованы и сохраняться въ небольшихъ количествахъ въ плотно закрывающихся металлическихъ коробкахъ. Инструменты всего лучше прокипятить въ теченіе 5—10 минутъ передъ самымъ ихъ употребленіемъ; матеріалъ для швовъ (кетгутъ, шелкъ) долженъ также содержаться въ баночкахъ въ такомъ количествѣ, какое можетъ потребоваться для одного раза.

А. Фишеръ.

134. Л. П. Пассоверъ. Къ вопросу о многоплодной беременности. Роды тройнями (Врачъ, 1892 г., № 32).

Д. 23 лѣтъ, вышла замужъ на 29 году; регулы съ 14 лѣтъ черезъ $3\frac{1}{2}$ нед. по 3—5 дней. Размѣръ таза 25, 27, 30, 37; ростъ 253. 3 года назадъ срочные нормальные роды однимъ ребенкомъ. Въ серединѣ марта 91 г. послѣднія регулы, движенія плода не помнитъ. 11 декабря 1892 роды тройнями. Первый плодъ въ поперечномъ положеніи съ выпавшей ручкой,—поворотъ; второй въ ногоположеніи,—экстракція; третій плодъ также въ ногоположеніи,—экстракція послѣ искусственнаго вскрытія пузыря. Всѣ три плода—мальчики. Всѣхъ перваго ребенка 2150 грм., длина 43 смт., окружность головки $31\frac{1}{2}$ смт.; длина пуповины 46 смт.; втораго: 2400 гр., 45 смт., 32 смт., $47\frac{1}{2}$ смт.; третьяго: 2850 гр. $47\frac{1}{2}$ смт., 33 смт., 48 смт. Два первые ребенка имѣли общій послѣдъ съ общей кожистой оболочкой, но съ отдѣльными водными. Всѣхъ послѣдовъ 882 гр. и 420 гр. Первый ребенокъ умеръ 15 января 1892 г., второй 5 февраля 1892 г, третій 14 февраля 1892 г. Описанный случай авторъ противопоставляетъ мнѣнію *Гугенбергега*, что первыми рождаются болѣе тяжелые плоды и на основаніи того, что мать больной изъ 8 родовъ (тетка изъ 6) одни имѣла двойнями, устанавливаетъ для данной семьи несомнѣнность наследственной плодовитости.

Рутковскій.

135. Познанская И. Случай неукротимой рвоты при внѣматочной беременности. Инъекція морфія въ плодный мѣшокъ. Выздоровленіе. (Медицина, № 16, 1892 г.).

Больная, высокая и крѣпкая, около 30 лѣтъ, женщина, была всегда здорова и лишь за мѣсяцъ передъ тѣмъ начала чувствовать иногда схваткоподобныя боли внизу живота и замѣчать бѣли, которыя то усиливались, то ослабѣвали. Менструируетъ съ 13 лѣтъ правильно, но послѣдніе скудные регулы 30 апрѣля были вызваны искусственно, причемъ на третій день явились боли схватками, доводившія больную до обмороковъ.

При осмотрѣ больной 25 мая 1890 г. найдено: языкъ обложенъ, животъ вздутъ, брюшныя мышцы напряжены, чувствительность при давленіи in regione hypogastrica, пульсъ полный около 106, правильный, дышаній 30, t. 38,3, грудныя железы нормальны.

Ислѣдованіе per vaginam дало: t^o рукава повышена, влагалищная часть цилиндрична, мягка, коротка, сильно отклонена кзади, наружный зѣвъ пропускаетъ верхушку пальца, края зѣва негладки. Болѣзненность