

влагалище закрыть резистентною и неперфорированною перепонкою (*Hymen imperforatus*). Изслѣдованіе *per rectum*: матка не опредѣляется, прощупываются яичники, немного увеличенны въ объемѣ. Справа и слѣва, около яичниковъ, можно было опредѣлить по небольшой опухоли неболѣзненной и подвижной. Захлороформировавъ большую, *Jacobs* сдѣлалъ разрѣзъ *hymen'a*, при чемъ констатировалъ отсутствіе влагалища. Зондъ, введенный въ мочевоу пузырь, ясно прощупывался пальцемъ при изслѣдованіи *per rectum*. Имѣя въ виду отсутствіе влагалища и предполагал, на основаніи данныхъ, полученныхъ при изслѣдованіи черезъ прямую кишку, отсутствіе матки—авторъ рѣшилъ удалить придатки. Произведена операція; трубы оказались нормально развитыми; яичники увеличены въ объемѣ, кистовидно перерождены, на поверхности нѣсколько серозныхъ кистъ. Двѣ маленькія опухоли, величиною съ орѣхъ, которыя прощупывались около яичниковъ оказались двумя маточными ядрами, соединенныя между собою фиброзоу связкою. Въ данномъ случаѣ, при отсутствіи влагалища, была рудиментарная матка.

А. Лапина.

149. Г. Заксъ. Случай *haemelytrometra unilateralis* при *uterus duplex separatus*. (Медиц. Обзор. 1892 г., т. XXXVII, № 2).

Большая Анна П., 18 л. отъ роду, крестьянка, средняго роста, хорошаго тѣлосложенія за годъ до поступленія въ Ижевскую земскую больницу замѣтила внизу живота опухоль, постепенно увеличивающуюся и причиняющую сильныя боли, особенно во время регулъ. Первые регулы появились на 14 г. и установились въ 4-недѣльные сроки по 2—3 дня. Наступившая вскорѣ беременность окончилась двухмѣсячнымъ выкидышемъ. Послѣ этого крови снова установились въ правильные сроки и вмѣстѣ съ тѣмъ появились боли въ животѣ, заставившія больную обратиться въ больницу. Произведенное изслѣдованіе было слѣдующее: Внизу живота прощупывается напряженная, шарообразная, мало подвижная опухоль, вершина ея доходитъ до уровня пупка. Немного влѣво отъ срединной линіи прощупывается продолговатое, плотное тѣло величиной съ большой палецъ; тѣло это связано съ опухолью и немного подвижно. Палецъ, введенный во влагалище, почти у самаго входа наталкивается на опухоль, находящуюся въ непосредственной связи съ опухолью, опредѣляемой при наружномъ изслѣдованіи. Шейки матки достичь не удастся. Руководствуясь только что изложенными данными, авторъ діагностировалъ *haemelytrometra unilateralis* вслѣдствіе *atresia vaginalis sinistra*. Съ цѣлью излѣченія въ данномъ случаѣ было произведено опорожненіе мѣшка и образованіе постояннаго отверстія для стока выдѣленій и менструальной крови. Содержимое мѣшка удалялось медленно чрезъ небольшое отверстіе, сдѣланное скальпелемъ въ выпяченной стѣнкѣ влагалища близъ входа. На 4 день проколъ былъ расширенъ на столько, что легко могли пройти два пальца и края разрѣза окаймлены посредствомъ сшиванія слизистой оболочки праваго влагалища съ таковою же лѣваго, бывшаго раньше закрытымъ. Въ теченіи двухъ недѣль больная находилась въ постели, получая вначалѣ *t-gram orii*. На животѣ ледъ. Температура все время нормальна. Наступившія вскорѣ ре-

гулы были обильнѣе прежнихъ и безболѣзненны. Послѣ менструаціи больная встала съ постели. Объективно найдено: Правое влагалище сократилось, шейка прощупывается ясно нѣсколько вправо отъ срединной линіи, соответственное ей тѣло матки продолговатой формы. Черезъ искусственное отверстіе палець попадаетъ въ лѣвое влагалище, стѣнки котораго представляются утолщенными, тѣло матки прощупывается въ лѣвой половинѣ таза. Спустя нѣкоторое время была найдена вполне сформированная шейка лѣвой матки. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ операціи автору привелось снова видѣть больную, при чемъ имъ была констатирована трехмѣсячная беременность правой матки. Случай этотъ интересенъ въ томъ отношеніи, что представляетъ весьма рѣдкую форму двойственного развитія полового канала, известную подъ именемъ *uterus separatus duplex seu didelphys*.

Д. Рузи.

150. Zeiss. Carcinom des Labium minus, der Portio vaginalis und der Mamma. (Centr. f. Gynäk., 1892, № 40). Ракъ малой губы, влагалищной части матки и грудной железы.

Къ автору лѣтомъ 1887 года явилась г-жа St., хорошо сложенная и упитанная деревенская женщина, 38 лѣтъ, мать тринхъ дѣтей, съ жалобой на опуханіе наружныхъ половыхъ частей, замѣченное впервые 5 мѣсяцевъ тому назадъ, но до послѣдняго времени не причинявшаго ей никакихъ страданій. Приблизительно 4 недѣли какъ эта опухоль мѣшаетъ ей ходить и причиняетъ боль. Опухоль сидѣла въ правой малой губѣ, въ нижней ея части, была шероховата и величиной въ лѣсной орѣхъ, съ внутренней стороны изъязвлена. Паховыя железы свободны. Предполагаютъ былъ ракъ и вся губа Пакеленомъ ампутирована, послѣ чего больная, поправившись, черезъ 8 дней уѣхала домой. Микроскопъ подтвердилъ діагнозъ. До февраля текущаго года больная была здорова. Въ 1890 году она родила и послѣ кормленія у ней на лѣвой грудной железнѣ остался узелъ, который только 3 мѣсяца тому назадъ далъ себя знать, вызвавъ колотья въ железнѣ во время мѣсячныхъ. Съ тѣхъ поръ колотья сдѣлались постоянными и отражаются въ подмышечную область. Въ февралѣ этого года мѣсячныя, до сихъ поръ правильныя, стали чрезвычайно обильны и не правильны, появилось чувство тяжести въ животѣ и давленіе на низъ.

Больная приписывала свое недомоганіе наступленію климактерія и къ врачу не обращалась. Когда же наступили сильное исхуданіе тѣла, упадокъ силъ и вонючее выдѣленіе съ дизуріей и сильными болями въ узлѣ грудной железы, больная 15 августа этого года явилась къ Z.

Констатируется: рубецъ на мѣстѣ малой губы не представляетъ измѣненій, паховыя железы также; на влагалищной части неоперируемая, кратерообразная, раковая опухоль; въ лѣвой грудной железнѣ раковый узелъ, близкій къ распаду; двѣ инфильтрованные подмышечныя железы. Измѣненій въ другихъ органахъ не найдено.

Б. Фейнбергъ.