

**153. В. В. Типяновъ. Къ вопросу объ удаленіи кистъ яичниковъ и придатковъ матки черезъ влагалище. (Врачъ, 1892 г., № 38).**

Настоящая статья является вполне основательнымъ возраженіемъ на статью д-ра *Львова*: *удаленіе кистъ яичниковъ и придатковъ матки черезъ влагалище*, помѣщенную въ 11 и 12 №№ Врача за текущій годъ. Не отъ забвенія, какъ это думаетъ д-ръ *Львовъ*, затерялась эта операція, а потому что у хирурговъ не создалось увѣренности въ ея пользѣ; главною помѣхою всегда являлись сращенія, которымъ д-ръ *Львовъ* не придаетъ серьезнаго значенія, отрицая возможность какъ значительнаго кровотеченія при осторожномъ раздѣленіи перемычекъ, такъ и существованія крѣпкихъ перемычечныхъ сращеній съ салникомъ или кишками. Не можетъ авторъ согласиться съ д-ромъ *Львовымъ* и въ томъ, что при кольпотоміи поле операціи для руки и глазъ яснѣе, чѣмъ при чревосѣченіи; при наличности сращеній совсѣмъ напротивъ и вслѣдствіе этого, приступая къ кольпотоміи, нельзя быть увѣреннымъ, что удастся удалить все, что нужно удалить. 9 удачныхъ случаевъ д-ра *Львова* авторъ не считаетъ достаточной защитой кольпотоміи, ибо всѣ удаленныя части были достаточно подвижны, т. е. не было сильныхъ сращеній. Если бы д-ръ *Львовъ* призналъ сращенія противопоказаніемъ кольпотоміи, то съ этой оговоркой она могла бы получить право существованія, какъ операція, замѣняющая въ нѣкоторыхъ случаяхъ чревосѣченіе.

Рутковскій.

**154. И. М. Львовъ. Къ вопросу объ удаленіи кистъ яичниковъ и придатковъ матки черезъ влагалище. Статья вторая. (Врачъ, 1892 г., № 46).**

Дѣлая нѣсколько отвѣтныхъ замѣчаній на статью *В. В. Типякова*, авторъ къ описаннымъ уже 9 случаямъ кольпотоміи прибавляетъ еще 3: 1) Родила въ срокъ 4 раза, послѣ 3-хъ родовъ—5 лѣтъ назадъ, болѣла около 2 мѣсяцевъ; послѣ 4-хъ родовъ—3 года назадъ; болѣзненные явленія (боли внизу живота, кровотеченія и бѣли) усилились и сдѣлались постоянными. Матка увеличена, наклонена впередъ, плотна, болѣзненна при движеніи и давленіи, почти неподвижна. Справа и сзади около нея опухоль, до кулака величиною, круглая, упругая, немного болѣзненная и неподвижная. Правая кольпокистосальпично-эктомія. Послѣоперационный періодъ гладкій. 2) Родила 5 разъ и 2 раза выкинула. Больна 1 годъ, съ послѣдняго выкидыша; боли, бѣли сильныя и продолжительныя мѣсячцыя (черезъ 1—2 недѣли по 2 недѣли), а за послѣднее время постоянное кровотеченіе. Матка увеличена плотна, болѣзненна, въ правильномъ положеніи, подвижна. Правая широкая связка болѣзненна, особенно въ брюшномъ концѣ; правый яичникъ увеличенъ до средняго апельсина; смѣщенъ къзади, плотно упругъ, болѣзненъ и почти неподвиженъ; труба неболезненна. Кольпоовариозектомія и выскабливаніе въ одинъ пріемъ. Послѣоперационный періодъ съ нагноеніемъ и лихорадкой, выздоровѣла на 23 день, въ настоящее время уже беременна. 3) Родила 2 раза и 1 разъ выкинула. Больна 7 мѣсяцевъ послѣ того, какъ подняла тяжесть.