

въ молодости тяжелаго тифа—не удалось выяснитъ. Многочисленные надрѣзы кольцеобразнаго рубца не дали никакого эффекта; съ трехъ часовъ схватки стали слабѣть, t° въ 6 ч. утра $35,8^{\circ}$ (въ прямой кишкѣ), пульсъ 120; область правой почки очень чувствительна. Подъ хлороформнымъ наркозомъ ножомъ надрѣзано справа сзади влагалища во всю длину, начиная отъ кольца суженія; въ томъ же направленіи надрѣзана и промежность. При извлеченіи щипцами пронзательный разрывъ промежности и влагалища въ направленіи сдѣланныхъ надрѣзовъ, причемъ на разстояніи 2-хъ сант. отъ заднепроходнаго отверстія разорвана на небольшомъ протяженіи прямая кишка. Всѣ разрывы и надрѣзы сухиты. Съ 6-го іюня температура и пульсъ нормальные, моча чище, область правой почки болѣе не болѣзненна; разрывъ влагалища сросся первымъ натяженіемъ, шовъ промежности мѣстами разошелся, причемъ образовалась небольшая промежностно-кишечная фистула, которая чрезъ 12 дней совершенно закрылась. Ребенокъ—дѣвочка, 1300 грм. вѣсу, вполне здоровъ.

Случай II. Первородящая, 35 лѣтъ, замужемъ съ 21 года, 12 лѣтъ тому назадъ страдала воспаленіемъ матки, периметритомъ и двухстороннимъ бофоригомъ, продолженіи долгаго времени лѣчилась прижиганіями шейки адскимъ камнемъ; послѣдняя менструація 25 ноября 1890 г.; злоупотребляла подкожными впрыскиваніями морфія, особенно во время беременности, многочисленные абсцессы отъ впрыскиванія на передней поверхности бедеръ. 31-го августа утромъ начались схватки, шейка сгладилась, зѣвъ открытъ на 2 сант.; затѣмъ схватки прекратились и начались снова только 1-го сентября послѣ отхожденія водъ; не смотря на довольно хорошія схватки зѣвъ больше не раскрывался. Принимая во вниманіе возрастъ роженицы, неподатливость шейки и влагалища, невозможность провести безгноясто роды при болѣе продолжительности ихъ (вскрышіеся абсцессы на бедрахъ), рѣшено окончить роды по *Dührssen's*y: ножницами *Siebold'a* надузана шейка вплоть до сводовъ во всѣ четыре стороны, наложены щипцы, вслѣдствіе затруднительности извлеченія сдѣланъ еще правосторонній надрѣвъ влагалища и промежности и извлеченъ плодъ вѣсомъ въ 3750 грм. Надрѣвы влагалища и промежности сухиты и срослись первымъ натяженіемъ; послѣродовой періодъ протекъ безлихорадочно. При изслѣдованіи черезъ 7 недѣль найдено, что разрѣзы на шейкѣ срослись.

Хотя ни въ одномъ изъ этихъ случаевъ не существовало непосредственной опасности ни для матери, ни для плода, тѣмъ не менѣе авторъ считаетъ свой образъ дѣйствія вполне цѣлесобразнымъ. И. Воефъ.

4. Г. Штильмаркъ. *Vinum Ipecacuanhae bei Wehenschwäche.* (St.-Petersb. medic. Wochenschr. 1892, № 18). *Vinum Ipecacuanhae* при слабости родовыхъ болей.

Не такъ давно *Drapes* („Quarterly therap. review») предложилъ *vinum Ipecacuanhae* въ количествѣ 2 — 3 приемовъ по 10 — 15 капель, какъ хорошее средство при слабости родовыхъ болей для возбужденія совершенно правильныхъ сокращеній матки. Въ настоящемъ своемъ сообще-

ни авторъ приводитъ исторію однихъ родовъ, гдѣ это средство было применено съ полнымъ успѣхомъ.—IV—рага, 23 лѣтъ; предшествовавшіе трое родовъ протекли легко и быстро; въ настоящемъ случаѣ за 3 недѣли до срока безъ видимой причины прошли воды, послѣ чего были 2 — 3 схватки; на другой день—зѣвъ пропускаетъ 2 пальца, 2-е затылочное положеніе, головка въ полости таза, болѣе нѣтъ; общія ванны, горячіе влагалитичныя души и т. п. втеченіе 1¹/₂ сутокъ не были въ состояніи возбудить родовую дѣятельность матки; дано два приема vini iresacuanhae по 15 капель съ промежуткомъ въ 1¹/₂ часа, послѣ чего появились энергичныя сокращенія матки совершенно нормальнаго (не судорожнаго) характера, которыя однако черезъ нѣсколько часовъ опять стихли; въ виду бывшей рвоты дано только 5 капель vini iresacuanhae,—схватки возобновились и черезъ два часа родился ребенокъ (безъ всякихъ слѣдовъ асфиксін); произвольный выходъ послѣда; нормальный послѣродовой періодъ.

А. Фишеръ.

5. Орловъ В. Н. Случай беременности и родовъ при полной цѣлости гимена (Медицина № 26, 1892 года).

Марта 21 текущаго года была принята въ клинику роженица, 25 лѣтъ, живущая половую жизнью второй годъ съ мужчиною 20 лѣтъ. Менструируетъ она правильно съ 13 лѣтъ черезъ 3 недѣли по 5 дней и послѣднія крови имѣла 13 іюня.

Осмотръ далъ: наружныя половыя органы нормальны, на мѣстѣ дѣвственной плевы находится мясистая отечная перепонка, закрывающая собою весь входъ во влагалитице, она синевата мѣстами бѣлесовата и выпячивается впередъ въ видѣ гребешка; длина ея отъ уретры до задней спайки 4 см., ширина 3 и толщина ¹/₂ см.; на границѣ задней трети ея съ средней замѣтенъ бѣловатый полукруглый валикъ; справа отъ срединной линіи въ этой перепонкѣ, на срединѣ между уретрой и задней спайкой, на шероховатой поверхности величиною въ гривенникъ находится отверстіе, пропускающее во влагалитице только тонкій зондъ. Это отверстіе было такъ скрыто складками отечной плевы, что сначала принято за «hymen imperforatus». При изслѣдованіи плева вдавливалась во влагалитице на 5 см. Per rectum рукавъ ничего необычнаго не представлялъ.

Измѣренія живота и таза ничего неправильнаго не дали. Положеніе плода первое, предлежаніе головкою, которая per rectum опредѣлилась во входѣ въ тазъ; пузырь цѣлъ и паливался хорошо.

Температура больной 37,3 пульсъ 56, дыханій 28 въ мин. Сокращенія матки черезъ 3 минуты достаточно сильны.

Въ 12 ч. 45 м. дня стали отходить черезъ отверстіе плевы воды довольно сильной струей. Въ 2 ч. дня головка стала бомбировать промежность и растягивать плеву. Въ 3 ч. схватки ослабѣли, являлись рѣже, почему дано chinini muriciaci gr X.

Въ 3 ч. 30 м. во время схватки по желобоватому зонду сдѣлалъ ножницами разрѣзъ назадъ къ спайкѣ и впередъ вправо отъ уретры. Обильное кро-