

нашелъ наконецъ давно искомый настоящій методъ лѣченія непріятнаго, и не подававшагося терапіи страданія, извѣстнаго подъ названіемъ *chloasma uterinum*.

В. Каплянскій

38. Douglas Ayres. Some remarks on the treatment of puerperal eclampsia, from practical experience. (New.-York Medical Journal, 1892, vol. LVI, № 27). Нѣсколько словъ о лѣченіи эклампсіи по результатамъ практики.

*Douglas Ayres* утверждаетъ, что раннее производство венесекціи не только предохраняетъ отъ угрожающихъ припадковъ эклампсіи, особенно у болѣе или менѣе тучныхъ особъ, но и благопріятствуетъ полному исцѣленію и во всякомъ случаѣ подготовляетъ прекрасную почву для дальнѣйшихъ терапевтическихъ мѣропріятій. Методъ лѣченія венесекціями давалъ автору гораздо меньшій процентъ смертности, чѣмъ всякій другой методъ. Chloral hydrat рекомендованъ для лѣченія эклампсіи 20 лѣтъ тому назадъ, и въ самое послѣднее время авторъ испыталъ это средство въ одномъ, очень тяжеломъ случаѣ эклампсіи, въ которомъ конвульсивные припадки появлялись и послѣ обильной венесекціи. Chloral hydrat былъ примѣненъ авторомъ подкожно, и больная выздоровѣла, но много времени прошло до тѣхъ поръ, пока удалось залѣчить вызваннаго подкожнымъ впрыскиваніемъ язвы. Chloral hydrat задерживаетъ конвульсіи лучше, чѣмъ хлороформъ, и не сопряженъ съ такой опасностью при долгомъ употребленіи, какъ послѣдній. Chloroform лучше всего примѣнять per rectum. Морфинъ оказывается полезнымъ въ умѣренныхъ дозахъ, но авторъ не можетъ одобрять большихъ количествъ морфина, рекомендованныхъ нѣкоторыми врачами. Въ результатъ своей многолѣтней акушерской практики, авторъ приходитъ къ заключенію, что смѣло, но разумно примѣняемая венесекція составляетъ нашъ главный якорь спасенія въ борьбѣ съ эклампсіей, а chloral hydrat можетъ служить лишь вспомогательнымъ средствомъ къ венесекціи.

В. Каплянскій.

39. T. J.—Gillicuddy. Pelvic version (New.-York. Medical Journal, 1892. Vol. LVI, № 27). О поворотѣ на ягодицы.

При самопроизвольномъ поворотѣ плода на нижній конецъ туловища, ягодицы становятся предлежащей частью, межъ тѣмъ какъ голова направляется вверхъ ко дну матки. Искусственный поворотъ на ягодицы производится въ подражаніе самопроизвольному и показуется преимущественно при поперечныхъ положеніяхъ. Для выполненія поворота лучше всего вводить пальцы въ пахъ, или за *crista ossis ilei* плода, и такимъ путемъ низводить задъ плода въ полость малаго таза. Въ то же время другая рука или помощника, произведя снаружи давленіе на головку и тазовой конецъ плода, старается повертывать оба полюса плода въ томъ же направленіи, низдавливая тазовой конецъ плода. При поперечныхъ положеніяхъ поворотъ на ягодицы представляетъ слѣдующія преимущества надъ поворотомъ на ножки: 1) поворотъ на ягодицы представляетъ болѣе простую операцію, такъ какъ онъ просто превращаетъ данное положеніе въ обыкновенное ягодичное.