2) Поворотъ на ягодицы вызываетъ необходимость вводить въ полость матки только пальцы, межъ тѣмъ какъ для поворота на ножки необходимо вводить всю руку. 3) Для перваго достаточно низводить внизъ тазъ плода, между тѣмъ, какъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ поворота на ножки туловищу плода приходится описать кругъ по всей полости матки. 4) Слѣдовательно, при поворотѣ на ягодицы производится меньшее насиліе и опасность разрыва матки вслѣдствіе травмы представляется гораздо меньшей. Поворотъ на ягодицы оказывается особенно полезнымъ въ тѣхъ неблагопріятныхъ случаяхъ, когда предлежитъ ручка, одно плечо вколочено во входѣ таза, околоплодныя воды отошли, и матка болѣе или менѣе плотно обхватываетъ туловище плода. Въ такихъ случаяхъ о поворотѣ на ножки, почти и рѣчи быть не можетъ. **В. Каплянскій**

40. **Cornelius Kollock. Craniotomy upon the living foetus is not justifiable.** New.-York. Med. Journ. 1892. vol. LVI, № 25). **Краніотомія на живомъ плодѣ не можетъ быть оправдываема.** (Рѣчь, произнесенная на 5-мъ годичномъ засѣданіи *Southern surgical and gynaecological association).*

Краніотомія, вызывая смерть плода со страшнымъ изуродованіемъ его тѣла, часто сопровождается серьезными поврежденіями влагалища и окружающихъ тканей матери. Новѣйшіе успѣхи брюшной хирургіи, примѣненные къ акушерству и гинекологіи, твердо установили тотъ фактъ, что при неправильностяхъ таза своевременно произведенное кесарское сѣченіе почти всегда увѣнчается желаннымъ успѣхомъ. Изъ собранныхъ авторомъ 149 случаевъ съуженій таза, въ которыхъ въ Германіи было произведено кесарское сѣченіе, спасено 109 матерей и 136 дѣтей. Если бы во всѣхъ этихъ случаяхъ прибѣгали бы къ краніотоміи, то погибло бы 149 дѣтей и вѣроятно около 50 матерей (а можетъ быть и больше), слѣдовательно, принесено было бы въ жертву рутинѣ по крайней мѣрѣ 199 человѣческихъ жизней. Во многихъ изъ этихъ случаевъ наступало уже полное истощеніе силъ роженицы, и даже септическія явленія, такъ какъ раньше, чѣмъ рѣшиться на краніотомію, испробованы были различныя, но ни къ чему не поведшія манипуляціи внутри половыхъ органовъ, и этимъ, очевидно, уменьшали шансы матерей на полное выздоровленіе. У *Zweifel*'я изъ 30 кесарскихъ сѣченій 29 удались вполнѣ, *Schauta* на 14 операцій не имѣлъ ни одного смертнаго случая. Въ самое послѣднее время изъ 18 кесарскихъ сѣченій, произведенныхъ въ городѣ *Louisville* (гдѣ имѣли мѣсто засѣданія съѣзда) 14 увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Изъ 8 операцій, произведенныхъ авторомъ въ городѣ *Ohio*, 6 сошли благополучно. Д-ръ *Price* сдѣлалъ множество кесарскихъ сѣченій вполнѣ удачно. Авторъ твердо убѣжденъ, что отъ 85% до 90% всѣхъ больныхъ, у которыхъ неправильность таза или страданія мягкихъ родовыхъ частей исключаютъ возможность рожденія живаго младенца чрезъ натуральные родовые пути, могли бы быть спасены своевременно произведеннымъ кесарскимъ сѣченіемъ.

В. Каплянскій.