

41. М. П. Яковлевъ. Операція Porgo при разрывѣ матки во время родовъ.

(Протокол. Тамбовск. мед. общ. 1892 г. № 1—5).

Въ больницу была доставлена роженица, у которой еще наканунѣ утромъ, начались родовыя боли, а къ вечеру того же дня отошли воды. Рожала 5 разъ, причемъ каждый роды оканчивались оперативнымъ путемъ—щипцы, поворотъ, извлечение и эмбриотомія. По словамъ больной, движеніе плода появилось мѣсяца 3 тому назадъ, а когда были послѣдніе регулы не помнить. Очень сильныя и часто повторявшіяся схватки не задолго до поступленія въ больницу вдругъ прекратились. Роженица 28 лѣтъ отъ роду, она небольшого роста, очень блѣдна, со слабымъ пульсомъ. Изъ влагалища торчитъ правая ручка младенца, отечная и покрытая пузыряремъ. Мелкія части опредѣляются спереди, а головка вправо отъ матки въ видѣ придатка ея. Предлежащая часть—правое плечико стоитъ высоко и неподвижно. Попытка повернуть на ножку ни къ чему не привела; при потягиваніи за лѣвую ножку туловище складывалось вдвое. Дальнѣйшее изслѣдованіе показало, что съ правой стороны матки имѣется большой разрывъ, черезъ который головка плода вышла въ брюшную полость. Желая такъ или иначе окончить роды, принимавшій больную врачъ рѣшилъ наложить на шейку плоду тупой крючекъ. При потягиваніи за послѣдній, головка оторвалась и осталась въ брюшной полости, туловище же было извлечено. Изъ влагалища отдѣлялось небольшое количество крови, пульсъ слабѣлъ и становились рѣзче признаки внутренняго кровотеченія. Принимая во вниманіе все вышеннеложенное, авторъ тотчасъ приступилъ къ чревостъченію, не смотря на неблагоприятную обстановку, въ которой приходилось оперировать. Разрѣзъ проведенъ по *linea. alba*. Кишки и сальникъ, покрытый кровяными сгустками отодвинуты кверху и обнажена матка, причемъ рядомъ съ ней съ правой стороны оказалась головка плода, которая тотчасъ же была извлечена. По передне-боковой стѣнки матки шелъ продольный разрывъ, хотя и сократившійся, но все еще кровоточащій. Въ виду послѣдняго обстоятельства и изъ желанія избавить больную впредь отъ подобныхъ опасностей рѣшено было удалить матку. Оставшаяся послѣ ампутаціи культя вмѣстѣ со жгутомъ была шита въ нижній уголъ раны. Туалетъ брюшины произведенъ растворомъ сулемы 1 : 1000, рана зашита катгуттомъ и шелкомъ. Влагалище обеззаражено сулемой и затампонировано іодоформированной марли. Наложена обычная повязка. Въ тотъ же день вечеромъ появилась рвота и боли внизу живота. На другой день t^0 поднялась до 38,1, пульсъ 140. Животъ вздуть и болѣзненъ. На третьи сутки смерть, при явленіяхъ септического перитонита.

Д. Рузи.

42. Борчиковскій Н. В. Случай родовъ, осложненныхъ разрывомъ матки и опухолью въ маломъ тазу, съ послѣдовательною операціей по Porgo (Южно-Русская Медиц. газета 1892 г. № 6).

Больная, принятая въ родяхъ въ Елизаветградскую больницу 16 сентября, до замужества была здорова, крови носила правильно черезъ 4 недѣли; на 18 году вышла замужъ, и на второмъ году родила мертвого. Вторые роды годъ спустя окончены перфорацией вслѣдствіе суженія вы-