

41. М. П. Яковлевъ. Операция Porgo при разрывѣ матки во время родовъ.

(Протокол. Тамбовск. мед. общ. 1892 г. № 1—5).

Въ больницу была доставлена роженица, у которой еще наканунѣ утромъ, начались родовыя боли, а къ вечеру того же дня отошли воды. Рожала 5 разъ, причемъ каждый роды оканчивались оперативнымъ путемъ—щипцы, поворотъ, извлечение и эмбриотомія. По словамъ больной, движеніе плода появилось мѣсяца 3 тому назадъ, а когда были послѣдніе регулы не помнить. Очень сильныя и часто повторявшіяся схватки не задолго до поступленія въ больницу вдругъ прекратились. Роженица 28 лѣтъ отъ роду, она небольшого роста, очень блѣдна, со слабымъ пульсомъ. Изъ влагалища торчитъ правая ручка младенца, отечная и покрытая пузырями. Мелкія части опредѣляются спереди, а головка вправо отъ матки въ видѣ придатка ея. Предлежащая часть—правое плечико стоитъ высоко и неподвижно. Попытка повернуть на ножку ни къ чему не привела; при потягиваніи за лѣвую ножку туловище складывалось вдвое. Дальнѣйшее изслѣдованіе показало, что съ правой стороны матки имѣется большой разрывъ, черезъ который головка плода вышла въ брюшную полость. Желая такъ или иначе окончить роды, принимавшій больную врачъ рѣшилъ наложить на шейку плоду тупой крючекъ. При потягиваніи за послѣдній, головка оторвалась и осталась въ брюшной полости, туловище же было извлечено. Изъ влагалища отдѣлялось небольшое количество крови, пульсъ слабѣлъ и становились рѣзче признаки внутренняго кровотечения. Принимая во вниманіе все вышенное, авторъ тотчасъ приступилъ къ чревостъченію, не смотря на неблагоприятную обстановку, въ которой приходилось оперировать. Разрѣзъ проведенъ по *linea. alba*. Кишки и сальникъ, покрытый кровяными сгустками отодвинуты кверху и обнажена матка, причемъ рядомъ съ ней съ правой стороны оказалась головка плода, которая тотчасъ же была извлечена. По передне-боковой стѣнки матки шелъ продольный разрывъ, хотя и сократившійся, но все еще кровоточащій. Въ виду послѣдняго обстоятельства и изъ желанія избавить больную впредь отъ подобныхъ опасностей рѣшено было удалить матку. Оставшаяся послѣ ампутаціи культя вмѣстѣ со жгутомъ была шита въ нижній уголокъ раны. Туалетъ брюшины произведенъ растворомъ сулемы 1 : 1000, рана зашита катгуттомъ и шелкомъ. Влагалище обеззаражено сулемой и затампонировано іодоформированной марли. Наложена обычная повязка. Въ тотъ же день вечеромъ появилась рвота и боли внизу живота. На другой день t^0 поднялась до 38,1, пульсъ 140. Животъ вздуть и болѣзненъ. На третьи сутки смерть, при явленіяхъ септического перитонита.

Д. Рузи.

42. Борчиковскій Н. В. Случай родовъ, осложненныхъ разрывомъ матки и опухолью въ маломъ тазу, съ послѣдовательною операцией по Porgo (Южно-Русская Медиц. газета 1892 г. № 6).

Больная, принятая въ родяхъ въ Елизаветградскую больницу 16 сентября, до замужества была здорова, крови носила правильно черезъ 4 недѣли; на 18 году вышла замужъ, и на второмъ году родила мертвого. Вторые роды годъ спустя окончены перфорацией вслѣдствіе суженія вы-

хода. Послѣ этихъ родовъ хворала; лѣчилась, но безуспѣшно отъ опухоли, причемъ ей въ виду опасности совѣтовали остерегаться беременности. Черезъ годъ снова забеременѣла и въ срокъ, 15 сентября, начались роды; воды отошли скоро, боли усилились, явился упадокъ силъ, тошнота и рвота. Объективно: субъектъ крѣпкій, тазъ правильный, слабая дѣятельность сердца и пульса, t° нормальна, тошнота и рвота, залоръ, вздутие и боль внизу живота, рѣзкое выпячиваніе покрововъ живота съ обозначеніемъ членорасположенія плода, сердцебиенія плода не слышно, изъ рукава сукровица съ запахомъ. Per vaginam найдена въ правомъ и заднемъ сводахъ значительной величины твердая, неподвижная и болѣзненная опухоль, прикрѣпленная къ крестцовой кости; зѣвъ открытъ на два пальца, предлежитъ «какъ будто край ножки». Вѣроятный діагнозъ: частичный разрывъ матки, выходъ плода въ брюшную полость съ значительнымъ кровонзліаніемъ, съ начавшимся септическимъ перитонитомъ; и опухоль неизвѣстнаго характера въ маломъ тазу, мѣшающая естественному родоразрѣшенію.

Консультативно рѣшено сдѣлать чревосѣченіе, удалить матку съ придатками по *Porro*, а опухоль не трогать. При соблюденіи всѣхъ правилъ хирургіи и антисептики удаленъ изъ брюшной полости вмѣстѣ съ плацентой мертвый, доношенный, мужского пола плодъ. По удаленіи сгустковъ крови, матка, на половину сократившаяся, выведена вмѣстѣ съ придатками въ рану и положенъ жомъ, надъ которымъ срѣзана матка съ придатками, культи обшита шелковыми лигатурами и наложено 5 шелковыхъ швовъ на разрывъ, шедшій, начинаясь почти у края передней губы, вертикально кверху, по шейкѣ и отчасти по тѣлу матки, длиною около 7 см. Края сильно разошедшагося разрыва инфильтрированы, видъ ихъ несвѣжій. Накладывать этажные швы на нижній край разрыва въ глубинѣ, по близости мочеваго пузыря было кополиво. Нижній край брюшины былъ инфильтрированъ. Опухоль величиною въ страусово яйцо въ видѣ овала была приращена къ крестцовой кости, и хотя другихъ сращеній не имѣла, оставлена была въ покоѣ. Культи, не снимая жома, вшита въ рану, на которую положено 9 швовъ. Операция прошла гладко въ 1¹/₂ ч., только въ концѣ ея пришлось вырывать 4 шприца эфира въ виду упадка пульса, который затѣмъ поднялся до 74 въ м. Въ 6 ч. вечера пульсъ сталъ нитевиднымъ, дыханіе скорымъ, явились тошнота, рвота, холодный потъ и въ 7 ч. смерть отъ *collapsus*.

Вскрытіе показало: раны чисты, швы сидятъ крѣпко, кровонзліаній и выпота не найдено, пузырь пустой, сосуды нижняго отдѣла брюшины переполнены кровью, опухоль шла отъ послѣдняго поясничнаго позвонка и, расширяясь, спускалась по стѣнкамъ крестца въ малый тазъ и оканчивалась широкимъ основаніемъ у послѣдняго крестцоваго позвонка, и крѣпко приросла къ крестцу.

Микроскопъ далъ картину фибромы. Авторъ относитъ ее къ *fibromioma ret cocervicalia*. Опухоль матки, наполняя большую часть малаго таза, была причиною разрыва шейки, вѣроятно при первыхъ же потугахъ во

время отхожденія водъ, а плодъ 2 сутокъ лежавшій вызвалъ перитонитъ, что и заставило сдѣлать *Porro* по вѣбрюшинному способу.

А. Заболотскій.

43. Комаровъ С. С. Свищи млечныхъ ходовъ. (Медиц. Обозр., № 17, 1892 г.).

Свищи млечныхъ ходовъ рѣдки, трудны для лѣченія и истощаютъ больныхъ. Авторъ наблюдалъ случай млечнаго свища во время беременности съ увеличеніемъ количества молока до 2^{1/2} мѣсяцевъ ея.

Крѣпкая, 24 л., менструируетъ съ 14 лѣтъ, черезъ 3 нед. по 4 дня, рожала 4 раза въ срокъ. Первыхъ двухъ дѣтей кормила сама около года, третьяго—6 недѣль, и четвертаго нѣсколько дней изъ-за трещинъ на соскахъ, лѣченныхъ домашними средствами. На 10-й день знобъ, лихорадка. то 34,4, правая грудь, покраснѣла и опухла. Черезъ недѣлю нарывы; вскрывшійся, благодаря припаркамъ и пластырямъ, тремя ходами кнаружи и нѣсколько книзу отъ околососкового кружка. То пала до нормы, но затѣмъ новый знобъ и повышение t° и образованіе нарыва, вскрытаго авторомъ 11 февр. 1891 г. Кожа грязна отъ пластырей, двѣ раны закрылись, изъ третьей окруженной краснотой отъ потери эпителия сочился гной. Новый нарывъ снаружи отъ соска вскрытъ разрѣзомъ по радіусу и выпущено съ чайною ложку гною. Дренажъ и повязка. Молока мало. Кормленіе запрещено. 16 декабря новый нарывъ книзу отъ кружка, разрѣзъ, гною мало. 6 февраля 1892 г. Самостоятельная рана закрылась; на ея мѣстѣ затвердѣніе; сдѣлано два разрѣздренажа входить глубоко, изъ разрѣзовъ идетъ молоко съ гноемъ. Беременность 6 недѣль.

10 февраля. Молока изъ ранъ идетъ больше. Снаружи отъ соска новый нарывъ. Разрѣзъ и дренажъ. Окружность прежнихъ ранъ смазана палочкой ляписа. 13 февраля. Изъ послѣдней раны идетъ чистый гной, изъ старыхъ очень большое количество молока. Изъ прежнихъ ранъ дренажи удалены прижжены въ глубину палочкой ляписа и внутрь данъ іодистый калий для уменьшенія галакторреи. Вторая грудь даетъ всѣ измѣненія, присущія беременности. 20 февраля. Свищи отдѣляютъ молоко, края омолодѣли. Прижиганіе ляписомъ. Послѣдняя рана заживаетъ.

29 февр. Свищи отдѣляютъ молоко. Въ нихъ заложены кристаллы хлораль-гидрата, и назначено вводить ихъ черезъ день. Послѣдняя рана закрылась, беременность продолжается.

12 марта. Одинъ изъ свищей закрылся послѣ троекратнаго введенія хлораль-гидрата.

А. Заболотскій.

44. Добронравовъ В. А. Д-ръ. Наблюденіе надъ дѣйствіемъ ихтіоля въ женской практикѣ (Южно-Русская Медицина. газ. 1892, № 12).

Авторъ примѣнялъ ихтіоль въ 278 случаяхъ, употребляя его не только въ гинекологическихъ случаяхъ, а для лѣченія даннаго организма вообще, руководясь такими фармакологическими данными: представляя собою двойныя соли ихтіолосульфиновокислаго натра съ аммоніемъ, цинкомъ, литіемъ