

время отхожденія водъ, а плодъ 2 сутокъ лежавшій вызвалъ перитонитъ, что и заставило сдѣлать *Porro* по вѣбрюшинному способу.

А. Заболотскій.

43. Комаровъ С. С. Свищи млечныхъ ходовъ. (Медиц. Обозр., № 17, 1892 г.).

Свищи млечныхъ ходовъ рѣдки, трудны для лѣченія и истощаютъ больныхъ. Авторъ наблюдалъ случай млечнаго свища во время беременности съ увеличеніемъ количества молока до $2\frac{1}{2}$ мѣсяцевъ ея.

Крѣпкая, 24 л., менструируетъ съ 14 лѣтъ, черезъ 3 нед. по 4 дня, рожала 4 раза въ срокъ. Первыхъ двухъ дѣтей кормила сама около года, третьяго—6 недѣль, и четвертаго нѣсколько дней изъ-за трещинъ на соскахъ, лѣченныхъ домашними средствами. На 10-й день знобъ, лихорадка. то 34,4, правая грудь, покраснѣла и опухла. Черезъ недѣлю нарывы; вскрывшійся, благодаря припаркамъ и пластырямъ, тремя ходами кнаружи и нѣсколько книзу отъ околососкового кружка. То пала до нормы, но затѣмъ новый знобъ и повышение t^0 и образованіе нарыва, вскрытаго авторомъ 11 февр. 1891 г. Кожа грязна отъ пластырей, двѣ раны закрылись, изъ третьей окруженной краснотой отъ потери эпителия сочился гной. Новый нарывъ снаружи отъ соска вскрытъ разрѣзомъ по радіусу и выпущено съ чайною ложку гною. Дренажъ и повязка. Молока мало. Кормленіе запрещено. 16 декабря новый нарывъ книзу отъ кружка, разрѣзъ, гною мало. 6 февраля 1892 г. Самостоятельная рана закрылась; на ея мѣстѣ затвердѣніе; сдѣлано два разрѣза дренажъ входитъ глубоко, изъ разрѣзовъ идетъ молоко съ гноемъ. Беременность 6 недѣль.

10 февраля. Молока изъ ранъ идетъ больше. Снаружи отъ соска новый нарывъ. Разрѣзъ и дренажъ. Окружность прежнихъ ранъ смазана палочкой ляписа. 13 февраля. Изъ послѣдней раны идетъ чистый гной, изъ старыхъ очень большое количество молока. Изъ прежнихъ ранъ дренажи удалены прижжены въ глубину палочкой ляписа и внутрь данъ іодистый калий для уменьшенія галакторреи. Вторая грудь даетъ всѣ измѣненія, присущія беременности. 20 февраля. Свищи отдѣляютъ молоко, края оmozолѣли. Прижиганіе ляписомъ. Послѣдняя рана заживаетъ.

29 февр. Свищи отдѣляютъ молоко. Въ нихъ заложены кристаллы хлораль-гидрата, и назначено вводить ихъ черезъ день. Послѣдняя рана закрылась, беременность продолжается.

12 марта. Одинъ изъ свищей закрылся послѣ троекратнаго введенія хлораль-гидрата.

А. Заболотскій.

44. Добронравовъ В. А. Д-ръ. Наблюденіе надъ дѣйствіемъ ихтіола въ женской практикѣ (Южно-Русская Медицина. газ. 1892, № 12).

Авторъ примѣнялъ ихтіолъ въ 278 случаяхъ, употребляя его не только въ гинекологическихъ случаяхъ, а для лѣченія даннаго организма вообще, руководясь такими фармакологическими данными: представляя собою двойныя соли ихтіолосульфиновокислаго натра съ аммоніемъ, цинкомъ, литіемъ