

ренія пилюли и капсулы съ ихтіоловыми—натромъ, аммоніемъ и литіемъ являются надежнымъ противокатарральнымъ разрѣшающимъ средствомъ, дающимъ при настойчивомъ употребленіи улучшенія пищеваренія, бодрость и хорошее самочувствіе; д) при различныхъ ревматическихъ страданіяхъ; е) при экземѣ съ зудомъ и вообще ж) при различныхъ страданіяхъ организма съ приливомъ и застойною гипереміею.

**А. Заболотскій.**

**45. S. Kurtz. Ostosowaniu thiolu w gynecologii (Kronika lekarska, 1892, № 7). Обь употребленіи тіола въ гинекологіи.**

Тіоль  $\text{C}_{56}\text{H}_{36}\text{Se Na}_4\text{O}_6$ , имѣющій довольно обширное примѣненіе въ дерматологіи, былъ впервые предложенъ *Gottschalk*’омъ въ Берлинѣ для лѣченія женскихъ болѣзней (*Centralblatt für Gynaecol.*, № 12, 1891). Авторъ пользовался тіоломъ въ 47-и случаяхъ различныхъ заболѣваній женской половой сферы и пришелъ къ слѣдующимъ выводамъ. А) Тіоль прекрасно дѣйствуетъ при изъязвленіяхъ маточной шейки и воспалительныхъ заболѣваніяхъ слизистой оболочки матки (*endometritis corporis et cervicis*), такъ какъ: 1) заживленіе язвъ происходитъ быстро (въ теченіи двухъ или трехъ недѣль); при этомъ тіоль примѣняется въ 10%, 15%, 20% растворѣ въ глицеринѣ въ формѣ смазываній, или тампоновъ, пропитанныхъ тѣмъ же растворомъ; 2) смазыванія тіоломъ никогда почти не вызываютъ кровотеченій, что имѣетъ мѣсто при другихъ средствахъ; 3) смазыванія тіоломъ никогда не влекутъ за собой боли, жженія и вообще никакого непріятнаго ощущенія, что почти всегда бываетъ при примѣненіи іода, азотнокислаго серебра, хлористаго цинка, карболовой кислоты, и въ особенности ихтіола.

В) Тіоль хорошо дѣйствуетъ при хроническихъ околоматочныхъ воспаленіяхъ съ выпотами, такъ какъ онъ 1) вызываетъ быстрое всасываніе выпотовъ; послѣдніе исчезаютъ обыкновенно чрезъ 3—4 недѣли; 2) уменьшаетъ сопутствующія этимъ страданіямъ боли въ крестцѣ и пахахъ. *Gottschalk* кромѣ смазываній кисточкой и тампоновъ, пропитанныхъ тіоломъ, примѣнялъ еще тіоловую мазь для втираній въ нижнюю часть живота, влагаліщные шарики съ тіоломъ и давалъ также тіоль внутрь въ пилюляхъ. Предъ ихтіоломъ тіоль имѣетъ нѣкоторыя важныя преимущества, именно тіоль, въ противоположность ихтіолу, лишенъ всякаго запаха, не причиняетъ ни малѣйшаго жженія, а пятна отъ тіола на бѣлѣ легко удаляются помощью мыла и теплой воды (*Bardet, Delpêche*). Въ будущемъ тіоль въ гинекологіи, вѣроятно, совсѣмъ вытѣснитъ ихтіоль.

**В. Каплянскій.**

**46. Warszawski. Haematoma vulvae et vaginae и Morbus maculosus Werlhofii (Gazeta Lekarska, 1892, № 41).**

12-го октября 1891 поступила въ городскую больницу въ Варшавѣ больная S. J., 22-хъ лѣтъ, благополучно родившая 12 дней тому назадъ здоровую дѣвочку, съ признаками тяжелаго остраго малокровія и колоссальнымъ увеличеніемъ и припуханіемъ правой большой губы и покрововъ лобка. Мочевой пузырь вздутъ и переполненъ мочою. Съ большимъ трудомъ удалось

сквозь массу объемистой кровяной опухоли найти отверстие уретры для катеризации. Из влагалища вытекают зловонные выделения, желтоватого цвета.  $T^{\circ}$ — $40^{\circ}C$ . Диагноз—*Endometritis puerperalis et haematoma vulvae et vaginae post partum*. После надлежащего разреза опухоли и частых промываний матки 2% раствором *acidi carbolici* состояние больной значительно улучшилось, и на 17-й день она выписалась из больницы жалуюсь лишь на повторяющееся временами кровотечение из десен, повидному без всякой причины. *Haematoma vulvae et vaginae* принадлежит к весьма редким осложнениям родового акта. *Winckel* на 1600 родов наблюдал кровяную опухоль 1 раз, *Гугенбергер* на 14000 родов 11 раз, в Вѣнѣ на 33241 родов—18 раз. Причиной развития кровяной опухоли считают травматическія поврежденія во время прорѣзыванія головки. Совсѣмъ не то оказывается у нашей больной, у которой *haematoma vulvae et vaginae* внезапно появилось чрезъ 12 дней послѣ родовъ. Чрезъ 3 недѣли послѣ выписки больная опять поступила въ больницу въ состояніи острого малокровія и крайняго упадка силъ, 7 дней тому назадъ началось кровотечение изъ матки, котораго ничѣмъ не удастся остановить.  $T^{\circ}$ — $38,3^{\circ}$ , пульсъ 140 въ минуту, нитевидный, неправильный, нижнія конечности холодны. На всемъ тѣлѣ—обильная сыпь мелкихъ, голубовато-красныхъ пятнышекъ, не исчезающихъ отъ давленія пальцемъ. Обильное кровотечение изъ десенъ, непріятный запахъ изъ рта. Къ тонамъ сердца и сосудовъ примѣшанъ анемичный шумъ. Тупость сердца увеличена, точно также увеличены печень и селезенка. Моча—красная. Влагалище выполнено кровяными свертками. Изъ полости матки добытъ щипцами одинъ большой свертокъ, представляющій какъ бы отпечатокъ всей внутренней поверхности матки. Такимъ образомъ предъ нами *morbus maculosus Werlhofii*, уже давно начавшій развиваться и который должно признать настоящей причиной *haematomatis vulvae et vaginae*. Для лѣченія испробовали *hydrastininum muriaticum*, впервые предложенное *Czempin'*омъ, въ пилюляхъ по 3 ежедневно, 0,025 въ каждой пилюлѣ. Успѣхъ превзошелъ всякія ожиданія: уже на 3-й день пятнышки начали блѣднѣть, и моча прояснилась. Послѣ 30-й пилюль почти прекратились кровотечения изъ десенъ и половыхъ органовъ,  $t^{\circ}$  достигла нормы, пятнышки исчезли, только пульсъ продолжалъ держаться на высотѣ 120 въ минуту. Чрезъ 5 дней по прекращеніи принятія пилюль снова появились пятнышки на покровахъ грудной кѣтки, хотя и въ меньшемъ количествѣ,  $t^{\circ}$  поднялась до  $38,5^{\circ}$ . Вновь назначены пилюли съ *hydrastininum muriaticum*, и послѣ принятія 20 пилюль больная выписалась изъ больницы совершенно здоровой.

В. Каплянскій.

47. М. Lebensbaum. Rak pochny, powstały w przebiegu raka ciała macicy droga samozaszczepienia (Gazeta lekarska, 1892, № 10). Ракъ влагалища, происшедшій отъ рака тѣла матки путемъ аутоинкуляции (самопрививанія, autoimplantatio).

1-го апрѣля 1892 года поступила въ гинекологическое отдѣленіе еврейской больницы въ Варшавѣ больная F. S., 27-ми лѣтъ, сильно малокров-