

къ серединѣ, отличаются большей величиной, заключаютъ въ себѣ большія овальныя ядра, нныя по нѣсколько; во многихъ замѣчается митозъ и многополюсныя веретенообразныя фигуры; въ центрѣ плоскоэпителиальныхъ островковъ—луковичныя канкроидныя образования изъ большей частью безъядерныхъ клѣтокъ; на границѣ между мускулатурой матки и новообразованиемъ лежитъ слой, инфильтрированный мелко-клѣточными элементами, мѣстами переходящій въ нагноеніе. На поверхности, не занятой разраженіями, нигдѣ не удалось найти слѣдовъ эпителия слизистой оболочки, такъ-какъ вся поверхность оказалась изъязвленной, поэтому въ данномъ случаѣ нельзя было доказать первоначальнаго замѣщенія цилиндрическаго эпителия плоскимъ.

#### А. Пекарская.

49. D-r Janvrin. The palliative treatment of such cases of cancer of the uterus and its annexa, as are not amenable to radical operative measures (The New-York Medical Journal 1892, Vol. LVI, № 28). Палліативное лѣченіе тѣхъ случаевъ рака матки и ея придатковъ которые не поддаются радикальнымъ оперативнымъ мѣропріятіямъ.

Авторъ горячо выражаетъ желаніе, чтобы въ предмѣстіяхъ каждаго большаго города были учреждены особыя санаторіи, назначенныя для неизлѣчимыхъ больныхъ женщинъ, страдающихъ ракомъ матки и придатковъ, гдѣ свѣжій воздухъ, полный просторъ и вообще надлежащая обстановка помогали бы врачу въ его тяжелой задачѣ. Мѣстное лѣченіе должно состоять въ энергичномъ примѣненіи острой ложечки, глубоко проникающей въ самый центръ инфильтраціи. Если во время операціи ложечка тѣмъ или другимъ путемъ попадаетъ въ полость брюшины, то для предупрежденія выпаденія кишекъ вкладываютъ антисептическія губки съ привязанными къ нимъ нитками. Кровотеченіе предоставляется самому себѣ, или оно можетъ быть задерживаемо горячими душами, употребленіемъ насыщеннаго раствора танина, примѣненіемъ термокаутера, а въ особенно упорныхъ случаяхъ временнымъ тампонираніемъ влагалища. Когда уже прекратилось всякое истеченіе, и окружающія части вытерты досуха, операціонная поверхность выстилается гигроскопическими компрессами (*pledgets of absorbcut cotton*), и прижигается 50% растворомъ хлористаго цинка, предварительно покрывши выпавшія кишки іодоформенной марлей. Черезъ 24 часа компрессы и марля удаляются, полость промывается 1:5000 растворомъ сулемы, вытирается досуха и посыпается порошкомъ іодоформа. Струпья отъ хлористаго цинка черезъ недѣлю обыкновенно отваливаются, оставляя чистую поверхность. Авторъ особенно напираетъ на прекращеніе всякихъ истеченій и полное вытираніе досуха операціонной поверхности прежде, чѣмъ приступить къ прижигавію хлористымъ цинкомъ, такъ какъ результаты получаются тогда гораздо лучшіе. Препараты мышьяка и желѣза даются внутрь, какъ общетоническія средства, но безъ всякой надежды на ихъ специфическое мѣстное дѣйствіе.

#### В. Каплянскій.