

при крайне боковомъ отклоненіи нерастяжимой маточной шейки, позво- тельно сдѣлать послѣдовательную брахіотомію, если ручка (не выпавшая еще) мѣшаетъ прохожденію тудовища.

4. При живомъ плодѣ и при сильныхъ степеняхъ суженія таза, слѣ- дуетъ предпочитать кесарское сѣченіе или операцію *Porro*.

Ф Краснопольскій.

79. Ф. Ф. Кѣтлинскій. Къ вопросу объ операціи отнятія выпавшей ручки.

(Прот. засѣд. акуш.-гинекол. Общ. въ Кіевѣ. Годъ 5, томъ 5, вы- пуски 9 и 10).

Авторъ описываетъ случай, въ которомъ по его мнѣнію, отнятіе ручки было показаннымъ и необходимымъ. Случай этотъ слѣд.: женщина съ узкимъ тазомъ, содж. ext.=15 см; diagonalis=10,5; рождаетъ 3-ій разъ; первые роды кончились преждевременно живымъ ребенкомъ, вторыя—изсѣченіемъ плода. Роды продолжаются 2 сутокъ, воды прошли около сутокъ тому назадъ; ребенокъ во второмъ косомъ положеніи; выпала лѣвая ручка; сердцебіеніе плода не выслушивается, плечо вколочено, нижній сегментъ матки растянута. Предпринять поворотъ подъ хлороформомъ, съ трудомъ удавалось провести  $\frac{1}{2}$  руки, чему мѣшали тетаническія сокращенія матки; вправить выпавшую ручку не удавалось; поэтому произведена экзартикуляція въ локтевомъ су- ставѣ, послѣ чего плечо моментально было продвинуто въ ниже-заднюю часть матки, и поворотъ совершенъ, съ послѣдующимъ извлеченіемъ. Новорож- денная, безъ признаковъ жизни, положена въ лоханку у ногъ оператора, въ то время какъ послѣдній занялся отдѣленіемъ дѣтскаго мѣста; но ребенокъ оказался живымъ, заявивъ о своей жизни толчкообразными струйками крови изъ перерѣзанной *art. brachialis*; немедленно артерія перевязана, наложена повязка; вслѣдъ за тѣмъ дыханіе ребенка установилось, съ трахеальными хрипами.

И мать, и ребенокъ, остались въ живыхъ.

Ф. Краснопольскій.

80. Picqué. Opération césarienne suivie de succès pour la mère et pour l'enfant. (Gaz. des Hôpitaux 1893, № 37). Кесарское сѣченіе съ благополучнымъ исходомъ для матери и для ребенка.

Исторія этого случая вкратцѣ такова: Г-жа Б., 37 лѣтъ, слабого здо- ровья, менструируетъ съ 17 лѣтъ необильно но правильно; мочеиспусканія всегда были нѣсколько затрунены.

Замужемъ 10 мѣсяцевъ, послѣдняя менструація 25 сентября 1891 года. Спрошенный въ началѣ беременности врачъ діагносцировалъ фиброміому, за- нимающую всю полость таза, и совѣтовалъ прервать беременность, на что боль- ная не согласилась.

При изслѣдованіи авторомъ въ іюнѣ 1892 года найдено:

Пальпація—полость таза занята твердой неподвижной массой; положеніе плода поперечное, головка влѣво, мелкія части вправо, спинка обращена впе- редъ. Кромѣ того, въ правомъ углу матки прощупывается фиброзная опухоль