

ЖУРНАЛЬ АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХЪ БОЛѢЗНЕЙ,

органъ Акушерско-Гинекологическаго Общества въ С.-Петербургѣ.

ГОДЪ СЕДЬМОЙ.

АВГУСТЪ 1893, № 8.

ОРИГИНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ, ЛЕКЦІИ, КАЗУИСТИКА.

ХІІ.

О Т Ч Е Т Ъ

о моей акушерской дѣятельности въ земствѣ съ февраля
1885 года по январь 1893 года.

(Черниговскій уѣздъ).

В. Потѣнко.

Предлагаемый акушерскій отчетъ, по своеобразнымъ условіямъ сельской земско-медицинской практики, не отличается особенной точностью и полнотой наблюденій; въ большинствѣ случаевъ въ селахъ и небольшихъ городкахъ (какъ тотъ, гдѣ я живу теперь) врача приглашаютъ только въ трудныхъ и запущенныхъ случаяхъ родовъ или выкидыша, такъ что весьма часто, напр., нѣтъ времени для точныхъ измѣреній таза и др. болѣе подробныхъ разспросовъ роженицы; ко всему этому слѣдуетъ прибавить массу другой, очень разнообразной медицинской работы у земскаго врача.

Въ настоящій отчетъ вошли, кромѣ срочныхъ и преждевременныхъ родовъ, случаи выкидыша, опредѣленій срока беременности (не всѣ) и болѣзни беременныхъ (тоже не всѣ случаи были записаны).

Въ первые годы моей практики въ одномъ участкѣ. а потомъ—и въ другомъ (1885 г., 1888 г. и часть 1889 г.),

помощниками моими могли быть только мало опытные въ акушерскомъ дѣлѣ фельдшера и простыя сельскія бабки (чаще всего), въ остальные-же годы—помощницей чаще бывала акушерка-фельдшерица; весьма часто приходилось дѣлать акушерскую операцію и безъ всякихъ помощниковъ (не считая мужа роженицы).

Съ 1884 года по май 1888 г. я практиковалъ только въ селахъ участка Черниговскаго уѣзда, а съ мая мѣсяца 1888 г. по 1893 годъ, кромѣ небольшого числа сель, я имѣлъ практику въ заштатномъ городкѣ того-же Черниговскаго уѣзда (городокъ имѣетъ около 12,000 жителей обоого пола по преимуществу крестьянскаго и казацкаго сословія).

Въ первый годъ (1884 г.) моей земскомедицинской практики у меня совершенно не было акушерскихъ случаевъ,—въ 1885 году было только три случая, въ 1886—вдвое больше, нежели въ 1885 г. и т. д. число случаевъ прогрессируетъ (см. прилагаемыя акушерскія таблицы).

Увеличеніе числа акушерскихъ случаевъ въ моей практикѣ всегда совпадало съ назначеніемъ въ мой участокъ въ помощницы мнѣ акушерки-фельдшерицы; крестьянка въ акушерскихъ и гинекологическихъ случаяхъ всегда охотнѣе обращается къ жепщинѣ и только потомъ, по совѣту акушерки,—къ врачу (мужчинѣ); такимъ образомъ она (крестьянка) мало-по-малу пріучается къ мысли приглашать врача для акушерской помощи въ нормальныхъ случаяхъ родовъ, потомъ являться въ амбулаторію спеціально для опредѣленія состоянія ея беременности и при заболѣваніяхъ половой сферы. Не маловажное значеніе для акушерскаго успѣха среди крестьянокъ имѣютъ удачныя исходы первыхъ операцій акушерскихъ и долгое пребываніе одного и того-же врача въ одномъ участкѣ; съ 1888 года число акушерскихъ случаевъ у меня значительно увеличивается еще благодаря переходу на жительство въ значительно населенный пунктъ, гдѣ къ тому-же довольно много евреевъ (около 1½ тысячи).

Всѣ роды, задержанія дѣтскаго мѣста, нѣкоторые случаи выкидыша и нѣкоторыя заболѣванія беременных требовали медицинскон помощи на дому, а для опредѣленія срока беременности, при иныхъ случаяхъ выкидыша и большей части болѣзней беременныхъ, пациенты явля-

лись въ амбулаторію и только рѣдкіе (оперативные) случаи выкидыша лѣчены въ больничкѣ.

Скажу нѣсколько словъ *объ антисептикахъ при родахъ*. Въ виду очень грязной и не гигиеничной обстановки въ домахъ крестьянъ и евреевъ—мало пригодной для оказанія акушерской, особенно оперативной, помощи, я всегда старался, насколько возможно, вести роды и помогать при выкидышахъ строго *антисептично*, а именно: наружные половые органы роженицы всегда обмывались теплой водой съ мыломъ и щеткой, а потомъ растворомъ сулемы (1 : 1000); иногда (въ первые годы моей практики) еще до родовъ влагалище промывалось сулемой (1 : 2000); руки акушера и акушерки основательно моются по Фрюбингеру и всякій разъ при внутреннемъ изслѣдованіи роженицы руки моются сулемой; вазелиномъ смазывались только щипцы послѣ основательной ихъ дезинфекціи, остальные инструменты и пальцы для изслѣдованія роженицы вазелиномъ и др. маслами не смазывались; если рука акушера вводилась въ матку, матка тогда однократно промывалась или 3% растворомъ борной кислоты (чаще всего) или 2% раствор. карболовой кислоты (рѣже всего); всякій разъ при родахъ приходилось производить внутреннее изслѣдованіе роженицы, такъ какъ обыкновенно врачъ былъ приглашаемъ въ запущенныхъ случаяхъ родовъ, гдѣ только внутреннее изслѣдованіе могло рѣшить, къ какому оперативному вмѣшательству слѣдуетъ прибѣгнуть или не слѣдуетъ. Нѣсколько разъ былъ испробованъ креолинъ (1%—1½% водная эмульсія) для промыванія матки, особенно при послѣродовыхъ эндометритахъ, а иногда—послѣ оперативныхъ случаевъ родовъ—и всегда съ хорошимъ успѣхомъ; большое неудобство его—это противный запахъ и осадокъ на стеклянномъ наконечникѣ, трудно очищаемый. Отравленій дезинфицирующими веществами не наблюдалось. *Асептически* вести роды я не рисковалъ за отсутствіемъ къ тому-же подходящаго стерилизатора для перевязочнаго матеріала,—хотя выскабливанія въ больничкѣ иногда производились безъ погруженія инструментовъ въ антисептическія жидкости и безъ промыванія матки тѣми-же жидкостями—и эти случаи проходили безъ повышенія температуры.

Хлороформированія при оперативныхъ случаяхъ ро-

довъ по возможности я избѣгалъ, за неимѣнемъ въ данный моментъ иногда сколько-нибудь опытнаго помощника, хотя-бы фельдшера или акушерки, — въ очень трудныхъ случаяхъ (наприм., сухой поворотъ) иногда приходилось хлороформировать и при помощницѣ — простой сельской бабкѣ. Смертныхъ случаевъ при хлороформированіи или въ зависимости отъ хлороформированія не было. Большинство *оперативныхъ родовъ и другихъ операций*, связанныхъ съ акушерскими случаями, проведены *безлихорадочно*, что зависитъ отъ антисептического веденія родовъ и крѣпкой организаціи пациентокъ. Вообще можно сказать, что въ тѣхъ случаяхъ родовъ, гдѣ до прихода врача манипулировала очень смѣлая сельская бабка, наблюдалось не совсѣмъ гладкое теченіе послѣоперационное и часто наблюдалось даже послѣродовое заболѣваніе (напр., послѣродовой тяжелой эндометритъ или параметритъ); если бабка не изслѣдовала роженицы, то послѣ оперативнаго вмѣшательства врача выздоровленіе шло безъ повышенія температуры. Къ слову сказать, нѣкоторыя сельскія повитухи (тайно, конечно, отъ медицинскаго персонала) дѣлають нѣкоторыя акушерскія операціи (конечно, своеобразно) безъ инструментовъ, напр., вытаскивають (извлечение) за головку младенца руками (какъ акушерскими щипцами) или вправляютъ выпавшую ручку младенца и младенецъ рождается самъ (безъ вреда для роженицы); конечно, такія хирургическія манипуляціи бабокъ не всегда проходятъ даромъ для матери и чаще всего ведутъ къ смерти младенца (подобный случай описанъ у меня въ акушерскихъ таблицахъ); такія смѣлыя операціи бабками производятся безнаказанно, такъ какъ сами крестьяне никогда не выдають ихъ; есть не мало и довольно дѣльныхъ и осторожныхъ въ своихъ приѣмахъ при родахъ сельскихъ повитухъ.

Всѣхъ акушерскихъ случаевъ за отчетное время у меня было 170, изъ которыхъ на долю родовъ, гдѣ врачъ былъ приглашаемъ до рожденія младенца, — 106 случ. Въ дальнѣйшемъ подраздѣленіи приняты въ расчетъ всѣ 170 акуш. случаевъ.

Всѣ обращавшіяся къ врачу въ акушерскихъ случаяхъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

По сословіямъ:

Крестьянокъ	81
Мѣщанокъ	71
Дворянокъ	11
Духовн. званія	7
	<hr/>
Итого	170

По вѣроисповѣданіямъ:

Православныхъ	113
Иудейскаго вѣроиспов.	57
	<hr/>
Итого	170

По мѣсту жительства:

Запш. гор. Березны	115
Поселковъ Черниговскаго уѣзда	39
» Городницк. »	10
» Сосницкаго »	5
Другихъ губерній	1
	<hr/>
Итого	170

По числу предшествовавшихъ беременностей:

Первородящихъ	59
Второродящихъ	14
Многорожавшихъ	96
Число предшеств. родовъ неизв.	1
	<hr/>
Итого	170

По годамъ и мѣсяцамъ:

1885-й годъ:	1886 годъ:
Февраль 1	Июль 2
Апрѣль 1	Августъ 4
Декабрь 1	
	<hr/>
Итого 3	Итого 6

1887 годъ:

Январь. 1	Июль. 3
Май. 1	Августъ 4
Июнь. 1	Ноябрь. 1
	<hr/>
	Итого 11

1888 годъ (2 мѣс. врачъ не принималъ):

Апрѣль 1	Сентябрь 4
Июнь. 3	Октябрь 1
Июль. 4	Ноябрь. 7
Августъ 5	Декабрь. 2
	<hr/>
	Итого 27

1889 годъ:

Январь. 4	Июнь. 2
Февраль 3	Июль. 4
Мартъ 3	Сентябрь 3
Апрѣль. 5	Октябрь 3
Май. 1	Ноябрь. 3
	Декабрь 1
	<hr/>
	Итого 32

1890 годъ 1):

Январь	7	Июнь	3
Февраль	1	Октябрь	3
Май	4	Ноябрь	2
		<hr/>	
		Итого	20

1891 годъ 2):

Мартъ	2	Августъ	4
Апрѣль	5	Сентябрь	2
Май	3	Октябрь	4
Июнь	2	Ноябрь	2
Июль	2	Декабрь	4
		<hr/>	
		Итого	30

1892 годъ:

Январь	4	Июль	5
Февраль	2	Августъ	4
Мартъ	3	Сентябрь	1
Апрѣль	2	Октябрь	1
Май	8	Ноябрь	5
Июнь	1	Декабрь	5
		<hr/>	
		Итого	41

а всего за всѣ годы 170 случ.

По участкамъ медицин.:

Въ Горбовскомъ уч.	26
Въ Березинскомъ уч.	144
<hr/>	
Итого	170

1) Въ этомъ году врачъ по болѣзни не принималъ больныхъ 3 мѣсяца.

2) Въ этомъ году врачъ 2 мѣс. не принималъ (былъ въ отпуску).

По количеству плодовъ при родахъ и выкидышахъ:

Одноплод. 5-мѣс. выкид.	1
Одноплодныхъ родовъ	97
Двойни	8
Двойни (при выкидышѣ 5 мѣс.)	1
Тройни	1

Итого . . . 108

По возрасту:

До 20 лѣтъ	11
отъ 20 до 25 л.	45
» 25 » 30 »	38
» 30 » 35 »	32
» 35 » 40 »	19
» 40 » 45 »	19
Число лѣтъ неизв.	6

Итого . . . 170

Дѣтей живыхъ родилось	98
» мертвыхъ »	21
Мацерированныхъ	4
Съ пороками развитія	1
При 5 мѣс. выкидышѣ мацериров. 3 (двойни).	

Итого . . . 127 дѣтей.

Въ данномъ случаѣ вошли въ счетъ и тѣ дѣти, гдѣ врачъ приглашенъ былъ только по поводу задержанія послѣда.

Срочныхъ родовъ было	94	
Преждеврем. родовъ на 7-мъ мѣс.	4	} 12 сл.
» » » 8-мъ »	4	
» » » 9-мъ »	4	

Выкидышей было на 6-й нед.	6	} 26 сл.
» » » 2-й »	2	
» » » 2-мъ мѣс.	6	
» » » 3-мъ »	7	
» » » 4-мъ »	1	
» » » 5-мъ »	2	
Начало 7-го мѣс.	1	
Время неопредѣл.	1	
Всего		132

Положеніе плодовъ.

Лицевыхъ и лобныхъ не наблюдавъ; въ нижеозначенныя числа вошли тѣ случаи, гдѣ врачъ былъ приглашенъ до рожденія младенца.

Головное	91	
Тазовые {	ягодичное	3 (при 5 м.)
	ножное	4 (выкид.)
Поперечное	3	
Косое	8	
Неопредѣленное: при выкид.	1	
» » родахъ	4	
Итого		114

Неправильности во время родовъ.

Неправильности во время родовъ были наблюдаемы:

а) *Со стороны плода:*

Асфиксія дѣтей	10 (всѣ ож.)
Выпаденіе пуповины	5
Краевое предлежаніе послѣда	1
Центральн. предлежаніе послѣда.	2
Приращеніе послѣда	17
Задержаніе послѣда	9
Задержаніе плод. оболочекъ	1

Задержаніе частей яйца (при выкид.) 13
 Обвитіе пуповины: вокругъ шеи
 2 раза въ 2 случ.
 вокругъ шеи 1 разъ въ 4 сл.
 вокругъ ножки 1 разъ въ 1 сл.
 а всего обвитіе пуповины въ 7-ми сл.

Значит. длина пуповины (1 арш. длин.) наблюдалась въ 1 случ., а значительная короткость ея (1^{1/2} четв. арш.)—тоже въ 1 случ.

Брюшная водянка младенца и лѣвосторонняя паховая грыжа наблод. въ одномъ случаѣ.

в) Со стороны матери:

Плоскій тазъ (conjugata ext. 17 с.)	въ 1 сл.
Плоскій тазъ (conjug. ext 18 с.)	» 8 »
Общесъуженный тазъ	» 6 »
Слабыя потуги.	» 33 »
Спазмотич. потуги	» 4 »
Болѣзненные потуги.	» 4 »
Брюш. водянка, киста яичника и уре-	
мич. припадки	» 1 »
Брюшн. водянка и порокъ сердца	» 1 »
Порокъ сердца	» 1 »
Эклампсія въ легкой степени.	» 1 »
Разрывы промежности:	
послѣ операций.	3 (2-й степ.)
послѣ произвольн. родовъ 7 (одинъ 1-й ст.	
а остальные—2-й степени).	

Кровотеченій изъ матки (причина котор. неизвѣстна; смерть роженицы до прибытія врача) въ 1 сл.

Ненормальности послеродоваго періода.

<i>Лихорадило:</i> 1) послѣ операций	2 родил.
2) послѣ произвольн. родовъ	1 »
3) послѣ выкидыша.	2 »

Кровотечений послѣ родовъ было:

- 1) послѣ операций въ 1 сл.
- 2) послѣ правильн. родовъ . . . » 3 »
- 3) послѣ выкидыша » 10 »

Эндометритъ наблюдался:

- 1) Послѣ операций въ 2 сл. (манипуляціи бабокъ до прихода врача).
- 2) Послѣ произвольныхъ родовъ.
 - а) легкая форма въ 2 случ. (роды ведены простой бабкой),
 - б) Кольпитъ гнойный въ 1 сл. (щипцы послѣ манипуляцій бабокъ).
- 3) *Послѣ выкидыша*:
тяжелая форма эндометр. въ 3-хъ сл. (въ двухъ случаяхъ выкидышъ произошелъ въ отсутствіи врача, а въ 1-мъ сл. — мясистый заносъ началъ гангренисцировать и тогда только больная обратилась къ помощи врача).

Акушерскія операции.

Наложение щипцовъ (съ пробными)	32	раза
Поворотъ на ножку и извлечение	5	разъ
Поворотъ на обѣ ножки и извлечение	8	»
Прободение головки плода	6	»
Извлечение за ножку	2	раза
» » ножки	1	разъ
» » ягодицы	1	»
» » плечики	1	»
Отдѣленіе и извлечение приросш. и не приросш. плода изъ матки	24	раза
Ручное удаленіе задержан. въ маткѣ оболочекъ	1	разъ
Выжиманіе послѣда по <i>Credé</i>	33	раза
Выжиманіе послѣда по <i>Kristeller'у</i>	1	разъ
Выскабливаніе острой ложкой при задержаніи частей послѣда послѣ преждеврем. на 7-мъ мѣс. родовъ	1	сл.

Отдѣленіе и удаленіе остатковъ выкидыша (изъ нихъ въ 7 сл. сдѣлано и выскабливаніе)	въ 13 сл.
Постепенное насильственное расширеніе пальцами.	въ 3 сл.
Разрывъ плодныхъ оболочекъ.	5 разъ
Проколъ ножницами оболочекъ	1 разъ
Введеніе кольпейринтера во влагалище для лучшаго раскрытія зѣва при возбужд. преждевр. родовъ	1 разъ
Запизваніе промежности	7 разъ
Промываніе матки дезинфецирующими жидкостями	3 раза ¹⁾
<hr/>	
Всего операций.	149

Болѣе подробное описаніе оперативныхъ случаевъ.

А. Наложеніе щипцовъ.

Въ 1887 году:

1. 20-ти лѣтъ, крестьянка с. Горбова. Срочные 1-е роды. Передній видъ 1-го затылочнаго положенія. Тазъ плоско-сѣуженный (сѣуженіе среднихъ размѣровъ). Потуги слабы и не часты; роды тянутся около 6-ти час.; при вполнѣ раскрытомъ зѣвѣ разорваны плодныя оболочки. Въ продолженіи 4-хъ час. (приблиз.) головка, вколоченная въ выходѣ изъ малаго таза, не подвигается далѣе; потуги къ этому времени еще болѣе ослабѣли и сердцебіеніе плода очень замедлилось. Прямое наложеніе щипцовъ *Busch'a*. Послѣ значительнаго числа тракцій съ большимъ трудомъ извлеченъ младенецъ крупныхъ размѣровъ безъ признаковъ жизни и не могъ быть оживленъ (былъ оживляемъ цѣлый часъ). Выздоровленіе при небольшомъ повышеніи t°.

2. 31 года, крест. с. Горбова. Многороженица. Роды срочные; тазъ плоскосѣуженный; передній видъ 1-го темяннаго положенія. Слабость потугъ; роды затянувшіеся. Прямое наложеніе щипцовъ *Busch'a* на низкостоящую головку, — плодъ извлеченъ живымъ; послѣдъ выжать по *Credé*. Выздоровленіе при нормальной t°.

¹⁾ Сюда вошли случаи промыв. матки при послѣродов. заразныхъ эндометритахъ.

Въ 1888 году:

3. 18-ти лѣтъ, еврейка, г. Березны. Роды 1-е, срочные; положеніе 1-е, затылочное. Тазъ общесъуженъ (умѣренно); слабость потугъ; наложеніе щипцовъ *Busch'a* (прямое). Плодъ извлеченъ живымъ. До прихода врача *манулировала сельская бабка*. Въ послѣродовомъ періодѣ—повышеніе температуры, вслѣдствіе *гнойнаго кольпита*, который скоро излѣчился спринцеваніями влагалища растворомъ сулемы (1 : 2000).

4. Крестьянка, 20 лѣтъ, изъ г. Березны. 1-е срочные роды; положеніе 1-е телянное; атонія матки въ изгоняющемъ періодѣ. Наложеніе щипцовъ *Simpson'a* (прямое). Легко извлечена живая дѣвочка. Выздоровленіе безъ повышенія температуры.

5. Дворянка, г. Березны, 40 лѣтъ. Вторые срочные роды. Тазъ неравно-мѣрно-сѣуженъ; карлица, тазъ рахитической, сѣуженіе умѣренное. 1-е затылочное положеніе. Семь лѣтъ тому назадъ при первыхъ родахъ мальчикъ извлеченъ щипцами кievскимъ акушеромъ. Слабость потугъ, затянувшіеся роды. Прямое наложеніе щипцовъ *Simpson'a*. Извлеченъ живой младенецъ. Отдѣленіе и удаленіе приросшаго послѣда. Однократное промываніе полости матки 3% растворомъ борной кислоты тотчасъ послѣ удаленія послѣда. Послѣродовое состояніе—безъ повышенія температуры.

6. Крестьянка г. Березны, 27 лѣтъ. Многороженица. Преждевременные роды на 9-мъ мѣсяцѣ. 1-е затылочное положеніе. Слабость потугъ; затянувшіеся роды; роженица уже цѣлыя сутки не слышитъ движеній плода; сердцебиеніе плода нормально. Наложеніе (прямое) щипцовъ *Simpson'a*, которыми легко извлеченъ мальчикъ въ легкой асфиксiи и оживленъ (черезъ 5—6 часовъ послѣ рожденія умеръ). Послѣдъ выжать по *Credé*. Выздоровленіе безъ повышенія температуры. Встала съ постели черезъ три дня послѣ родовъ.

7. Крестьянка г. Березны, 28 лѣтъ. Первые срочные роды. 1-е затылочное положеніе; значит. *caput succedaneum*; роды тянутся 2-е сутокъ; воды прошли за $\frac{1}{2}$ сутокъ до прибытія врача; потуги очень слабы. Прямое наложеніе щипцовъ *Simpson'a*, которыми легко извлеченъ живой младенецъ. Отдѣленіе и удаленіе приросшаго послѣда. Однократное, тотчасъ по удаленіи послѣда, промываніе матки борной водой (3%). Разрыва промежности не было. Гладкое послѣродовое выздоровленіе. Встала съ постели (какъ и большинство крестьянокъ въ этомъ случаѣ дѣлаетъ) на третью сутки.

8. Мѣщанка г. Березны, 20 лѣтъ. Роды первые, срочные. Первое телянное положеніе. Слабость потугъ. Прямое наложеніе щипцовъ *Simpson'a* ¹⁾. Послѣродовой періодъ—безъ повышенія температуры. Встала съ постели на 3-й день послѣ родовъ.

¹⁾ Во всѣхъ случаяхъ щипцовъ, гдѣ не упоминается, какія щипцы нужно понимать: щипцы на низко стоящую головку.

Въ 1889 году:

9. Крестьянка г. Березны, 19 лѣтъ. Первые срочные роды; 1-е темное положеніе. Атонія матки. Прямое наложеніе щипцовъ *Simpson'a*. Послѣ довольно легкаго извлеченія живаго младенца и выжиманія послѣда появилось угрожающее кровотеченіе изъ матки, слѣдствіемъ чего былъ обморокъ роженицы и пачезновеніе пульса въ *art. radial*; впрыскиваніемъ *tinct. moschi* подъ кожу, вливаніемъ горячей воды въ матку и растираніемъ дна матки ладонью родильница была приведена въ чувство и кровотеченіе остановлено быстро. Кровотеченіе произошло вслѣдствіе атоніи матки; при извлеченіи же щипцами у меня не было помощника и растирать дна въ это время и послѣ извлеченія не кому было, кромѣ растерявшейся и неопытной матери роженицы. Послѣродовое состояніе—безъ повышенія температуры.

10. Еврейка г. Березны, 34 л. Многороженица. Роды срочные. Первое затылочное положеніе. Тазъ умѣренно-суженъ. Предшествующіе роды прошли безъ хирургической помощи. До беремености страдала выпаденіемъ передней стѣнки влагалища и опущеніемъ матки. Воды прошли за два часа до прихода врача. Губы маточнаго зѣва не вполне сглажены, головка стоитъ высоко и неподвижно; затылокъ уперся въ лонную дугу. Значит. *caput succedaneum*. Прямое наложеніе щипцовъ *Simpson'a* (*высокіе щипцы*); лѣвая ложка введена легко, правая же—съ большимъ трудомъ; послѣ наложенія щипцовъ и нѣсколькихъ тракцій щипцы *соскользнули*; послѣ *отричнаго наложенія щипцовъ* головка была извлечена съ *большимъ трудомъ*. Извлеченъ живой мальчикъ. Послѣдъ выжать по *Credé*. Тогчасъ послѣ выжиманія послѣда матка промыта однократно 1% эмульсіей креолина. Послѣродовое состояніе—безъ повышенія температуры. Черезъ недѣлю послѣ родовъ встала съ постели.

11. Еврейка г. Березны, 22 л. Первые срочные роды. Затылочное положеніе. Слабость и сильная болѣзненность потугъ. Прямое наложеніе щипцовъ *Busch'a*. Легко извлеченъ живой мальчикъ. Послѣдъ выжать. Разрывъ промежности 2-й степени, зашитъ сулемованнымъ шолкомъ; присыпка однократная зашитаго разрыва іодоформомъ и потомъ заживленіе разрыва подъ компрессами изъ креолиновой эмульсии (1%); *prima intentio*. Выздоровленіе безъ повышенія температуры.

12. Жена чиновника. 30 л., въ г. Березнѣ. 2-ые срочные роды. Положеніе затылочное. Очень слабыя потуги въ изгоняющемъ періодѣ. Прямые щипцы *Simpson'a* и легкое извлеченіе живой дѣвочки. Отдѣленіе и удаленіе приросшаго послѣда. Послѣ удаленія послѣда однократное промываніе матки карболовой водой (2%). Гладкое послѣродовое выздоровленіе.

13. Крест. с. Выбель, 40 л. Срочные роды затянувшіеся; атонія матки. *Пробныя прямые щипцы Simpson'a* (*неудачно*), потомъ прободеніе предлежащей головки (см. отдѣлъ прободеній № 1).

14. Крест. г. Березны, 19 л. Первые срочные роды. Темное положеніе. Атонія матки. Головка была вколочена въ маломъ тазу около 3-хъ часовъ, въ одномъ положеніи, пока пріѣхалъ врачъ, за которымъ пришлось

посылать за 12 верстъ (меня не было въ то время въ городъ). Измѣреніе таза не было сдѣлано. Наложеніе (прямое) щипцовъ *Busch'a* и извлеченіе мертвого младенца. Лихородила немного въ послѣродовомъ состояніи. Помогала акушерка.

Въ 1890 году:

15. Жена священ. г. Березны, 25 л. Многороженица. Срочные роды. Первое затылочное положеніе. Слабость потугъ;—затянувшіеся роды. Прямое наложеніе щипцовъ *Simpson'a*, при чемъ извлечена живая дѣвочка. Безлихородочное послѣродовое состояніе.

16. Мѣщ. г. Березны, 19 л. Первые срочные роды. Положеніе темянное. Тазъ умѣренно-суженъ. Потуги очень болѣзненные и слабы; роженица изнемогаетъ отъ боли. Прямое наложеніе щипцовъ *Simpson'a*; младенецъ извлеченъ живымъ. Отдѣленіе и удаленіе приросшаго послѣда. Разрывъ промежности 2-й степени, который сросся безъ швовъ. Матка однократно промыта растворомъ карболовой воды (2⁰/₁₀). Гладкое выздоровленіе; встала съ постели черезъ три дня послѣ родовъ.

17. Дворянка, Сосниц. уѣзда, хут. Ш., 19 л. Первые срочные роды двойнями; затянувшіеся роды; атонія матки. Воды прошли около 6-ти час. тому назадъ передъ моимъ пріѣздомъ.

Прямые пробные щипцы Лазаревича на подлежащую головку (неподвижную) перваго младенца; *два фаза накладывались* (подъ хлороформнымъ наркозомъ) *и два фаза соскальзывали не размыкаясь и не причиняя никакого вреда младенцу и матери.* Роженица сильно истощена и щипцы не дѣйствуютъ, а потому (ex consilio) сдѣлано прободеніе подлежащей головки на живомъ плодѣ (см. отдѣлъ поворотовъ № 9 и отдѣлъ прободеній № 3). Послѣродовое состояніе безъ повышенія температуры.

18. Евр. г. Березны, 40 л. Многороженица. Срочные роды. Первое затылочное положеніе. Слабость потугъ. При вполне раскрытомъ зѣвѣ плодная оболочка прорвана пальцемъ: родовая дѣятельность матки всетаки не усилилась; прямое наложеніе щипцовъ *Simpson'a* и извлеченіе живаго младенца. Послѣродовое состояніе нормально.

19. Крест. г. Березны, 21 г. Первые срочные роды затянувшіеся (около 1 сутокъ). Положеніе затылочное. Головка сильно вколочена въ выходъ изъ малаго таза; потуги сильныя и очень болѣзненные; не смотря на эти потуги головка не подается впередъ и роженица настоятельно просить скорѣе избавить ее отъ мученій. Тазъ не измѣрялся. Прямые щипцы *Simpson'a*; извлечена живая дѣвочка. Послѣдъ выжать. Небольшой (1-ой степ.) разрывъ промежности, который сросся безъ швовъ. Послѣродовое состояніе нормально.

Въ 1891 году:

20. Крест. с. Бѣгача, 22 л. Первые срочные роды. 1-ое темянное положеніе. Тазъ умѣренно-суженъ; слабость потугъ. Затянувшіеся роды.

Плодные оболочки при вполне раскрытом зѣвѣ разорваны пальцами; дѣятельность матки не улучшается. Прямые щипцы *Simpson'a*; наложеніе щипцовъ было трудное и извлеченъ съ трудомъ мертвый младенецъ (до извлечения сердцебіеніе младенца было очень ускорено); пушвина одинъ разъ обвита вокругъ шеи. На тѣлѣ ребенка были пузыри различной величины (до величины горошины) съ водянистымъ содержимымъ. Послѣродовое состояніе нормально.

21. Крест. м. Седнева, 22 л. Первые, нѣсколько недоношенные (2 недѣли) роды. 1-ое темянное положеніе. Роды затянувшіеся (5-ья сутки). Прямое наложеніе щипцовъ *Simpson'a*. Извлеченъ живой младенецъ. Послѣдъ выжать. Разрывъ промежности 2-й степ., который зашитъ 4-мя шелковыми (судемов.) швами (*prima intentio*). Послѣродовое состояніе нормально. Помогала акушерка.

22. Казачка г. Березны, 20 л. Первые срочн. роды. Предлежитъ затылокъ. Тазъ плоско-сѣуженный (умѣренно); потуги очень слабы и болѣзненны; катарръ мочевого пузыря (острый). Зѣвѣ вполне раскрытъ и губы его сглажены; головка вколочена неподвижно въ выходѣ малаго таза; значит. *carut succedaneum*; врачъ приглашенъ къ роженицѣ уже въ то время, какъ опухоль головки была велика. Вслѣдствіе большой опухоли головки нельзя было точно рѣшить, въ какомъ размѣрѣ таза лежитъ головка своимъ наибольшимъ діаметромъ, а потому щипцы *Simpson'a* наложены *прямые*, при чемъ по извлеченіи головки оказалось, что ложки щипцовъ легли въ косомъ размѣрѣ головки; извлеченіе было трудное (10 тракцій) и ребенокъ извлеченъ въ легкой асфиксін и оживленъ; при чемъ оказалось, что одна ложка щипцовъ сдавила нервы и шейные сосуды правой стороны, а другая — оставила вдавленіе въ лобно-темянной части черепа лѣвой стороны; ротъ новорожденного оказался нѣсколько скошеннымъ влѣво и лѣвый глазъ полузакрытымъ. Младенецъ хорошо упитанъ и крупныхъ размѣровъ. Послѣдъ выжать. Небольшой разрывъ промежности, который сросся безъ швовъ. Послѣродовое состояніе нормально. Послѣдствія сдавленія ложекъ на головѣ и шеѣ новорожденного вполне сгладились черезъ 2—3 дня. Помощница акушерка.

23 Евр. г. Березны, 20 л. Первые срочные роды. Первое темянное положеніе. Слабость потугъ. Прямые щипцы *Simpson'a*. Младенецъ извлеченъ живымъ. Послѣдъ выжать. Послѣродовое состояніе нормально.

24. Крест. г. Березны, 19 л. Первые срочные роды. 1-ое затылочное положеніе. При вполне раскрытомъ зѣвѣ плодные оболочки разорваны пальцами. Замедленіе родовой дѣятельности матки въ изгоняющемъ періодѣ. Прямые щипцы *Simpson'a* и плодъ легко извлеченъ живымъ. Послѣдъ выжать. Послѣрод. состояніе нормально. Помощница акушерка.

25. Евр. г. Березны, 17 л. Первые срочн. роды. Тазъ сѣуженъ (умѣрен.). Слабость потугъ въ изгоняющемъ періодѣ. Головка лежитъ въ косомъ размѣрѣ таза (выходъ малаго таза). *Косое наложеніе щипцовъ Simpson'a*. Извлеченъ живой младенецъ. У роженицы въ дѣтствѣ былъ кокситъ и теперь

существ. укороч. лѣвой ниж. конечности. Послѣродовое состояніе правильно. Послѣдъ вышелъ произвольно. Помощница акушерка.

Въ 1892 году:

26. Казачка г. Березны, 33 л. Первые сроч. роды. Измѣренія таза: dist. spin. ant.—23 сант., dist. crist. il.—28 с. и conjug. ext.—18 сант. Первое затылочное полож. Слабость потугъ. Роды тянутся болѣе сутокъ; воды прошли за 4 часа до прибытія врача. *Косое наложеніе щипцовъ* и извлеченіе живой дѣвочки. Пупов. одинъ разъ обвита вокругъ шеи. Небольшой разрывъ промежности не зашить. Послѣродовой періодъ нормаленъ. Помощница акушерка.

27. Крест. г. Березны, 29 л. Восьмые срочн. роды. Затылочное положеніе. Размѣры таза: dist. spin. ant.—22 с., dist. crist.—27 с. и conjugata ext. 18 с. Плоско-сѣужен. тазъ. Воды прошли за 6 час. до прибытія врача; сердцебіеніе плода очень замедлено. Потуги довольно сильныя; выходненіе тесоніи до тракцій и во время тракцій.

Нужно замѣтить, что въ 2-хъ предшествовавшихъ родахъ врачъ оба раза извлекалъ младенцевъ щипцами, при чемъ одинъ младенецъ былъ извлеченъ живымъ съ сильными вдавленіями на черепѣ отъ ложекъ, а другой — мертвымъ; всѣ другія дѣти, родившіяся живыми, вскорѣ умирали. *Пробные прямые щипцы Simpson'a (высокіе)* накладывались 2 раза черезъ $\frac{1}{2}$ -часовой промежутокъ одни отъ другихъ (около 20-ти тракцій за оба раза), при чемъ головка нисколько не подвинулась къ выходу, крестцовая впадина не выполнилась головкой; послѣ неудачныхъ щипцовъ сдѣлано прободеніе головки живаго плода (см. отд. прободеній № 5). Послѣродовое состояніе нормально. Операция безъ хлороформ. наркоза. Матка не промывалась. Помогала акушерка.

28. Крест. г. Березны, 34 л. Многорож. Срочные роды. Затылочное предлежаніе. Слабость потугъ. Плодъ умеръ до прихода врача. Прямые щипцы *Simpson'a* и легкое извлеченіе младенца. Выздоровленіе при норм. темпер. Помогала простая бабка.

29. Еврейка г. Березны, 25 л. Вторые срочные роды. Предлежитъ темя. Атонія матки. Прямые щипцы *Simpson'a* Извлеченъ живой мальчикъ. Отдѣленіе и удаленіе прирощ. послѣда. Помощница простая бабка.

30. Крест. г. Березны, 25 л. (незамужняя). Первые срочные роды. Воды прошли за сутки до пріѣзда врача. Размѣры таза нормальны. Головка вкочлена въ выходъ малаго таза неподвижно; кожа темянной ея части разорвана по направленію стрѣловидн. шва до костей черепа и края раны покрыты грязно-сѣрымъ налетомъ; кости черепа цѣлы; промежность роженицы и задняя стѣнка влагалища, ближе кпереди, разорваны и края раны сѣраго цвѣта; разрывъ промежности 2-й степ.; большія дѣтородныя губы, какъ и всѣ разорванныя части дѣтородн. органовъ, сильно отечны и воспалены; ниже отверстія мочеиспускательнаго канала на передней стѣнкѣ влагалища — небольшая ссадина грязно-сѣраго цвѣта. Мочевой пузырь р-

женицы растянуть мочей до размѣра головы новорожденнаго; не мочилась около сутокъ. Потуги очень слабы и наступаютъ черезъ $\frac{1}{4}$ часа одна послѣ другой. При отдавливаніи головки младенца нѣсколько кзади рукой помощницы (акушерки) черезъ наружные покровы живота съ трудомъ введенъ катетеръ въ мочевой пузырь и выпущено громадное количество мочи; послѣ выпуска мочи потуги *не усилились*. При незначительномъ отдавливаніи головки изъ матки выдѣляется гнойная съ сильнымъ запахомъ сѣроводорода жидкость (послѣдствіи манипуляцій простой бабки, которая до прихода врача скрылась и никто не указалъ ея). Прямое наложеніе щипцовъ *Simpson'a*; легко извлеченъ разлагающійся младенецъ. Сильно разложившійся послѣдъ выжать. Матка промыта однократно 4% растворомъ карболовой кислоты; разрывъ промежности припудривался іодоформомъ и примачивался карболовой водой (3%). *Выздоровленіе съ повышенной температурой* при подмываніи наружныхъ половыхъ органовъ аq. sublimat. (1:1000). Поступить въ больницу не согласилась.

31. Мѣщ.-евр. г. Березны, 35 л. Многорож. Срочные роды. Темянное предлежаніе. Замедленіе родовой дѣятельности въ періодѣ полного раскрытія зѣва; тазъ немного суженъ (conj. ext.=18 с.); воды прошли за 6 час. до прибытія врача. Значит. caput. succedaneum. Прямые щипцы *Simpson'a*. *Трудное извлеченіе туловища младенца послѣ извлеченія головки (слабость потуги)*. Родился мальчикъ въ легкой асфиксіи (оживленъ). Послѣрод. періодъ нормаленъ. Помогала акушерка.

32. Крест. дер. Мышева, 43 л. Срочные 12-е роды. Темянное положеніе. Роды затянувшіеся (4-я сутки). Слабость потугъ. Небольшое кровотеченіе изъ матки за сутки до родовъ и въ день самихъ родовъ. Плодные оболочки прорѣзаны ножницами. Потуги послѣ отхожденія водъ еще болѣе ослабѣли. Тазъ нормальныхъ размѣровъ. Прямое наложеніе щипцовъ *Simpson'a*. *Извлеченіе туловища младенца затруднилось, вследствие отсутствія потуги послѣ извлеченія головки (помощниковъ не было)*. Пуповина 1 разъ была обвита вокругъ шеи младенца. Мальчикъ извлеченъ въ легкой асфиксіи и оживленъ; плодъ очень крупныхъ размѣровъ. Длина пуповины=1 арш. Отдѣленіе и удаленіе приросшаго послѣда. Помогалъ только мужъ роженицы. Выздоровленіе безъ повышенія температуры; послѣродовыя кровянистыя выдѣленія были очень обильны и затянулись около 3-хъ недѣль; кровотеченіе остановлено внутрен. приемами ext. fluid. gossipii herbacei по 25 кап. 3 раза въ сутки. Нужно замѣтить, что роженица за 2 года до родовъ была оперирована (*Schröder*'овская экцизія шейки матки и выскаблив. матки) по поводу хронич. метрита.

При наложеніи щипцовъ чаще всего примѣнялись щипцы *Simpson'a*, другіе рѣже, а именно: щипцы *Лазаревича* наложены 1 разъ, щипцы *Busch'a*—5 разъ и щипцы *Simpson'a*—26 разъ. Я отдаю предпочтеніе, на основаніи своего опыта, щипцамъ *Simpson'a*, такъ какъ при при-

мѣненіи ихъ наблюдаются какъ-будто рѣже и не такія значительныя поврежденія наружныхъ половыхъ органовъ роженицы. Высокіе щипцы наложены 2 раза, пробные—три раза и косые—два раза.

Показаніемъ къ наложенію щипцовъ чаще всего служила слабость потугъ и рѣже—сѣуженіе таза.

По годамъ наложеніе щипцовъ распредѣляется такъ:

Въ 1887 году было наложеній 2 раза	} Горбовск. уч. Черниг. у.
» 1888 » » » 6 разъ	
» 1889 » » » 6 »	} Березинск. участокъ, Черниговск. уѣзда.
» 1890 » » » 5 »	
» 1891 » » » 6 »	
» 1892 » » » 7 »	
<hr style="width: 50%; margin: auto;"/>	
Итого . . 32 раза	

Итакъ, на все число родовъ, бывшихъ подъ моимъ наблюденіемъ (106 сл.), приходится 32 наложенія щипцовъ, т. е. 30,18%,—это, сравнительно съ родильными домами и клиниками ¹⁾, очень большой %,—но, если принять въ расчетъ, что земскаго врача зовутъ только въ особенно запущенныхъ случаяхъ родовъ (въ нормальныхъ родахъ—очень рѣдко) и что это не въ родильномъ домѣ или клиникѣ, а въ частной практикѣ, то этотъ % налож. щипцовъ будетъ понятенъ и не великъ.

За пять лѣтъ въ Березинскомъ участкѣ (Горбовскаго не беру въ расчетъ по незначит. числа случаевъ) я имѣлъ 30 разъ налож. щипцовъ, т. е. среднее въ годъ для Березинск. участка составляетъ шесть налож. щипцовъ на все число родовъ (въ годъ не болѣе 28—30 родовъ у врача).

Въ громадномъ большинствѣ случаевъ послѣ наложеній щипцовъ, какъ и послѣ др. операций и нормальныхъ родовъ, родильницы подмывались простой водой.

В. Поворотъ.

Въ 1886 году:

1. Крест. дер. Слободки, 30 л. Многорожен. Срочные роды, затянувшіеся. 1-ое косое положеніе. Выпаденіе лѣвой ручки существ. около сутокъ;

¹⁾ См. Журналъ Акуш. и Женск. болѣзней за 1893 годъ. февр. кн. «Краткій отчетъ клиники проф. Н. В. Ястребова», составл. В. А. Жирмуновымъ. стр. 141.

ручка сильно отечна, синюшна; наружные половые органы отечны. Плодъ мертвъ. Роженица лихорадитъ. Ручку пришлось ампутировать. Сдѣланъ поворотъ на ножки и извлеченъ разлагающійся плодъ. Послѣдъ выдѣленъ рукой, введенной въ матку. Полость матки однократно промыта 3% борной водой. Послѣдъ и плодные оболочки сильно разложились и издаютъ зловоніе. Родильница черезъ сутки послѣ операциі умерла. Причина смерти не установлена. Тазъ нормальныхъ размѣровъ. Врачъ былъ приглашенъ послѣ выпаденія ручки. Операция—безъ хлороформнаго наркоза; помогала фельдшерица.

Въ 1887 году:

2. Крестьянка, м. Салтык.-Дѣвицы, 35 л. Многороженица. Роды срочные. Размѣры таза: *dist. spin. ant. sup.* 21 с., *dist. cristar.* 24¹/₂, *conjugata ext.* 18¹/₂ с. 2-ая установка косо-головнаго положенія; выпаденіе правой ручки существуетъ около 5 час.; при пріѣздѣ врача плодъ уже былъ мертвъ. Подъ хлороформнымъ наркозомъ сдѣланъ довольно легко поворотъ на ножки и извлеченъ мертвый плодъ. Послѣдъ выжать. Послѣдствіемъ сильнаго и продолжительнаго (ок. 5 час.) давленія подлежащей части на переднюю стѣнку влагалища и маточную губу образовался пузырно-влагалищно-цервикальный свищъ; послѣ выпаденія ручки схватки всетаки были часты и сильны. Врачъ былъ приглашенъ уже по выпаденіи ручки; разстояніе даннаго мѣстечка отъ врача до 20 верстъ. Помогла акушерка, пріѣхавшая тоже съ врачомъ. Послѣродовое состояніе прошло довольно гладко. Свищъ остался и по настоящее время, такъ какъ родильница не согласилась на операцию.

Въ 1888 году:

3. Крест. с. Лукашевки, 30 л. Многорож. Преждевременные на 7-мъ мѣс. роды. Центральное предлежаніе дѣтскаго мѣста; сильно кровоточить болѣе 2-хъ сутокъ. Зѣвъ раскрытъ на 2 попереч. пальца; потуги не часты и не сильны; роженица очень малокровна: при подниманіи головы дѣлается обморочное состояніе. Въ виду сильнаго малокровія и истощенія больной рѣшено было немедленно приступить къ окончанію родовъ поворотомъ. Въ продолженіи ¹/₂ часа зѣвъ легко удалось расширить пальцами руки (въ то время у врача не было ни кольпейринтера, ни другихъ инструментовъ акушерскихъ: врачъ случайно былъ въ томъ селѣ у другого больнаго) и, отдѣливъ сбоку послѣдъ отъ матки, ввести всю руку въ полость матки, захватить ножки младенца и сдѣлать довольно легко и скоро поворотъ на ножки съ извлеченіемъ за ножки же; младенецъ извлеченъ однако мертвымъ. Послѣдъ выдѣленъ рукой изъ матки. Родильница черезъ ¹/₂ сутокъ всетаки умерла отъ остраго малокровія. Помощниковъ не было. Операция—безъ хлороформнаго наркоза. Разстояніе села Лукашевки отъ мѣста жительства врача 18 верстъ.

4. Казачка с. Локнистаго, 37 л. Многорож. Срочные затянувшіеся (4-мя сутки) роды; косое положеніе плода и выпаденіе правой ручки; ручка

отечна и синюшна. Выпаденіе существуетъ около $\frac{1}{2}$ сутокъ. Плодь мертвъ. Тазъ нормальн. размѣровъ. Врачъ не могъ скоро прѣхать для помощи, такъ какъ въ то время ему пришлось ассистировать у товарища сосѣднаго участка при большой операциі и потому посланный долженъ былъ сдѣлать 2 конца болѣе нежели въ 25—30 верстъ прежде, чѣмъ найти врача.

Послѣ подкрѣпленія лихорадившей и сильно истощенной роженицы мускусомъ и водкой сдѣланъ поворотъ на ножки (не трудный) и извлеченъ мертвый и разлагающійся плодь; операциа безъ хлороформа; помогаль врачу фельдшеръ. Отдѣленіе и удаленіе приросшаго послѣда. Почти черезъ $\frac{1}{2}$ часа послѣ отдѣленія послѣда роженица умерла отъ острога малокровія при полномъ упадкѣ силъ. Врачъ приглашенъ только черезъ $\frac{1}{2}$ сутокъ послѣ выпаденія ручки. Данное село отстоитъ отъ мѣста жительства врача на 7 верстъ.

5. Крестьянка д. Рогозокъ (Городницкаго уѣзда), 40 лѣтъ. Многороженница (9-ые роды). Тазъ нормальныхъ размѣровъ. Затянувшіеся (2-ое сутокъ) срочные роды; *воды прошли за сутки до прибытія врача. Второе поперечное положеніе.* Тотчасъ по отхожденіи водъ (заявленіе бабки простой) во входѣ во влагалище показались обѣ ножки и ручка. При изслѣдованіи мной роженицы оказалось: лѣвая ножка слѣва и книзу (къ промежности), а правая—кверху, за лобкомъ; лѣвая ручка—справа и ниже (къ промежности) между ножками и ручкой—нѣсколько кверху—прощупывается головка; такимъ образомъ—плодь скрученъ (клубкомъ), обращенъ спинкой назадъ, а ручками съ головкой (больше въ правой стор. таза) и согнутыми ножками впередъ, къ выходу изъ половой щели. Потугъ нѣтъ. По наложеніи акушеркою петли на лѣвую ножку съ большимъ трудомъ низведена и выведена изъ-за лобка наружу правая ножка, послѣ чего—поворотъ (не трудный) на ножки и извлеченіе въ глубокой асфиксін (потомъ оживленнаго) младенца. Послѣдъ удаленъ рукой, введенной въ матку. *Пуповина была въ начальной степени фазложенія.* Предлежащія части младенца были сильно отечны. Матка промыта 3% растворомъ борной кислоты. Скорое выздоровленіе. Помогала и вела дальнѣйшій хлороформ. наркозъ во время производства операциа простая сельская бабка:—другихъ помощниковъ у меня не было, а медлить нельзя было. Отъ врача—деревня въ 12 верст.

Въ 1889 году:

6. Крестьянка г. Березны 32 л. Многороженница. Срочные роды. *Косое положеніе;* ручка выпала 3 часа тому назадъ; врачъ приглашенъ послѣ выпаденія ручки; ручка отечна, синюшна, наружные половые органы тоже отечны. Сердцебиенія плода не слышно. Тазъ нормальныхъ размѣровъ. Сдѣланъ *поворотъ на ножку и извлеченъ за ножку* мертвый плодь. Послѣ-родовое состояніе нормально.

Въ 1890 году:

7. Крестьянка д. Рогозокъ (Городницкаго уѣзда), 21 г. Первые срочные роды. *Косое положеніе* и выпаденіе правой ручки съ пуповиной; пуповина

(врачъ приглашенъ послѣ выпаденія ручки) не пульсируетъ. Сердцебиеніе плода не слышно. Воды прошли за полъ сутокъ до совершенія операціи. Подъ хлороформнымъ наркозомъ сдѣланъ трудный (сухой) поворотъ на обѣ ножки и извлеченъ мертвый доношенный плодъ. Послѣдъ отдѣлился произвольно; матка промыта борной водой. Помощницей была простая сельская бабка. Послѣродовое состояніе нормально.

8. Крестьянка с. Локнистаго (Черниговскаго уѣзда). 40 л. отъ роду. Многороженица. Предшествовавшіе роды проходили нормально. *1-е поперечное положеніе*. Ручка, ножки и головка находились почти вмѣстѣ (скручиваніе плода) и плотно обхватывались маткой. Воды прошли за 15 час. до прибытія врача. Не смотря на хлороформированіе матка продолжала *судорожно* сокращаться и первыя попытки сдѣлать поворотъ на ножки не увѣнчались успѣхомъ; только *послѣ уменьшенія объема головки перфорацией*, уже тогда мертвого, плода, *съ трудомъ* удалось сдѣлать поворотъ на ножку извлечь вполнѣ доношеннаго и крупнаго младенца. Послѣдъ выжать. Операція прободенія и поворота длилась около 1½ часа, вторая часть операціи произведена безъ хлороформ. наркоза, такъ какъ роженица была очень слаба и не было надежнаго помощника; помогаль мужъ роженицы. *Судорожныя сокращенія матки продолжались все время операціи*. Роды тянулись 34 часа. Матка однократно промыта борной водой. *Выздоровленіе при нормальной температурѣ*.

9. Роды двойнями (см. отдѣлъ наложенія щипцовъ № 17). Тазъ нормальный. Въ виду истощенія роженицы для скорѣйшаго окончанія родовъ сдѣланъ поворотъ на обѣ ножки 2-го плода и извлеченіе за ножки въ асфиксіи (скоро оживленъ) доношеннаго довольно крупнаго для двоенъ младенца. Отдѣленіе и удаленіе, общаго для обоихъ плодовъ, приросшаго послѣда; decidua reflexa отдѣльна для каждаго плода. Пуповина одинъ разъ обвита вокругъ ножки. Матка промыта 2% карболовой водой. Выздоровленіе.

Въ 1891 году:

10. Еврейка м. Мѣны (Сосницкаго уѣзда), 42 лѣтъ. Многороженица. Беременность на 8-мъ мѣс. Тазъ нормальныхъ размѣровъ. Водянка брюшной полости и (какъ потомъ оказалось) киста яичника; отеки ногъ; легкіе припадки эклампсін и уреміи; моча плохо выдѣляется (очень небольшое количество) бѣлокъ въ мочѣ кипяченіемъ и азотной кислотой не найденъ. Беременная уже двѣ недѣли не можетъ встать съ постели, вслѣдствіе слабости и припадковъ тошноты при вставаніи. Ея consilio рѣшено произвести *искусственныя преждевременныя роды*. Такъ какъ зѣвъ уже былъ раскрытъ на 1½ поперечныхъ пальца, рѣшено ввести во влагалище кольпепринтеръ на 2—3 часа для возбужденія потугъ и лучшаго раскрытія зѣва; послѣ трехъ-часоваго выжиданія, когда кольпепринтеръ былъ вытолкнутъ сокращеніями матки, пристушено было къ внутреннему изслѣдованію роженицы, при чемъ зѣвъ оказался раскрытымъ на 3 поперечныхъ пальца; тогда зѣвъ былъ расши-

рень пальцами на столько, чтобы можно было провести всю руку въ матку; сдѣланъ *поворотъ на ножку* и извлечень живой младенецъ въ асфиксiи (оживленъ); поворотъ былъ сдѣланъ д-ромъ Г. А. Наркевичемъ, а освобожденіе послѣдующей головки, которая было ущемилась въ маточномъ зѣвѣ, сдѣлано мной. Отдѣленіе и удаленіе приросшаго послѣда. Выздоровленіе— безъ осложненій.

Въ данномъ случаѣ, при другихъ условіяхъ медицинской дѣятельности или если бы это было въ мѣстѣ жительства врача-акушера, пожалуй можно бы было дольше выжидать съ окончаніемъ родовъ.

Въ 1892 году:

11. Крестьянка м. Салт.-Дѣвицы, 23 лѣтъ. Первые срочные роды. Плоскій тазъ (умѣрен. суженіе); *первое поперечное положеніе* плода; предлежитъ правое плечико, выпаденіе правой ручки (произошло уже при мнѣ) и пуповины (тоже-при мнѣ); воды прошли за 14 часовъ до прибытія врача; потуги очень слабы (5—6 час. тому назадъ онѣ были сильны, какъ заявила простая бабка); сердцебиенія плода не слышно и пуповина не пульсируетъ. Сдѣланъ *поворотъ на ножку и извлеченіе за ножку* мертваго младенца при почти судорожномъ сокращеніи матки и безъ хлороформ. наркоза; не пришлось хлороформировать, потому что мой хлороформъ въ дорогѣ (20 верстн. разстояніе) печаянно разлился, а у случайно бывшаго товарища въ томъ мѣстечкѣ хлороформа тоже не оказалось, ждать еще нѣсколько часовъ было очень рисковано. Помогаль мнѣ земскій врачъ Г. К. Галинъ. Поворотъ былъ очень трудный. Послѣдъ выжать. Матка промыта 3% карболовой водой. Выздоровленіе безъ повышенія температуры.

12. Еврейка г. Везены 30 л.; многороженица. Преждевременные на 7-мъ мѣсяцѣ роды. Тазъ нормальный. Кровотеченіе изъ матки въ продолженіи 2 $\frac{1}{2}$ нед.; приглашенный врачъ нашелъ слѣдующее: *выпаденіе пуповины, красное (неполное) лѣвостороннее предлежаніе послѣда; предлежитъ головка (подвижная); острая анемія роженицы; влагалнице переполнено стутками крви; зѣвъ раскрытъ на 4—5 поперечныхъ пальцевъ. Пульсъ роженицы еле ощущимъ, 140 въ минуту, мало наполненія.* Предъидущая беременность прервалась тоже на 7-мъ мѣс. съ предварительнымъ обильнымъ кровотеченіемъ предъ наступленіемъ родовъ и тогда родился мертвый младенецъ безъ вмѣшательства врача.

Послѣ подкрѣпленія роженицы подкожнымъ впрыскиваніемъ эфира и мускуса сдѣланъ *поворотъ на ножку и извлеченіе* мертвой, нѣсколько мацерированной дѣвочки; до захватыванія ножки послѣдъ былъ отдѣленъ отъ маточнаго зѣва пальцами, продвинутыми между послѣдомъ и маточной стѣнкой. Послѣ извлеченія послѣдъ тотчасъ выжать. Родильница уложена въ сухую постель и согрѣта горячими бутылками; голова ея уложена ниже таза; внутрь дано вино и Гофманскія калли. Матка промыта горячей карболовой водой (2%). Выздоровленіе безъ повышенія температуры. На 6-ья сутки послѣ родовъ встала съ постели. Нужно замѣтить, что обстановка квартиры

роженницы (очень бѣдной особы) была въ смыслѣ чистоты и температуры воздуха невозможная; холодъ въ квартирѣ ужасный, а постель, гдѣ пришлось оперировать, состояла изъ грязныхъ лохмотьевъ и почти вся была мокрая! Помогала акушерка.

13. Крест. г. Березны, 26 л. Многороженница. Срочные затянувшіяся (1 сутки) роды. Размѣры таза: dist. spin. ant. sup.=21 с., dist. cristar.=24 с. и conjugata ext.=17 с. Воды прошли за 5—6 часовъ до прихода врача, а за 2 час. до прихода врача и схватки соверш. прекратились, а существовали боли по всему животу. Головка баллотируетъ во входѣ въ малый тазъ, сердцебіенія плода не слышно; мелкія части плода хорошо прощупываются черезъ брюшныя стѣнки вверху. Жалуется на тошноту и боли по всему животу. Безъ хлороформнаго наркоза сдѣлать *поворотъ на обѣ ножки и извлечение за ножки*, при чемъ *послѣдующую головку* пришлось освободить послѣ ея перфорациі (см. отдѣлъ перфораций № 6), такъ какъ она застряла между promontorium и лобковой дугой въ поперечномъ размѣрѣ (затылокъ вправо, подбородокъ и личико влѣво) и никакими приемами извлечь ее не удалось безъ уменьшенія ея размѣровъ. Извлеченный младенецъ былъ крупныхъ размѣровъ, особенно его головка. Послѣдъ выжать и матка промыта горячей карболовой (2%) водой.

Послѣ окончанія родовъ состояніе роженицы не улучшилось: въ 1-ые же сутки больная жаловалась на частую тошноту, иногда рвоту и боли по всему животу; животъ напряженъ и нѣсколько вздутъ; на 2-ые сутки: тошнота и рвота продолжаютъ, вздутіе и боли живота—тоже; при бимануальномъ изслѣдованіи половыхъ органовъ дно матки не удалось прощупать, вслѣдствіе сильнаго напряженія брюшныхъ стѣнокъ; кровь изъ матки выдѣляется въ ничтожномъ количествѣ; по временамъ схваткообразныя боли въ поясницѣ; темпер. веч. около 38°. Дано слабительное; на 3-й день: стула послѣ слабительнаго не было, вздутіе живота значительнѣе, но жидкости въ животѣ и какой-либо опухоли опредѣлить не удастся. Рвота не прекращается; вечер. температура повышена до 37,8.^а

Черезъ три дня послѣ родовъ умерла вѣроятно отъ перитонита, начавшагося еще до окончанія родовъ. Помощницей мнѣ была акушерка, хотя въ началѣ родовъ была простая бабка.

Итакъ, поворотъ былъ примененъ въ мой практикѣ въ 12,26% всего числа родовъ; опять процентъ большой по сравненію съ клиниками и родильными домами по тѣмъ же самымъ причинамъ, что и въ другихъ случаяхъ операцій въ земской не больничной практикѣ.

За 7 лѣтъ встрѣтилась необходимость въ 13 случаяхъ поворота, слѣдов. среднее въ годъ число поворотовъ составляетъ 1,8 разъ.

С. Перфорация.

Перфорировать приходилось перфораторомъ *Nägele*

(большою частію), а извлекать перфорированную головку — чаще всего тупымъ акушерскимъ крючкомъ, который вводился въ полость черепа; рѣже для послѣдней цѣли употреблялись акушерскіе костные щипцы, такъ какъ другихъ подходящихъ инструментовъ для этой цѣли въ земскомъ акушерскомъ наборѣ не было (костные щипцы очень недавно приобрѣтены).

Въ 1889 году:

1. Многороженица, жит. с. Выбель, 40 л. Въ 25 верстахъ отъ мѣста моего жительства. Роды срочные, тянутся трое сутокъ (см. отдѣлъ налож. щипцовъ № 13). Головка вколочена въ выходѣ изъ малаго таза и въ одномъ положеніи стоять уже 5—6 час. При роженицѣ находится цѣлыя сутки акушерка-фельдшерца; такъ какъ въ то время участковаго врача не было совсѣмъ, то было послано за мной. Роженица сильно истощена. Послѣ неудачныхъ пробныхъ щипцовъ (головка значительно припухла и наружи полов. органы очень отечны) *сдѣлано прободеніе подлежащей головки на мертвомъ плодѣ* и потягиваніемъ тупымъ акушерск. крючкомъ, введеннымъ въ полость черепа, извлечена уменьшенная головка, а потомъ — и весь плодъ, начавшій уже разлагаться. Отдѣленіе и удаленіе приросшаго дѣтскаго мѣста. Матка промыта борной водой (3%). Скорое выздоровленіе.

Въ 1890 году:

2. Многороженица, крестьянка с. Локнистаго, 40 л. (см. отдѣлъ поворота № 8); *сдѣлано прободеніе лежащей боку головки мертваго плода* для облегченія весьма труднаго поворота.

3. Послѣ неудачныхъ попытокъ извлечь подлежащую головку щипцами (пробные), которые 2 раза соскальзывали, при значительномъ истощеніи роженицы (см. въ отдѣлѣ щипцовъ № 17), *сдѣлано прободеніе подлежащей головки на живомъ плодѣ* (перфораторомъ *Blot*) и извлеченіе головки костными щипцами.

Въ 1892 году:

4. Крест. г. Березны, 30 л. Многороженица. Срочные роды двойнями. Первый младенецъ родился (шелъ ножками) безъ оперативнаго вмѣшательства въ присутствіи только акушерки; вскорѣ послѣ рожденія 1-го младенца и произвольнаго отхожденія водъ 2-го младенца показались вблизи половой щели обѣ ножки, ручка и головка этого послѣдняго младенца, и тогда-то акушерка послала за мной; при мнѣ потуги были сильны, но головка не подвинулась впередъ въ продолженіи цѣлаго часа; попытки, захвативъ ножки, сдѣлать поворотъ и извлеченіе не удалось; щипцы наложить тоже нельзя было, такъ какъ ложки щипцовъ не продвигались между головкой и выпавшими частями, вправить выпавшія части нельзя было, такъ какъ головка сильно вколочена

въ тазу; только уменьшеніемъ объема *головки живаго плода* при помощи *перфорации* удалось извлечь ее тупымъ крючкомъ. Былъ употребленъ перфораторъ Негеле. Отдѣленіе и удаленіе приросшаго послѣда (общаго для обоихъ плодовъ); плодныя оболочки—общія для обоихъ плодовъ, но съ перегородкой. Операция—безъ хлороформнаго наркоза. Матка промыта карболовой водой (2%). Выздоровленіе гладкое.

5. Послѣ двукратнаго наложенія высокихъ пробныхъ щипцовъ и невозможности извлечь подлежащей головки безъ уменьшенія размѣровъ ея (см. отдѣлъ налож. щипцовъ № 27) сдѣлано *прободеніе головки, при узкомъ тазѣ, на живомъ плодѣ извлеченіе ея тупымъ крючкомъ*. Младенецъ былъ крупныхъ размѣровъ, особенно его головка. Операция—безъ хлороформа.

6. Послѣ неудачныхъ попытокъ извлечь послѣдующую головку при поворотѣ на ножки и извлеченіи младенца (см. отдѣлъ поворота № 13) *сдѣлана перфорация послѣдующей головки при значительномъ суженіи таза на мертвомъ плодѣ*. Перфорация произведена черезъ затылочную дыру послѣ надрѣза ножницами мягкихъ частей шеи справа и вывиха шейныхъ позвонковъ; перфораторъ былъ веденъ по позвонкамъ подъ мягкими частями шеи черезъ рану въ этихъ частяхъ. Перфорация была довольно затруднительна: перфораторъ пришлось вводить нѣсколько разъ въ полость черепа и содержимое черепа вымыть водой изъ ирригатора.

Итакъ, число прободеній относительно всего числа родовъ (106) составляетъ 5,6%.

Д. Извлеченіе за ножки было сдѣлано всего *три раза* (въ томъ числѣ 2 раза—за одну ножку), изъ которыхъ извлеченіе *за одну ножку одинъ разъ* было сдѣлано *при ягодичномъ предлежаніи* (№ 18 акуш. табл.) у первороженицы и *одинъ разъ—при предлежаніи ножекъ* (см. № 65 акуш. табл.) при умѣренно суженномъ тазѣ съ выпаденіемъ пуповины (плодъ мертвъ) и трудномъ извлеченіи послѣд. головки по Пражскому способу у второроженицы; извлеченіе же *за обѣ ножки* было сдѣлано при двойняхъ второй дѣвочки у второроженицы при предлежаніи ножекъ (см. № 135 акуш. табл.), дѣвочка извлечена въ асфиксіи и оживлена.

Е. Извлеченіе за ягодицы было произведено одинъ разъ: при двойняхъ у многороженицы извлеченіе 2-го плода при ягодичномъ предлежаніи (см. № 14 акуш. табл.).

Ф. Извлеченіе за плечики (какъ таковое специально) пришлось сдѣлать *одинъ разъ* у многороженицы (см. № 158 акуш. табл.) послѣ полнаго рожденія головки, плечиковъ и ручекъ естественнымъ образомъ. Причина тому заключалась въ уродствѣ развитія младенца.

Тазъ нормальныхъ размѣровъ. Родившаяся головка съ плечиками и ручками оставалась въ такомъ положеніи до прибытія врача (около 2^{1/2} час.), и не смотря на очень хорошія схватки, туловище не подвигалось ни на іоту впередъ. До приглашенія врача манипулировала сельская простая бабка. Мочевой пузырь роженицы переполненъ мочей и выпустить мочу не удалось до извлеченія младенца (мочевой каналъ прижать брюшкомъ младенца). Ко всему этому—роженница страдаетъ сильной нейральной п. ischiadici (односторонняя, острая). Попытки извлечь младенца за плечики безъ хлороформа не удалось и только подъ хлороформнымъ наркозомъ съ больш. трудомъ удалось извлечь младенца, при чемъ произошолъ разрывъ промежности 3-й степени (не зашитъ). Уродство развитія младенца состояло въ слѣдующемъ: брюхо младенца вздуто и напряжено, флюктуируетъ, какъ при брюшной водянкѣ; наибольшая окружность живота черезъ пупокъ равна 37^{1/2} сантим.; существуетъ лѣвосторонняя паховая грыжа, величиной съ куриной яйцо; отъ пупка книзу идутъ подкожныя вены извилисто и онѣ очень расширены. Головка меньше среднихъ размѣровъ. Плодъ на столько былъ ущемленъ въ нижнемъ отдѣлѣ таза, что продвинуть пальца между стѣнкой влагалища и частями плода для точнаго опредѣленія причины задержки родового акта нельзя было, ия только à priori предположилъ, что въ данномъ случаѣ вѣроятно существуетъ водянка брюшная и тѣмъ вызывается прешитствіе для окончанія родовъ. Вскрытія младенца родители не позволили сдѣлать. Послѣ родовъ развитыя легкій эндометритъ. Выздоровленіе съ повышенной температурой.

Г. Отдѣленіе и удаленіе послѣда произведено въ 24-хъ случаяхъ, изъ которыхъ приращеніе наблюдалось (считая и 2 предлежанія его) въ 19-ти случаяхъ.

Удаленіе приросшаго послѣда произведено: у много-роженницъ въ 11 случ., у второроженницъ въ трехъ случ. и у первороженницъ въ 5 случ.

У многороженицъ отдѣленіе приросшаго послѣда: послѣ щипцовъ въ 2 случ., послѣ норм. родовъ—въ 4 случ. (1 случ. задержанія въ продолженіи 7 час.), послѣ поворота на ножки—въ 2 случ. (въ 1 случ. искусств. преждевр. роды), послѣ прободенія 2-го плода при двойняхъ—въ 1 случ., послѣ поворота на ножки при краевомъ (1 сл.) и центральномъ предлежаніи послѣда (1 сл.)—въ 2 случ.

У второродящихъ отдѣл. приросш. послѣда: послѣ щипцовъ—въ 2-хъ случ., при двойняхъ послѣ извлеченія за ножку при ногоположеніи—въ 1 случаѣ.

У первородящихъ отдѣл. приросш. послѣда: послѣ щипцовъ—въ 2 случ., послѣ правильныхъ родовъ—въ 1 случ., при правильн. родахъ послѣ неудач. попытокъ

выжиманія по *Credé* — въ 1 случ., послѣ прободенія и поворота на ножки при двойняхъ—1 случ.

При задержаніи послѣда (не приросшаго) сдѣлано выдѣленіе послѣда рукой, введенной въ матку, въ 5 случ., изъ которыхъ въ одномъ случаѣ не пришлось удалить; этотъ послѣдній случай задержанія послѣда считаю не лишнимъ нѣкотораго интереса, а потому привожу его въ болѣе подробномъ описаніи:

Мѣщанка г. Березны, 30 л. Преждевременные роды (начало 8 мѣс.). Значительное суженіе таза (см. № 48 въ акуш. табл.). Предшествовавшіе роды были 4 года тому назадъ (по заявленію больной) тоже преждевременные (начало 8 мѣс.) мертвымъ плодомъ и также дѣтское мѣсто не удалено врачомъ по нежеланію больной (больная тогда долго болѣла послѣ родовъ). Теперь младенецъ родился безъ врача мертвымъ. Мѣсто задержано уже 20 часовъ и пуповина оторвана бабкой, при попыткѣ ея удалить послѣдъ потягиваніемъ за пуповину. Хлороформировать родильницу я не рѣшился (помощникъ былъ фельдшеръ), такъ какъ у родильницы былъ капиллярный бронхитъ и неправильная дѣятельность сердца. Наружные половые органы и влагалище плохо подготовлены для родовъ. Маточный зѣвъ сильно сокращенъ; введеніе части руки во влагалище сильно болѣзненно и большая часть боли ни одной минуты не лежитъ спокойно на кровати; только концы 2 пальцевъ съ трудомъ проходили черезъ зѣвъ въ матку, но такъ сильно ущемлялись въ немъ, что дѣйствовать ими не было никакой возможности; поэтому удалить рукой или пальцами послѣда не удалось, а на инструментальное удаленіе родильница не согласилась. Пришлось вести выжидательное лѣченіе. Назначено было внутрь *secale cornutum* и *natr. salicylicum*— послѣднее для пониженія температуры; кромѣ того: влагалищный душъ изъ очень теплой воды съ карболовой кислотой (3%) ежедневно, утромъ и вечеромъ, по 10 минутъ. Черезъ 2 недѣли послѣ родовъ начали выдѣляться куски плода съ сильнымъ зловоніемъ и съ примѣсью гнойныхъ лохий; въ продолженіи 2-хъ недѣль послѣ родовъ температура повышена, больная потѣетъ, сильный упадокъ силъ и явленія перитонита; по отхожденіи частей послѣда (въ продолженіи 2-хъ—3-хъ дней) родильница стала поправляться (на промываніе матки тоже не согласилась) и черезъ 1½ мѣсяца послѣ родовъ оправилась довольно хорошо. Теперь вполне здорова; съ тѣхъ поръ не была беременна. Таковы замѣчательная выносливость организма, покорность судьбѣ и боязнь какой-бы то ни было операціи у нашего простолюдина!

Въ остальныхъ четырехъ случаяхъ при задержаніи послѣда выдѣленіе его рукой сдѣлано по слѣд. причинамъ: послѣ срочныхъ родовъ при задерж. послѣда въ продолж. 7-ми час.—въ 1 случ., послѣ поворота разлагающагося

младенца при запущен. косомъ положеніи у многороже-
ницы—въ 1 случ., тотчасъ послѣ поворота на ножки для
скорѣйшаго окончанія родовъ—въ 1 случ., при атоніи
матки послѣ 12-ти часов. задержанія—въ 1 случ. Врачъ
былъ приглашенъ только для удаленія послѣда въ 10
случаяхъ. Лихорадили послѣ удаленія послѣда въ 2-хъ
случаяхъ.

Н. Выкидыши.

До 1888 года болѣе или менѣе точныхъ записей о
выкидышахъ у меня не имѣется, поэтому ихъ и нѣтъ въ
таблицахъ.

Удаленіе пальцемъ при задержаніи частей или цѣлаго
яйца пришлось сдѣлать въ 6-ти случаяхъ, а именно: въ
4 случ. мясистаго заноса (одинъ—на 2-мъ мѣс., два—на
3-мъ и одинъ—на 4-мъ мѣс.); при чемъ въ 1 случаѣ за-
держаніе яйца пальцемъ не удалось выдѣлать его, а на
инструментальное удаленіе больная не согласилась (яйцо
вышло черезъ 2 недѣли по частямъ при повышен. темпе-
ратурѣ). Послѣ удаленія частей выкидыша пальцемъ t°
ни разу не была повышена, даже при гангреницирующ-
емъ заносѣ.

Удаленіе пальцемъ и выскабливаніемъ пришлось сдѣлать
въ 4 случ., а именно: въ 1 случ. при 3-хъ мѣс. мясист.
заносѣ и въ 3-хъ случ. задержекъ яйца и частей его
(1 разъ при 3-хъ мѣс. беременности, разъ—при 2-хъ
мѣс. и разъ—при 6-ти недѣльной беременности).

Удаленіе только выскабливаніемъ частей или цѣлаго
яйца произведено въ 3-хъ сл. (разъ при беременности на
3-мъ мѣс., разъ—при 2-хъ нед. беременн. и разъ при
срокѣ беременн. точно не опредѣленномъ).

Выскабливанія, за исключеніемъ одного случая, всѣ
произведены въ больничкѣ; тотчасъ послѣ выскабливанія
производится впрыскиваніе tinct. jodi и тампонація матки
іодоформной марлей; тампонъ въ маткѣ большею частію ос-
тавался на 2 сутокъ (если за это время t° не повыша-
лась), а на 3—4-ыя сутки иногда еще разъ вспрыскив.
tinct. jodi въ матку; по удаленіи іодоформной марли изъ
матки дѣлаются ежедневные влагалищные души изъ aq.
sublimat. (1:2000). Обыкновенно, если температура до

операции была повышена, то она послѣ операции падала— до нормы—къ вечеру того же дня и кровотеченіе прекращалось тотчасъ же; въ больничкѣ оперированныя оставались иногда около 7-ми дней, а чаще 3—4 дня.

Прежде, чѣмъ приступить къ выскабливанію матки при кровотеченияхъ послѣ выкидыша, я пробовалъ мирное лѣченіе, которое состояло въ назначеніи внутрь приѣмовъ большею частію *extr. fluidi gossipii herbacei* или *hydrastis canadensis*, рѣже—*ergotin. dyalisisati Wernichi*, а также, при сильномъ кровотеченіи, ледъ на животъ; въ очень многихъ случаяхъ это мирное лѣченіе достигало цѣли; вообще на основаніи своего опыта, а также отзыва другихъ товарищей могу сказать, что при кровотеченияхъ послѣ выкидыша, а также и при др. кровотеченияхъ самое лучшее кровоостанавливающее—*extr. fluidi gossipii herbacei* по 25—30 капель 3—4 раза въ день.

На основаніи же своихъ, хотя и не многихъ случаевъ оперативнаго лѣченія выкидыша (задержки цѣлаго или части яйца), я вынесъ убѣжденіе, что самое лучшее и надежное лѣченіе не окончившагося выкидыша (задержки части или цѣлаго яйца разлагающагося, сильныя кровотечения и т. п.) есть *выскабливаніе острой ложкой: оно вѣрно и быстро ведетъ къ цѣли (пониж. t°, останавл. кровотеченіе) значительно меньше болѣзненно и гораздо легче выполнимо для врача, нежели удаленіе пальцемъ* (я всегда дѣлалъ безъ хлороформа).

Здѣсь же считаю умѣстнымъ болѣе подробно описать одинъ случай пузырярнаго заноса (см. № 39 акуш. табл.)

7-го ноября 1888 года ко мнѣ въ амбулаторію обратилась крестьянка г. Березны, 30 лѣтъ, многоженица, съ жалобами на почти постоянныя кровотечения изъ половыхъ органовъ; начиная съ среднихъ чиселъ апрѣля мѣсяца 1888 года у нея идутъ крови, не имѣя періодическаго характера; дни два или три нѣтъ кровотеченія, а потомъ цѣлую недѣлю идутъ крови, то сильнѣе, то слабѣе; не рѣдко—кусками кровь; продолжительныхъ промежутковъ отъ кровотеченій совершенно не было; больная очень малокровна и истощена; послѣдній ребенокъ у нея былъ 2 г. и 10 мѣсяцевъ тому назадъ; послѣ послѣднихъ родовъ года черезъ 1½ одинъ разъ были правильныя (въ срокъ и по количеству крови) *meneses*. На мое предложеніе осмотрѣть ее тогда же гинекологически больная не согласилась и общала придти черезъ нѣсколько дней для осмотра. Такимъ образомъ до выкидыша осмотръ половыхъ органовъ больной не могъ быть произведенъ. 9-го ноября, того же

1888 года, днемъ, мужъ этой крестьянки спѣшно является ко мнѣ въ амбулаторію и заявляетъ, что его жена истекаетъ кровью и изъ половыхъ органовъ ея выходятъ большіе кровяные куски (*печинге*, какъ онъ выразился). Придя сейчасъ же къ больной, я приступилъ къ бимануальному изслѣдованію половыхъ органовъ ея и нашелъ: маточный зѣвъ расширенъ и пропускаетъ три поперечныхъ пальца руки, матка значительно сокращена и дно ея стоитъ пальца на три поперечныхъ выше лобка, выдѣленіе крови изъ матки не велико; существуютъ періодическія потугообразныя боли въ поясницѣ. Мать больной показала мнѣ большое тѣло, вышедшее изъ матки за часъ до моего прихода и не вполне разорванное на три неравныя части, сложивъ которыя получилось тѣло довольно правильной формы; величина тѣла (заноса, какъ оказалось) равнялась приблизительно 3-мъ кулакамъ взрослога человѣка, форма продолговатоовальная (напоминающая увеличенную матку); на одномъ концѣ болѣе заостренное; наружная поверхность тѣла довольно гладкая, напоминающая плодную оболочку; эта оболочка представляетъ собой какъ-бы пузырь, внутренность котораго выполнена пузырями различной величины (отъ горошины до крупной сливы), наполненными слизистой жидкостью, прозрачной и желтоватаго цвѣта; въ болѣе широкой части тѣла и сбоку замѣтны остатки дѣтскаго мѣста; пуповины не видно было и остатковъ зародыша не найдено; размѣры этого вышедшаго изъ матки тѣла слѣдующіе: длина = $22\frac{1}{2}$ сант., ширина (поперечникъ) = 16 сант. и окружность тѣла (обхватъ) въ самой широкой части его = 49 сант. Итакъ, мы имѣли довольно рѣдкую ¹⁾ форму по своей величинѣ и продолжительности пребыванія въ маткѣ *пузырнаго заноса*.

Больная еще въ концѣ іюня мѣсяца 1888 г. замѣтила у себя увеличеніе (значительное) живота,—какъ у беременной на 4-мъ мѣсяцѣ (по ея словамъ), но съ тѣхъ поръ и до выкидыша она уже не замѣтила, чтобы еще значительно увеличился животъ. На основаніи анамнестическихъ данныхъ (кровотеченія изъ матки съ среднихъ чиселъ апрѣля мѣсяца, значительнаго увеличенія живота въ концѣ іюня мѣсяца) и значительной (рѣдкой) величины самаго заноса можно признать, что заносъ соответствовалъ по крайней мѣрѣ 8-ми мѣсячной беременности. Такъ какъ кровотеченіе по изверженіи заноса почти прекратилось, то никакихъ оперативныхъ мѣръ не принималъ, а назначилъ внутрь *secale cornutum*. Больная скоро поправилась.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ начинающагося выкидыша (угрожающаго), при явленіяхъ неправильныхъ и довольно сильныхъ кровотеченій съ небольшимъ повышеніемъ температуры (эндометритъ), я имѣлъ возможность наблюдать благотворное дѣйствіе, въ смыслѣ удержанія яйца въ маткѣ и дальнѣйшаго его развитія, отъ внутреннихъ

¹⁾ См. Учебникъ Акушерства К. Шредера, русск. переводъ. 1888 года, стр. 396.

приемовъ въ продолженіи 10—15 дней *extr. fluidi viburni prunifolii*, по 25 капель 3 раза въ день; другаго лѣченія при приемахъ этого экстракта я не назначалъ. (См. подоб. случ. въ акуш. табл.).

I. Ручное удаленіе задержан. оболочекъ (части ихъ) пришлось сдѣлать одинъ разъ у многорожавшей послѣ правильныхъ родовъ, при задержаніи ихъ и кровотеченіи изъ матки. Младенецъ родился живымъ. Родильница скоро и легко оправилась послѣ родовъ.

К. Зашиваніе промежности произведено было въ семи случаяхъ у первородящихъ, при срочныхъ родахъ, изъ нихъ послѣ наложенія шипцовъ—въ 2-хъ случаяхъ; швы накладывались изъ шелку, прокипяченнаго въ сулемѣ; швы были влагалищные и промежностные; накладывались вскорѣ послѣ родовъ (не позже, какъ черезъ часъ послѣ родовъ); нѣкоторые влагалищные швы прорѣзывались; вездѣ—первое натяженіе. Послѣ налож. швовъ родильницы не лихорадили. Швы снимались обыкновенно на 10—12 день; ноги связывались всѣмъ, за исключеніемъ одной, которая по своему произволу на 3-й день встала съ постели и ходила по своимъ хозяйственнымъ дѣламъ (всетаки и у этой послѣдней разрывъ зажилъ первымъ натяженіемъ, еще болѣе совершеннымъ образомъ, нежели у другихъ; родильница эта—очень мускулистая и здоровая женщина).

L. Выжиманіе послѣда по Credé произведено въ 33 случаяхъ, большею частію черезъ 5—10 минутъ послѣ родовъ, если принималъ роды самъ врачъ; только въ нѣкоторыхъ случаяхъ, гдѣ врача приглашали специально только по поводу задержанія послѣда, приходилось выжимать черезъ нѣсколько часовъ послѣ окончанія родовъ. Послѣ выжиманія послѣда кровотеченій не наблюдалось.

Смертность послѣ операций въ нѣкоторой степени зависѣла отъ самой операціи только развѣ въ одномъ случаѣ (см. № 13 въ отдѣлѣ «Поворотовъ»), да и то перитонитъ (?) въ этомъ случаѣ развился, по всему вѣроятію, еще во время родовъ (начало); въ другихъ трехъ случаяхъ смерть послѣ оперативнаго вмѣшательства зависѣла отъ упадка силъ самихъ роженицъ (подробнѣе это можно видѣть въ акуш. табл.); кромѣ того въ двухъ случаяхъ смерть роженицы послѣдовала отъ истеченія кровью еще

до окончанія родовъ (въ одномъ случ. отъ помощи врача отказались родные роженицы, а въ другомъ случ.—врачъ уже не засталъ въ живыхъ роженицу) и въ одномъ случаѣ—послѣ родовъ двойнями безъ оперативной помощи врача (см. акуш. таблицы №№ 2, 17 и 121).

Эклампсія мною была наблюдаема (случаи не внесены въ акуш. таблицы) только *въ трехъ случаяхъ*, изъ которыхъ *въ одномъ случаѣ* до возбужденія преждевременныхъ родовъ были собственно говоря очень легкіе экламптические припадки и въ мочѣ бѣлка не найдено (объ этомъ впрочемъ вскользь упоминается въ акуш. табл., № 106), лѣченія же этихъ припадковъ специально не было; *въ другомъ случаѣ* припадки эклампсіи наблюдались уже на третьей сутки послѣ родовъ у многороженицы (при родахъ была только простая бабка), бѣлка въ мочѣ не найдено, развился лѣвосторонній параметритъ и припадки эклампсіи уступили клизмамъ изъ хлораль-гидрата, число припадковъ до пяти въ продолженіи 5—6-ти часовъ; у *третьей* многороженицы, ок. 40 л., наблюдались очень сильныя припадки эклампсіи во время родовъ и въ послѣродовомъ періодѣ (продолжались съ перерывами около сутокъ, число припадковъ до 20-ти), роды—безъ оперативнаго вмѣшательства и безъ врача, врачъ былъ послѣ родовъ; экламптич. припадки во время родовъ наблюдала акушерка; лѣчение — хлороформированіе; выздоровленіе, — бѣлокъ въ мочѣ.

Еще считаю не безынтереснымъ сообщить о лѣченіи мною *неукротимой рвоты беременныхъ* (одинъ случай вписанъ въ акуш. табл. подъ № 99). Настоящей, такъ называемой, неукротимой рвоты у беременныхъ я наблюдалъ только три (очень упорная) случая; лѣчение ея заключалось, послѣ всякихъ прежде предлагавшихся другихъ лѣкарствъ, въ конечномъ *назначеніи Cocaini muriatici Merk* (не болѣе $\frac{1}{4}$ и не менѣе $\frac{1}{8}$ грана на приѣмъ 3—4 раза въ день) и это послѣднее средство только принесло пользу: рвота прекратилась и больныя доносили до срока. Вообще могу сказать, что при всякой рвотѣ, довольно упорной, у беременныхъ, гдѣ не помогали *morph. muriat.*, тамъ *всегда, въ 1—2 дня, останавливалъ рвоту cocain. muriat.* въ выше

указанныхъ дозахъ. Кокаинъ въ подобныхъ случаяхъ я употребляю съ 1888-го года (въ этомъ году у меня былъ 1-й тяжелый случай *hysteremesis gravidarum*) и до сихъ поръ не разочаровался въ его назначеніи.

Въ приведенныхъ выше трехъ случаяхъ неукротимой рвоты беременныхъ появленіе и существованіе рвоты никоимъ образомъ не могло бытъ поставлено въ зависимость отъ какого-либо заболѣванія половыхъ органовъ.

Такимъ образомъ и я, подобно нѣкоторымъ другимъ врачамъ ¹⁾, склоненъ признать какъ-бы специфичность или большую вѣрность дѣйствія въ кокаинѣ противъ неукротимой рвоты беременныхъ.

Въ заключеніе, на основаніи своей девятилѣтней земско-медицинской практики, считаю возможнымъ придти къ слѣдующимъ выводамъ касательно акушерской дѣятельности въ селахъ:

1) Всякій земскій врачъ въ селѣ долженъ имѣть болѣе или менѣе *спеціальныя познанія и опытность* въ акушерствѣ, а потому должно быть обращено особенное вниманіе на спеціальную акушерскую подготовку выпускаемыхъ врачей.

2) Въ каждомъ земскомъ медицинскомъ участкѣ должна быть хотя-бы одна акушерка-фельдшерица, такъ какъ крестьяне не могутъ еще постичь того, какъ акушерка можетъ не лѣчить и нѣкоторыхъ другихъ, особенно женскихъ болѣзней,—опасность же, предполагаемая нѣкоторыми для роженицы отъ совмѣщенія акушерскихъ обязанностей съ фельдшерскими (напр. занесеніе заразы и др.) такая же, какъ и со стороны врача-акушера (вѣдь земскій врачъ очень часто въ силу обстоятельствъ долженъ отъ дифтерита или рожи ѣхать къ роженицѣ, а занесеніе такой заразы врачомъ или заболѣваніе послѣродовое по винѣ врача я не наблюдалъ).

3) Земства всякаго участковаго врача должны снабжать *всѣми* необходимыми акушерскими инструментами, что весьма рѣдко выполняется (приходится съ бою брать выписку инструментовъ вообще).

¹⁾ См. Журналъ Акушерства и Женскихъ болѣзней, 1891 г. № 12: П. Т. Нейштубе. *Hysteremesis gravidarum*....

4) Необходимо земствамъ въ каждомъ селѣ имѣть обученную сельскую повитуху (изъ крестьянокъ мѣстныхъ лучше), которая, кромѣ рациональной помощи при родахъ и послѣ нихъ, могла бы, какъ и теперь доморощенныя повитухи, до выздоровленія роженицы помогать въ крестьянскомъ домашнемъ хозяйствѣ.

5) Вреда отъ ранняго вставанія послѣ легкихъ родовъ (на 3-и сутки) я не наблюдалъ, а польза была (напр. болѣе совершен. удаленіе лохий, болѣе быстрое выздоровленіе и т. п.).

6) Оперативное лѣченіе остатковъ выкидыша и начавшагося выкидыша (выскабливаніе) считаю самымъ скорымъ, безопаснымъ и легкимъ, сравнительно съ другими средствами.

АКУШЕРСКІЯ ТАБЛИЦЫ.

(Съ февраля 1885 года по январь 1893 г.).

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣтъ а.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Горбовской медицинскій участокъ.						
1885 г. Февр.	Палагея П ская Казачка № 1.	20	С. Бавланная Муравейка Черниговск. уѣзда.	I рож.	Течение родовъ нормально; послѣдъ выжтъ по Credé.	
Декаб.	Ксенія Д да крестьянка № 2.	20	С. Горбово Черниговск. уѣзда.	I рож.	Роды двойными; одинъ мальчикъ родился до прибытія врача, а на 9 день послѣ рожденія 1-го младенца родился и 2-й мертвый; послѣ чего сейчасъ же умерла и роженица.	Отъ оперативной помощи врача отказалась. Причина смерти не установлена.
Апр.	Марина Г ва крестьянка № 3.		С. Горбово Черниговск. уѣзда.	Неизв.	Задержание дѣтскаго мѣста въ маткѣ (7 часовъ было задержано). Удаленіе послѣда рукой, введенной въ матку, безъ хлороформнаго наркоза.	Выздоровѣла. Врачъ приглашенъ только по поводу задержанія послѣда.
1886 г. Іюнь.	Дарія Ф къ крестьянка № 4.	42	С. Бакланная Муравейка Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Роды тройными, одинъ младенецъ живой, а двое мертвы и мацерированы. Выжиманіе послѣда по Credé. Плодныхъ оболочекъ три и 2 дѣтскихъ мѣста; одно мѣсто—общее для двухъ плодовъ.	Выздоровѣла.
	Х. Х крестьянка № 5.		С. Куликовка Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Роды нормальные. Выжиманіе послѣда по Credé.	

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Авг.	Матрона С ко крестьянка № 6.	27	С. Горбовъ Черниговск. уѣзда.	Много-рожд.	Нормальный ходъ родовъ.	
»	Марія М цъ крестьянка № 7.	22	С. Бакланная Муравейка Черниговск. уѣзда.	I рож.	Роды двойными; нормальный ходъ родовъ. Плодные оболочки отдѣльныя для каждаго плода и мѣста дѣтскія—тоже.	
»	Евфросинія Н къ крестьянка № 8.	30	Д. Слободка Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Выпаденіе лѣвой ручки болѣе сутокъ, косое положеніе; плодъ мертвый и загнившій. Ампутація выпавшей ручки, поворотъ на ножки и извлеченіе подъ хлороформнымъ наркозомъ. Промываніе матки борной водой (3%).	По извлеченіи плода и дѣтскаго мѣста, какъ тотъ, такъ и другое были въ состояніи разложенія и издавали сильное зловоніе. Роженница умерла черезъ сутки отъ сепсиса.
»	Агафія В цъ крестьянка № 9.	19	С. Горбовъ Черниговск. уѣзда.	I рож.	Плодные оболочки прорваны; ходъ родовъ въ остальномъ нормальный.	
1877 г. Янв.	Христина С ская крестьянка № 10.	21	С. Горбовъ Черниговск. уѣзда.	I рож.	Родилась дѣвочка въ глубокой асфиксіи и оживлена. Роды срочные; положеніе затылочное.	
Май.	Наталія Б я крестьянка № 11.	35	М. Салтыкова-Дѣвица Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Косое положеніе, выпаденіе правой ручки. Поворотъ на ножки и извлеченіе уже мертваго ребенка подъ хлороформнымъ наркозомъ.	Тазъ суженъ умѣренно. Предъидущіе роды окончились съ прободеніемъ головки мертваго плода. Пузырно-влажный шечный свищъ образовался. Помогала акушерка. Выздоровѣла.

Годъ и мѣсяць.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣнаніе.
Іюнь.	Юлія Г рь дворянка № 12.	18	С. Ковчинъ Черниговск. уѣзда.	I рож.	Задержание послѣда въ маткѣ, вслѣдствіе приращенія его: удаленіе послѣда рукой изъ матки подъ хлороформнымъ наркозомъ.	Выздоровѣла. Врачъ приглашенъ для удаленія мѣста, послѣ 3-хъ часового задержанія его. Помогала акушерка.
Іюль.	Уліанія Л ко крестьянка № 13.	32	С. Бакланная Муравейка Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Ходъ родовъ нормальный. Выжиманіе послѣда по Credé. Головное предлежаніе	Выздоровѣла.
»	Евдокія М за казачка № 14.	37	С. Куликовка Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Роды двойнями, ходъ родовъ нормальный: головное и ягодичное предлежаніе. Извлеченіе 2-го ребенка за ягодицы.	
»	Уліанія С вчѣ крестьянка № 15.	20	С. Горбовъ Черниговск. уѣзда.	I рож.	Общесъуженный тазъ; слабость потугъ. Наложеніе щипцовъ на предлежащую головку. Плодъ извлеченъ мертвымъ.	Выздоровѣла.
Авг.	Б ая дворянка № 16.	20	С. Буда Черниговск. уѣзда.	I рож.	Ходъ родовъ нормальный, небольшой разрывъ промежности (2 степени).	Родила до пріѣзда врача, отъ зашиванія промежности отказалась.
»	П ва крестьянка № 17.	20	С. Горбовъ Черниговск. уѣзда.	I рож.	Центральное предлежаніе послѣда, сильное кровотеченіе болѣе сутокъ, апаемія acutissima. Умерла безъ врачебной помощи. Срочные роды.	Къ оперативной помощи родители роженицы не допустили врача.
»	Христина Т я крестьянка № 18.	22	С. Горбовъ Черниговск. уѣзда.	I рож.	Ягодичное положеніе. Извлеченіе за одну ножку. Младенецъ въ асфиксіи и оживленъ.	Помогала акушерка.
»	Меланія Т ая крестьянка № 19.	31	С. Горбовъ Черниговск. уѣзда.	Много-рожен	Тазъ плоскостъуженный, слабость потугъ. Наложеніе щипцовъ на низко стоящую головку. Выжиманіе послѣда по Credé (безъ хлороформнаго наркоза).	Предлежаніе головки.

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Дѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Нолб. 1888 г. Апр.	П ко крестьянка № 20. Х. Х. крестьянка № 21.	30 30	С. Горбовъ Черниговск. уѣзда. С. Лукашевка Черниговск. уѣзда.	Много- рожен. Много- рожен.	Прорваны плодныя оболочки. Ходъ родовъ нормальный. Полное (центральное) предлежаніе послѣда. Преждевременные роды на 7 мѣсяцѣ. Сильное кровотеченіе (2 сутокъ). Поворотъ на ножки и извлеченіе.	Роженіе пла черезъ 1/2 су- токъ умерла при явленіи полнаго упад- ка силъ (острая анемія).
Березинскій медицинскій участокъ:						
Юнѣ.	Екатерина А да крестьянка № 22.	20	Д. Рогозки Городницк. уѣзда.	I рож.	Преждевременные роды (на 8 мѣсяцѣ); теченіе родовъ правильное; послѣдъ задержался и черезъ часъ послѣ родовъ выжать по Credé.	
»	Анастасія Н ва духовн. зван. № 23.	26	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Теченіе родовъ правильное. Роды срочные.	
»	Рохля П ва евр. мѣщан. № 24.	18	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	I рож.	Затянувшіеся роды, слабость потугъ; тазъ умеренно суженъ; наложеніе щипцовъ на предлежащую головку въ выходѣ изъ малаго таза. Выжиманіе послѣда.	Въ послѣ- родовомъ со- стояніи раз- вился гной- ный вагп- нитъ, кото- рый прошелъ отъ спринцо- ванія влага- лица aqua sublimata (1:2000).
Іюль.	Х. Х. М ко жена купца № 25.	25	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	I рож.	Задержаніе послѣда (болѣе 2 часовъ), — выжать по Credé.	Врачъ былъ приглашенъ только по по- воду задер- жанія послѣ- да.

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роди.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Іюль.	Х. Х. П а мѣщанка № 2С.	38	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Беременность на 9 мѣ- сяцѣ, преждевременныя роды, — воды идутъ 1½ сутки, потуги уже около недѣли, внутренний зѣвъ матки раскрытъ на 2 по- перечныхъ пальца. Потугъ нѣтъ въ моментъ посѣще- нія врача.	Отъ помо- щи врача от- казалась и черезъ ½ су- токъ послѣ посѣщенія врача разрѣ- шилась жи- вымъ младен- цемъ въ при- сутствіи про- стой бабки.
»	Фрума Г ѣ свр. мѣщан. № 27.	23	М. Седневъ Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Выкидышъ на 5 мѣсяцѣ; двойни. Раннее отхожде- ніе водъ (за ½ сутокъ до пріѣзда врача), выпаденіе пуговины и небольшое кровотеченіе; отсутствіе потугъ, внутренний зѣвъ пропускаетъ съ трудомъ 2 пальца. Accouchement forcé (расширеніе зѣва пальцами руки), но захва- тить ножку плода пальца- ми не удалось (судорож- ное обхватываніе паль- цевъ зѣвомъ матки) и ро- ды окончились произволь- но 2 мертвыми плодами. Послѣдъ одинъ общій. Го- ловное и ягодичное пред- лежаніе.	Хлорофор- мированіе ро- женницы про- изводилось уже послѣ расширенія зѣва (зѣвъ удалось рас- ширить въ продолженіи 3½ часовъ до 5 попереч- ныхъ паль- цевъ. Выздо- ровѣла. При- нималъ врачъ безъ акушер- ки.
»	Меланія NN крестьянка № 28.	20	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	1 рож.	Атоническое состояніе матки. Наложеніе щип- цовъ на низко стоящую предлежащую головку.	
Авг.	Татьяна Б ко Мѣщанка № 29	27	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Выкидышъ 3-хъ мѣсяч- ный. До пріѣзда врача яйцо вышло цѣликомъ. Кровотеченіе остановлено назначеніемъ <i>secale cog- nitum</i> .	Выздоров- леніе.
»	Лидія Б на Мѣщанка № 30	40	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Тазъ суженъ рахити- чески. Атонія матки; при- рошеніе послѣда; наложе- ніе щипцовъ на низко стоящую въ выходѣ пред- лежащую головку и руч- ное отдѣленіе приросшаго послѣда (безъ хлороформ- наго наркоза).	Послѣро- довое состоя- ніе безъ по- вышенія тем- пературы. Однократное промываніе матки 3% ра- створомъ бор- ной кислоты тогдашъ послѣ родовъ.

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Авг.	XX. Т. ко Козачка № 31	37	С. Локнистое Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	4 сутки тянутся роды: косоe положеніе плода и воспаленіе ручки (правой), плодъ мертвый; ручка отечна, синюшна. Подъ хлороформнымъ наркозомъ—поворотъ на обѣ ножки и извлеченіе разложившагo мертвoго плода (вполнѣ доношеннаго); удаленіе ручки изъ матки приросшаго послѣда.	До операціи больная немного подкрѣплена коньякомъ и мускусомъ; послѣ операціи черезъ 1/2 часа больная умерла отъ истощенія.
»	XX. Еврейка Мѣщ. № 32.	30	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Пуерперальный эндометритъ (острый) на 3-и сутки послѣ родовъ; температура до 40° утромъ. Выдѣленія изъ матки съ дурнымъ запахомъ. Промываніе полости матки 1% эмульсіей креолина трехкратное (въ продолженіи 1 1/2 сутокъ); внутрь — <i>secale cornutum</i> .	Черезъ 2 дня послѣ перваго промыванія матки паденіе температуры до нормы. Выздоровленіе.
»	Марія З. ва Крестьян: № 33.	26	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Пуерперальный эндометритъ (на 3 сутки послѣ родовъ); температура до 40°, выдѣленія изъ матки въ ничтожномъ количествѣ и съ дурнымъ запахомъ. Однократное промываніе полости матки 1% эмульсіей креолина; <i>secale cornut.</i> внутрь.	Черезъ сутки послѣ однократнаго промыванія матки температура пала до 38° вечеромъ и количество лохий увеличилось. Выздоровленіе.
Сент.	XX. Крестьянка № 34.	40	Д. Чернышъ Черниговск. губерніи.	Много- рожен.	Косоe положеніе плода; выпаденіе ручки (опредѣленіе сдѣлано акушеркой письменно мнѣ) около 1/2 сутокъ; до моего приѣзда ребенокъ родился безъ вмѣшательства искусства (<i>evolutio spontanea</i>) и прожил послѣ родовъ только 1/2 часа; я засталъ его уже мертвымъ.	Выздоровленіе. Деревня отъ моего мѣстожительства въ 25 верстахъ.
»	Парасковія О. ская Козачка № 35.	27	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много- рожен	Преждевременные роды (начало 9 мѣсяца), слабость потугъ, воды идутъ уже 1 1/2 сутки. Наложеніе щипцовъ на предлежащую низко стоящую головку. Плодъ извлеченъ въ асфиксіи. Выжиманіе послѣда по <i>Credé</i> .	Младенецъ умеръ черезъ 5—6 часовъ послѣ родовъ. Выздоровленіе.

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНІЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Сент.	Параскева Ш. . . . онъ Крестьян. № 36.	28	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	I рож.	Роды тянутся 2 сутокъ; воды прошли за $\frac{1}{2}$ сутокъ до моего прибытія; слабость потугъ; наложеніе щипцовъ на низко стоящую предлежащую головку; младенецъ извлеченъ живымъ. Приросшіи къ маткѣ послѣдъ (на протяженіи $\frac{1}{3}$ своей части) удаленъ рукой. Промываніе матки 3% борной водой тотчасъ послѣ операціи.	Выздоровленіе.
»	Феодосія О. ко Крестьян. № 37.	40	Д. Рогозки Городницк. уѣзда.	Много-рожен.	Роды тянутся 2 сутокъ. Воды прошли за сутки до моего прибытія. Поперечное положеніе плода; по изятіи водъ сразу въ выходѣ изъ влагалища показались ножки и ручка и дальше не двигались (по заявленію простой бабки). Поворотъ на ножки и извлеченіе за обѣ ножки. Младенецъ родился въ глубокой асфиксіи и скоро оживленъ. Послѣдъ удаленъ рукой, введенной въ матку. Пуповина два раза обвита вокругъ шеи младенца.	Операция подъ хлороформомъ; помогла сельская повитуха. Полость матки тотчасъ послѣ операціи промыта 3% растворомъ борной кислоты. Выздоровленіе.
Окт.	Мавра П. ко Крест. № 38.	25	Г. Березна Черниговск. губерніи.	I рож.	Выкидышъ 2 мѣсячный Лѣкарственное лѣченіе.	
Нояб.	Анна С. о Крест. № 39.	31	Тоже	Много-рожен.	Пузырный заносъ около 7 мѣсяцевъ; вышелъ произвольно, безъ вмѣшательства врачабнаго искусства.	Выздоровленіе. Лѣченіе: Secale cornutum. внутрь.
»	Агриппина Ш. ко Крест. № 40.	20	Тоже	I рож.	Ходъ родовъ правильный. Положеніе головное.	
»	Ольга Г. ко Мѣщ. № 41.	20	Тоже	I рож.	Слабость потугъ; наложеніе щипцовъ на низко стоящую предлежащую головку.	

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Дѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Нояб.	Раса Ш. ва Евр. мѣщ. № 42.	20	Г. Березна Черниговск. Уѣзда.	I рож.	Выкидышъ 6 недѣльный. Яйцо вышло произвольно цѣликомъ.	Послѣдова- тельное дѣче- ніе дѣкар- ственное.
»	Василиса П. ая Крест. № 43.	30	Тоже	Много- рожен.	Выкидышъ 6 недѣльный. Яйцо вышло произвольно цѣликомъ.	Тоже.
»	Евфросинія Ч. ая Крест. № 44.	27	Тоже	Много- рожен	Ходъ родовъ правиль- ный. Положеніе затылоч- ное.	
»	Броха Ф. ель Евр. мѣщ. № 45.	23	Тоже	I рож.	Кровотеченіе изъ матки при 4 мѣсячной беремен- ности. Покойное положе- ніе на спишь и Secale cornut.	Донос и ла- до срока.
Дскаб.	Феодора С. ая Крест. № 46.	30	Тоже	Много- рожен.	Теченіе родовъ правиль- ное. Положеніе темянное.	
	XX. Д. ко Крест. № 47.	30	Тоже	Много- рожен.	Теченіе родовъ правиль- ное. Положеніе темянное.	
1883 г. Янв.	Пелагія В. кая Мѣщан. № 48.	28	Тоже	Много- рожен.	Преждевременные роды (начало 8 мѣсяца) Задер- жаніе послѣда въ маткѣ (20 часовъ); судорожное сокращеніе маточнаго звѣ- ва, пуповина оторвана баб- кой; порокъ сердца. Уда- лтъ послѣдъ пальцами не удалось (безъ хлороформа); на инструментальное уда- леніе большая не согласи- лась.	Врачъ былъ приглашенъ по поводу за- держанія по- слѣда. Выздо- рвленіе и произвольное выхожденіе послѣда по частямъ въ продолженіи 2 недѣль съ значительно повышенно температурой и зловоннымъ выдѣленіемъ.
»	XX. Н. чь Духов. зван. № 49.	30	Тоже	Много- рожен.	Ходъ родовъ нормаль- ный. Послѣдъ ущемленъ въ маточномъ звѣвѣ и по- тому извлеченъ рукой, введенной въ матку.	Выздор о в- леніе.

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ рода.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Янв.	Х.Х. В ва Крест. № 50.	19	Г. Березна Черниговск. Уѣзда.	I. рож.	Атонія матки, затянувшіея роды; наложены щипцы на подлежащую низко стоящую головку. Выжиманіе послѣда. Тотчасъ по извлеченіи младенца — угрожающее кровотеченіе изъ матки, остановленное впрыскиваніемъ горячей воды въ матку.	Выздоровленіе при нормальн ой температурѣ.
»	Х.Х. Кор ва Крестьян. № 51.	окол. 30	Тоже	Много-рожен.	Задержаніе дѣтсваго, присосаго къ маточной стѣнкѣ, мѣста около сутокъ; пуповина оторвана бабкой. Удаленіе, по частямъ, рукой изъ полости матки начавшаго разлагаться мѣста и послѣдовательное однократное промываніе матки борной водой (3%).	Врачъ приглашенъ по поводу задержанія послѣда. Хлороформ и роваль фельдшеръ. Выздоровленіе съ повышеніемъ температуры.
Февр.	Х.Х. Крестьянка № 52.	25	Тоже	I рож.	Ходъ родовъ нормальный. Положеніе головное.	
»	Рася Ю ская Евр. мѣщ. № 53.	38	Тоже	Много-рожен.	Задержаніе въ полости матки присосаго послѣда; пуповина оторвана бабкой. Удаленіе рукой изъ полости матки, по частямъ, присосаго послѣда безъ хлороформнаго наркоза.	Врачъ былъ приглашенъ по поводу задержанія послѣда.
»	Матрена Ч онъ крестьянка № 54.	30	Тоже.	I рож.	Ходъ родовъ правильный. Послѣдъ выжатъ по Credé. Положеніе головное.	
Март.	Х. Х. крестьянка № 55.	?	Тоже.	I рож.	Затянувшіея роды. Безъ хирургическаго вмѣшательства. Затялочное положеніе.	
»	Надежда З ко крестьянка № 56.	32	Тоже.	Много-рожен.	Косое положеніе младенца, выпаденіе ручки (выпаденіе ручки около 3 часовъ); сердцебіеніе плода не слышно. Поворотъ на ножку и извлеченіе за одну ножку. Плодъ безъ признаковъ жизни извлеченъ и не могъ быть оживленъ.	Помощница простая повитуха. Безъ хлороформнаго наркоза.

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Март.	Фейга О ая евр. мѣщан. № 57.		Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Атонія матки; воды про- шли за 2 часа до прибы- тія врача; роды срочные; тазь умѣренно-обще-служе- женъ. Наложеніе щипцовъ на предлагающую головку. Выжиманіе послѣда по Credé. Промываніе матки однократное 2% эмуль- сіей креолина.	Щипцы на- кладывалъ 2 раза, такъ какъ первый разъ со- скользнули. Младенецъ извлеченъ живымъ съ громадной го- ловой опу- холью. Извле- ченіе было трудное.
Апр.	Пелагея Ев ая крестьянка № 58.	37	Тоже.	Много- рожен.	Косое положеніе мла- денца, выпаденіе лѣвой ручки,—роды срочные. До прибытія врача бабка вправила ручку и младе- нецъ родился произвольно (мертвымъ). Шель голо- вой.	
»	Хана Г ргъ евр. мѣщан. № 59.	24	Тоже.	I рож.	Срочные роды, безъ хи- рургическаго вмѣшатель- ства. Задержаніе послѣда; выжиманіе его неудалось, а потому удаленъ рукой изъ полости матки (при- росшей).	Безъ по- мощниковъ
»	Домникія Б ко мѣщанка № 60.	38	Тоже.		Задержаніе дѣтскаго мѣста въ маткѣ (около 12 часовъ), мѣсто не прирос- шее, матка атонична. Уда- леніе мѣста рукой, введен- ной въ матку. Промыва- ніе однократное матки тотчасъ по удаленіи мѣ- ста 1½% эмульсіей крео- лина.	Безъ хло- роформнаго наркоза и по- мощниковъ. Врачъ былъ приглашенъ по поводу за- держанія по- слѣда.
»	Броха Ф ль евр. мѣщан. № 61.	22	Тоже.	I рож.	Срочные роды, атонія матки, наложеніе щипцовъ на низко стоящую пред- лежащую головку; разрывъ промежности 2 степени. Наложеніе шелковыхъ швовъ на разрывъ. Выжи- маніе послѣда.	Prima in- tentio на мѣстѣ разры- ва. Зажимле- ніе подъ ком- прессами изъ креолиново й эмульсіи.

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Дѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Апр.	Дина Г на свр. мѣщан. № 62.	20	Г. Березна Черниговск. уѣзда	I рож.	Роды срочные, безъ хирургическаго вмѣшательства; послѣдъ выжать по Смедѣ. Головное положеніе.	
Май.	Екатерина Я ко дворянка № 63.	30	Тоже.	II рож.	Атонія матки; приращеніе послѣда; наложеніе щипцовъ на подлежащую низко-стоящую головку. Удаленіе рукой изъ полости матки приращаго послѣда. Промываніе матки послѣ удаленія послѣда 2% растворомъ карболовой кислоты.	Помощниками были д-ра И. С. Федоренко и Яковенко. Хлороформированіе.
Іюнь.	Марфа С и крестьянка № 64.	27	Тоже.	Много-рожен.	Трехмѣсячная беременность; кровоточенія изъ матки и потугообразныя боли.	Дѣкарственное леченіе. Доносила до срока.
»	Марья Н ва свр. мѣщан. № 65.	25	Тоже.	II рож.	Срочные роды; предложеніе ножскъ и выпаденіе пуповины, атонія матки. Извлеченіе плода за ножку.	Послѣдующая головка съ большимъ трудомъ извлечена по Пращек о му способу и ребенокъ оказался мертвымъ.
Іюль.	Екатерина Г мѣ крестьянка № 66.	25	Тоже.	Много-рожен.	Семимѣсячная беременность; небольшое кровоточеніе изъ матки и боли въ поясницѣ (угрожающіе преждевременные роды).	Положеніе на спинѣ и внутренніе приемы Ext. fluid. Viburni prunifolii. Доносила до срока.
»	Рохля Е на мѣщанка № 67.	25	Тоже.	I рож.	Восьмимѣсячная беременность; боли въ поясницѣ и внизу живота (угрожающіе преждевременные роды).	Тоже.

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Іюль.	Х. Х. Х ичь евр. мѣщан. № 68.	40	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много рожен.	Задержаніе въ полости матки послѣда; удаление приросшаго послѣда изъ матки рукой. Матка промыта борной водой.	Безъ хлороформнаго наркоза и безъ помощниковъ. Врачъ приглашенъ по поводу задержанія послѣда.
»	Рася М ва евр. мѣщан. № 69.	27	М. Седневъ Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Начало 9-ти мѣсячной беременности; схваткообразныя боли въ маткѣ. Доносила до срока.	Положеніе на спинѣ и Ext. fluid. Viburni prunifoliai внутрь.
Сент.	Александра Ч ская дворянка № 70.	40	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Преждевременные роды. Начало 9-го мѣсяца беременности вѣдъ (небольшое количество); болѣе въ животѣ ить; черезъ сутки, послѣ обращенія за совѣтомъ ко мнѣ, родила живаго немного недоношеннаго младенца.	
»	Матрона Н ва крестьян. № 71.	40	С. Выбли Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Срочные роды, атонія матки; тазъ плоско суженный; головка вколочена неподвижно въ выходъ изъ малаго таза; плодъ мертвъ; наружныя половыя органы отечны; роды длятся 3-е сутокъ. Наложить щипцы не удалось; перфорация головки и извлеченіе плода. Послѣдъ выжать по Credé. Пробныя щипцы.	Помощница акушерка, подъ хлороформнымъ наркозомъ. Матка промыта борной водой (3 ^o /o). Выздоровленіе.
»	Х. Х. Л ва крестьян. № 72.	?	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Срочные роды безъ хирургическ. вмѣшательства; сильное кровотеченіе тотчасъ по выходѣ дѣтскаго мѣста. Головное положеніе	Лѣкарствен- ное лѣченіе.
Окт.	Лукія Ж ко крестьян. № 73.	28	Тоже.	Много- рожен.	Срочные роды; приросшій послѣдъ; плотныя плодныя оболочки. Послѣдъ удаленъ изъ матки рукой; плодныя оболочки прорваны пальцами.	

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Окт.	Елена Ж ва крестьян. № 74.	29	С. Бѣгачъ Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Срочные роды, безъ хирургическ. вмѣшательства; тазъ немного общесуженъ; слабость потугъ. Темянное положеніе.	
»	Геся В ва евр. мѣщ. № 75.	39	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Преждевременные роды на 8 мѣсяцѣ. Безъ хирургическаго вмѣшательства родился живой мальчикъ. Головное положеніе.	
Нояб.	Сора Ц инь евр. мѣщ. № 76.	45	Тоже.	Много- рожен.	Задержаніе плодныхъ оболочекъ (часть ихъ) въ маткѣ при срочныхъ родахъ; удаленіе оболочки потягиваніемъ за конецъ ихъ висѣвшій во влагалищѣ не удалось, а потому пришлось вводить всю руку въ матку.	Врачъ былъ приглашенъ по поводу кровотечения довольно значительнаго изъ матки. Выздоровленіе.
»	Евдокія О ко крестьян. № 77.	19	Тоже.	I рож.	Срочные роды, атоническое состояніе матки; наложеніе щипцовъ на низко-стоящую подлежащую головку.	Щипцы накладывалъ д-ръ Г. А. Наркевичъ.
»	Ривка Г ина евр. мѣщ. № 78.	?	Тоже.	Много- рожен.	Преждевременные на 7 мѣсяцѣ роды; безъ хирургическаго вмѣшательства, послѣдовательное, въ продолженіе 3-хъ нед., кровотеченіе изъ матки, не уступавшее мирнымъ способамъ лѣченія, остановлено выскабливаніемъ матки острой ложечкой.	Выздоровленіе.
Декаб.	Рося Ш ва евр. мѣщ. № 79.	22	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	II рож.	2-хъ недѣльная беременность; кровотеченіе; окончилось выкидышемъ, при чемъ яйцо вышло цѣлкомъ безъ вмѣшательства искусства.	Лѣченіе угрожающаго выкидыша состояло въ покойномъ положеніи на спинѣ, внутреннепріемы Ext. fluid Viburni prunifolii.

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
1890 г. Янв.	Х. Х. Г ейнь евр. мѣщ. № 80.	22	М. Седневъ Черниговск. уѣзда.	II рож.	Срочные роды, слабость потугъ. Выжиманіе плода по Кристеллеру; послѣдъ выжать черезъ 2 минуты послѣ рожденія младенца. Пуповина разъ обвита вокругъ шейки младенца; плодные оболочки прорваны пальцами. Младенецъ родился въ легкой асфиксіи и оживленъ. Головка предложала.	Выздоровленіе.
»	Х. Х. Х ичь евр. мѣщ. № 81.	24	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	II рож.	Срочные роды, безъ хирургическ. вмѣшательства. Головное положеніе.	
»	Марса III ть крестьянка. № 82.	21	Д. Рогозки Городниц. уѣзда.	I рож.	Косое положеніе плода (доношеннаго); выпаденіе правой ручки и пуповины, сердцебіенія плода не слышно и пуповина не пульсируетъ. Трудный поворотъ на обѣ ножки и извлеченіе мертваго плода. Плодъ умеръ еще до прибытія врача. Воды прошли за $\frac{1}{2}$ сутокъ до совершенія поворота.	Помощница сельская повитуха не обученная. Плодъ хлороформнымъ наркозомъ. Выздоровленіе.
»	Х. Х. З ва крестьян. № 83.	40	С. Локнистое Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Поперечное положеніе плода, выпаденіе лѣвой ручки; воды прошли за 15 часовъ до прибытія врача; <i>судорожное сокращеніе матки и при хлороформномъ наркозѣ</i> ; трудный поворотъ на ножку и извлеченіе за одну ножку. Извлеченъ мертвый младенецъ, который умеръ до начала поворота. Для облегченія поворота сдѣлано было прободеніе головки на мертвомъ плодѣ. Послѣдъ выжать черезъ 2 минуты послѣ окончанія родовъ. Роды длились 34 часа.	Операция поворота длилась $1\frac{1}{2}$ часа; головка, ручки и ножки находились вмѣстѣ (плодъ былъ скрученъ). Выздоровленіе. Помощникъ мужъ роженницы. Матка промыта борной водой.
»	Года Ц на евр. мѣщ. № 84.	40	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	II рож.	Задержаніе послѣда въ маткѣ; выжиманіе послѣда по Credè; 3 часа было задержано въ маткѣ.	Врачъ приглашенъ по поводу задержанія послѣда.

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Янв.	Евфимія Т ая крестьянка. № 85.	42	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Приращеніе къ маткѣ послѣда и задержаніе его въ продолженіи 7 часовъ; отдѣленіе и удаленіе послѣда безъ хлороформнаго наркоза.	Однократное промываніе полости по извлеченіи послѣда 2% растворомъ карболовой кислоты. Врачъ пригласенъ по поводу задержанія послѣда.
»	Анастасія Н ва духов. зван. № 86.	25	Тоже.	Много-рожен.	Срочные роды, слабость потугъ (затянувшіеся роды); наложеніе щипцовъ на низкостоящую подлежащую головку. Выжиманіе послѣда по Сredè.	Безъ хлороформнаго наркоза. Помощница, — не обученная сельская повитуха.
Февр.	Евросинія С ко мѣщанка. № 87.	19	Тоже.	I рож.	Срочные роды, потуги слабы и очень болѣзненны, тазъ (умѣренно)-общее съуженъ; наложеніе щипцовъ на низко-стоящую подлежащую головку; ручное отдѣленіе приросшаго послѣда. Промываніе полости матки 2% растворомъ карболовой кислоты.	Разрывъ промежности 2-й степени. Безъ хлороформнаго наркоза. Помощница — мать роженца.
Май.	Х. Х. крестьянка. № 88.		Сосницкій уѣздъ.	Много-рожен.	Задержаніе въ маткѣ остатковъ (не оконченный выкидышъ) мясастаго заноса послѣ 2-хъ мѣсячнаго выкидыша; удаленіе задержанныхъ частей пальцемъ безъ хлороформнаго наркоза. Кровоточила около 2-хъ недѣль. Сдѣлано амбулаторно.	Обратилась къ врачу по поводу продолжительнаго и сильнаго кровотеченія изъ половыхъ органовъ. Быстрое выздоровленіе.
»	Анна С ни крестьянка. № 89.	30	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Выкидышъ на 2 мѣсяцѣ; зародышъ вышелъ, — задержались оболочки яйца; попытки удалить задержанные части яйца на дому у больной не увѣчались успѣхомъ, а на инструментальное удаленіе больная не согласилась.	Черезъ пять дней послѣ начала выкидыша при приемахъ <i>secale cornut</i> , части яйца были извергнуты маткой и кровотеченіе, а также лихорадочное повышеніе

Годъ и мѣсяць.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНІЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Май.	Евфросинія Д. й крестьянка. № 90.	20	Д. Рогозки Городниц. уѣзда.	I рож.	Косое положеніе плода и выпаденіе пуповины; преждевременные роды на 8 мѣсяць (заявленіе бабки) До прибытія врача, бабка, вправивъ ручку, извлекла пальцами за головку мертвого ребенка.	температуры прекратились. Выздоровленіе.
»	Елена П. ко дворянка. № 91.	19	Хуторъ Шевели Сосницкаго уѣзда.	I рож.	Срочные роды двойными, атонія матки; роды тинутся 2-е сутокъ; силы больной истощены. Послѣ неудачныхъ попытокъ извлечь перваго младенца щипцами (2 раза накладывали щипцы и 2 раза соскальзывали, не причиняя никакого вреда роженицѣ) сдѣлано прободеніе подлежащей головки живаго младенца и извлеченіе его потягиваніемъ костными щипцами за кости головки. Сдѣланъ поворотъ на ножки и извлеченіе за обѣ ножки 2-го живого и доношеннаго плода (извлеченъ въ асфиксіи и оживленъ); удаленіе проросшаго послѣда рукой. Дѣтское мѣсто—общее для обихъ плодовъ, а decidua reflexa отдѣльная. Безъ хлороформнаго наркоза. Пуповина обвита одинъ разъ вокругъ ножки.	Выздоровленіе. Наложніе щипцовъ дѣлалъ земскій врачъ Г. А. Наркевичъ, а при остальныхъ операціяхъ онъ мнѣ помогаль. Матка промывта 2% растворомъ карболовой кислоты.
Іюнь.	Бейля П. ва евр. мѣщ. № 92.	22	Г. Березна Черниговск. уѣзда.		Срочные затянувшіеся роды; плотныя оболочки яйца. Разрывъ плодныхъ оболочекъ пальцами. Ходъ родовъ правильный.	
»	Маша П. ая евр. мѣщ. № 93.	окол. 30	Тоже.	Много-рожен.	Беременность на 3-мъ мѣсяцѣ, кровотеченіе изъ матки; выпаденіе задней стѣнки влагалища, опущеніе матки и старый разрывъ промежности до зад-	

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Іюнь.	Параскевія Сица казачка. № 94.	20	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	I рож.	непроходнаго сфинктера. Покойное положеніе на спинѣ и Ext. fl. Viburni prunifolii внутрь, введено кольцо Hodge, но оно не удержалось. Больная не доносила до срока. Срочные роды, безъ хирургическаго вмѣшательства. Выжиманіе послѣда по Credé.	
Октяб.	Х. Х. Лва евр. мѣщ. № 95.	40	Тоже.	Много-рожен.	Срочные роды, атонія матки; наложеніе щипцовъ на низко-стоящую предлежащую головку. Разрывъ плодныхъ оболочекъ пальцами.	
»	Марія Гко крестьянк. № 96.	22	Д. Рогозки Городницк. уѣзда.	I рож.	Срочные роды, ходъ родовъ правильный, безъ хирургическаго вмѣшательства.	
Ноябр.	Ольга Мхо крестьянка. № 97.	21	Г. Березна. Черниговск уѣзда.	I рож.	Срочные роды; слишкомъ болѣзненные потуги, причемъ головка, будучи сильно вколочена въ выходъ изъ малаго таза, нисколько не подвигалась впередъ; по просьбѣ больной наложены щипцы и извлечена живая доношенная дѣвочка. Послѣдъ выжать по Credé.	Не большой разрывъ промежности (1-й степени).
»	Васса Сца казачка. № 98.	30	Тоже.		Выкидышъ на шестой недѣлѣ безъ хирургическаго вмѣшательства.	Назначенъ sesale cognitum внутрь.
Дек.	Василиса Пая крестьянка. № 99.	31	Тоже.	Много-рожен.	Беременность на 3-мъ мѣсяцѣ; сильная рвота (чрезмѣрная). Отъ приѣмовъ сосап. туріат. прекратилась рвота.	Опредѣленіе срока беременности по желанію больной.
1891 г. Март.	Вѣра Вая жена чинов. № 100.	32	Тоже.	Много-рожен.	Мясистый заносъ, кровотеченіе изъ матки; не полный выкидышъ (на 4-мъ мѣсяцѣ). Удаленіе частей заноса пальцемъ и промываніе матки 2% растворомъ карболовой кислоты.	Sesale cognitum внутрь. Скорое выздоровленіе съ 2-мя кратнымъ повышеніемъ температуры. Помощница акушерка.

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Март.	Голда Б на евр. мѣщ. № 101.	25	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много- рожекъ	Беременность 5-ти мѣ- сячная; затрудненное моче- испусканіе; pruritus vulvae.	Лѣкарствен- ное лѣченіе. Доносила до срока.
Апр.	Екатерина Х вко дворянка. № 102.	24	Тоже.	I рож.	Срочные роды; ходъ ро- довъ правильный, выжи- маніе послѣда по Credé. Разрывъ промежности не полный 1-й степени; нало- жено на разрывъ 6 шел- ковыхъ швовъ.	
»	Геся В ва евр. мѣщ. № 103.	39	Тоже	Много- рожен.	Мясистый заносъ на 6-й недѣлѣ; кровотеченіе; вы- шель изъ матки безъ хи- рургическаго вмѣшатель- ства.	Лѣкарствен- ное лѣченіе. Вызоро- вленіе.
»	Марія М ая дворянка. № 104.	37	С. Баромыки Черниговск. уѣзда.	II рож.	Угрожающій выкидышъ 2 мѣсячный; выжидатель- ное лѣченіе; абортъ про- изошелъ въ отсутствіи вра- ча при акушеркѣ; разви- лся септический эндомет- ритъ.	Выздоровле- ніе не полное. На выскабли- ваніе матки не соглас- лась.
»	Наталія М ко крестьянка. № 105.	22	С. Бѣгачъ Черниговск. уѣзда.	I рож.	Срочные роды (затянув- шіеся); слабость потугъ, разрывъ плодныхъ оболоч- екъ пальцами; наложеніе щипцовъ на лежащую низко стоящую головку. Выжиманіе послѣда по Credé. Пуповина была об- вита одинъ разъ вокругъ шеи. Ребенокъ извлеченъ мертвымъ, тѣло его покры- то было пузырями различ- ной величины съ водяни- стымъ содержимымъ. Из- влеченіе головки щипцами было трудное.	Тазъ вѣроят- но обще-сѣ- ужень (измѣ- реніе таза не было сдѣлано) Выздоровле- ніе. Сердце- біеніе плода за часъ до наложенія щипцовъ бы- ло слышно.
»	Х. Х. Ша ра евр. мѣщ. № 106.	42	М. Мѣна Сосницкаго уѣзда.	Много- рожен.	Беременность на 8 мѣ- сяцѣ; сильная водянка жи- вота и отекъ подкожной клетчатки; предположенъ хроническій нефритъ, но въ послѣдствіи оказалась киста яичника; легкіе при- падки эклампсии и уремии. Возбужденіе искусственное преждевременныхъ родовъ;	Извлеченіе послѣдующей головки очень замедлилось и длилось ми- нутъ пять. Операція про- изводилась цѣли участія земскихъ вра-

Годъ и мѣсяць.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНІЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Май.	Василиса П ая дух. званія. № 107.	36	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	зѣвъ раскрытъ на 2 пальца. Предварительное расширение зѣва произошло подъ влияніемъ кольпейринтера, введеннаго во влагалище, а потомъ искусственное расширение зѣва (пальцами), поворотъ на ножку и извлеченіе за ножку плода; продъ — въ асфиксіи, но оживленъ. Удаленіе приросшаго послѣда изъ матки рукой.	чей И. А. Бачковского и Г. А. Наркевича. Выздоровленіе безъ повышенія температуры.
»	Муся П ая евр. мѣщ. № 108.	20	Тоже.	I рож.	Срочные роды; разрывъ промежности 2-й степени, наложено 5 шелковыхъ швовъ; prima intentio.	Выздоровленіе съ повышенной температурой.
»	Маша Р ичь евр. мѣщ. № 109.	20	Д. Рогозки Городниц. уѣзда.	I рож.	Тоже.	
Іюнь.	Прина М ая крестьянка. № 110.	22	Тоже.	I рож.	Трехмѣсячная беременность; боли въ поясницѣ, небольшое кровотеченіе; положеніе на спинѣ и Ext. fluid. Viburni prunifolii.	Доносила до срока.
»	Рохля К рь евр. мѣщ. П 111	26	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Семимѣсячная беременность; потугообразныя боли въ маткѣ положеніе на спинѣ.	Доносила до срока.
Іюль.	Ривка С ць евр. мѣщ. № 112.	30	Тоже.	Много-рожен.	Семимѣсячная беременность; схваткообразныя боли въ животѣ. Движеній плода большая не ощущаетъ нѣсколько дней; сердцебиеніе плода=135 ударовъ въ минуту. Положеніе на спинѣ. (Начало преждевременныхъ родовъ)	Родился мертвый младенецъ черезъ недѣлю послѣ обращенія за совѣтомъ къ врачу.

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНІЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Іюль.	Марія Г ва крестьянка. № 113.	22	М. Седневъ Черниговск. уѣзда.	I рож.	Срочные роды, затянувшіеся; слабость потугъ; наложеніе щипцовъ на предлежащую головку; плодъ извлеченъ живымъ. Разрывъ промежности 2-й степени; наложено 4 шелковыхъ шва; prima intentio.	
Авг.	Александра Д ко крестьянка. № 114.	20	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	I рож.	Преждевременные роды (недоношен. двѣ недѣли); катарръ мочевого пузыря. Тазъ плоско-суженный, потуги очень слабы и очень болѣзненны, значительная опухоль предлежащей головки. Наложеніе щипцовъ на головку, находившуюся въ косомъ размѣрѣ таза. Ребенокъ извлеченъ живымъ. Послѣдъ выжать по Credé.	Выздоровленіе.
»	Марина Х ко крестьянка. № 115.	40	Тоже.	Многоружен.	Трехмѣсячная беременность.	Определеніе срока беременности по желанію самой больной.
»	Хася Г инъ евр. мѣщ. № 116.	20	Тоже.	I рож.	Срочные роды, слабость потугъ; наложеніе щипцовъ на предлежащую низко стоящую головку. Послѣдъ выжать по Credé.	
»	Рося Ш ва евр. мѣщ. № 117.	23	Тоже.	II рож.	Выкидышъ на шестой недѣли беременности; яйцо вышло цѣликомъ безъ хирургическаго вмѣтательства. Кровотеченіе не велико. Ледъ на животъ.	Выздоровленіе.
Сент.	Уліанія З ва крестьянка. № 118.	20	Тоже.	Многоружен.	Срочные роды; замедленіе родовой дѣятельности въ изгоняющемъ періодѣ. Разрывъ плодныхъ оболочекъ пальцами; наложеніе щипцовъ на предлежащую низко-стоящую головку. Послѣдъ выжать по Credé.	Плодъ извлеченъ живымъ

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Сент.	Х. Х. Г . . . рг. свр. мѣщ. № 119.		Г. Березна Черниговск. губерніи.	Много- рожен.	Мясистый заносъ (3 мѣ- сячный), сильное кровоте- ченіе (2-е сутокъ); заносъ извергнуть сокращеніемъ матки при лѣкарственномъ лѣченіи. Части заноса уда- лены пальцами.	
Окт.	Броха О . . . ая свр. мѣщ. № 120.	35	Тоже.	Много- рожен.	Семимѣсячная беремен- ность.	Опредѣленіе срока бере- менности по желанію са- мой больной.
»	Х. Х. Л . . . ва крестьянка. № 121.	40	Хуторъ Канна, Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Срочные роды; сильное кровоотеченіе изъ половыхъ органовъ въ продолженіи 3-хъ сутокъ (кровь куска- ми и жидкал); за часъ до пріѣзда врача умерла не разрѣшившись отъ бремен- ни (острое малокровіе).	Посмертнаго осмотра по- ловыхъ орга- новъ и вскры- тія не было сдѣлано.
»	Эстеръ Ф . . . ннѣ свр. мѣщ. № 122.		Г. Березна Черниговск. уѣзда	Много- рожен.	Трехимѣсячная беремен- ность.	Опредѣле- ніе срока бе- ременности по желанію самой боль- ной.
»	Х. Х. свр. мѣщ. № 123.	окол. 30	Г. Придуки Полтавской губерніи (проѣздомъ).	Много- рожен.	Выкидышъ 3 мѣсячнымъ мясистымъ заносомъ (не полный); кровоотеченіе изъ матки одинъ сутки; удале- ніе кусковъ заноса паль- цами и выскабливаніемъ острой ложкой (лѣченіе больничное).	
Ноябръ	Алта Г . . . ннѣ свр. мѣщ. № 124.	17	Г. Березна Черниговск. губерніи.	I рож.	Срочные роды, атонія матки; тазъ (умѣренно) плоско суженный; бывшій коксытъ; щипцы наложены на подлежащую головку въ косомъ размѣрѣ. Не- большое кровоотеченіе до наложенія щипцовъ. Из- влеченъ живой младенецъ.	
»	Х. Х. Ц . . . ра крестьянка. № 125.	30	Тоже.	Много- рожен.	Срочные роды двойнями, безъ хирургическаго вмѣ- шательства. Одно общее лѣтское мѣсто для обоихъ пуповинъ.	Оба мла- денца шли го- ловками и ро- дился въ ас- фиксіи, ожив- лены

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Докаб.	Ольга Ц . . . инъ мѣщанка. № 126.	20	Г. Березна Черниговск. губерніи	I рож.	Срочные роды; ходъ родовъ правильный. Разрывъ промежности 2-й степени. Наложено 4 шелковыхъ шва; prima intentio.	
»	Анастасія Н . . . ва духовн. зван. № 127.	30	Тоже.	Много- рожен.	Доношенная беремен- ность; небольшое кровоте- ченіе до родовъ за сутки. Роды прошли правильно.	
»	Рися Л . . . на евр. мѣщ. № 128.	30	Тоже.	Много- рожен.	Шестинедѣльная бере- менность; кровотеченіе изъ матки не большое. Лѣкар- ственное лѣченіе.	
»	Меланія Д-Л . . . ая жена чиновн. № 129.	32	Тоже.	Много- рожен.	Трехмѣсячный выки- дышъ (неполный); плодные оболочки и часть дѣтскаго мѣста удалены пальцемъ; остальное вышло посте- пенно при выжидательномъ лѣченіи.	На выскаб- ливаніе не согласилась. Лихорадила. Въ здоров- леніе.
1892 г. Янв.	Х. Х. Б ая евр. мѣщ. № 130.	20	Тоже.	I рож.	Срочные роды,—нормаль- но; пуповина два раза об- вита вокругъ шеи младен- ца. Послѣдъ выжать по Credé. Разрывъ промеж- ности 1-й степени. Швы не накладывались.	
»	Агафія П ко крестьянка. № 131.	23	С. Дѣвица Черниговск. уѣзда.	I рож.	Срочные роды; I-ое по- перечное положеніе; пред- лежаніе праваго плечика; выпаденіе пуповины (не пульсируетъ) и правой руч- ки; судорога матки; воды прошли за 14 часовъ до прібытія врача; экзарти- куляція въ плечевомъ сус- тавѣ выпавшей ручки. Труд- ный поворотъ на ножки и извлеченіе за обѣ ножки. Плодъ умеръ за часъ, при- мѣрно, до поворота. Пос- лѣдъ выжать по Credé.	По моголь- земскій врачъ Г. К. Галинь. Въ здоров- леніе безъ по- вышенія тем- пературы.
»	Зелда Д чъ евр. мѣщ. № 132.	30	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много- рожен-	Преждевременные роды на 7-мъ мѣсяцѣ, кро- вотеченіе изъ матки 2 ¹ / ₂ недѣли; выпаденіе пупо- вины; краевое предлежаніе дѣтскаго мѣста, острое ма- локровіе роженницы. Пово-	Въ здоров- леніе безъ по- вышенной температуры.

Годъ и мѣсяць.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Янв.	Феодора М . . . о крестьянка. № 133.	40	М. Снявка Сосницкаго уѣзда.	Много- рожен.	ротъ на ножки и извлеченіе мертваго нѣсколько мацерированнаго плода (плодъ умеръ еще до операциі). До совершеннаго поворота послѣдъ отдѣленъ отъ матки рукой, захватившей потомъ ножки плода. Эктопическая беременность. Въ правой паховой области прощупывается опухоль взрослога человѣка, имѣющая связь съ маткой и выполняющая Дугласово пространство; шейка матки припухши съ синевою, матка немного увеличена. Задержаніе мѣсячныхъ — болѣе 2-хъ мѣсяцевъ.	Не оперирована и исходъ не извѣстенъ.
Февр.	Соня Ф . . . ль евр. мѣщ. № 134.	25	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много- рожн.	Восьмимѣсячная беременность; схваткообразныя боли въ поясницѣ. Лѣкарственное лѣченіе и положеніе на спишѣ.	До носила до срока.
	Рода Ф . . . нь евр. мѣщ. № 135.	35	Тоже.	Много- рожен.	Трехмѣсячная беременность, катарръ влагалища. Лѣченіе катарра лѣкарственное.	До носила до срока.
Март.	Милодора. П . . . ко крестьянка. № 136.	30	Тоже.	Много- рожен.	Срочныя роды двойнями, предлежаніе и сильное вкочиваніе въ выходѣ таза обѣихъ ножекъ, ручки и головки 2-го младенца. Попытка извлечь за ножки младенца не увѣчалась успѣхомъ; тогда перфорирована головка 2-го (живаго) плода и тупымъ крючкомъ извлечена. 1-й же младенецъ родился безъ хирургическаго вмѣшательства живымъ. Отдѣленіе и удаленіе прироснаго послѣда. Послѣдъ одинъ общій; общая оболочка плодная имѣла перегородку Головное и ножное положенія.	Первый младенецъ родился подъ наблюденіемъ только акушерки, а при не возможности окончить роды 2-го бытъ при глашенъ врачъ. Выздоровленіе безъ повышенной температуры. Помогала акушерка.

Годъ и мѣсяць.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Март.	Р Гитля . . . ва свр. мѣщ. № 137.	40	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Неполный 3-хъ мѣсяч-ный выкидышь; задержание части плодныхъ оболочекъ и послѣда. Удалены задер-жанныя части пальцемъ и потомъ выскоблены острой ложечкой.	Выздор о в-леніе. Въ боль-ницѣ.
»	Х. Х. крестьянка. № 138.	—	Тоже.	Много-рожен.	Задержаніе въ маткѣ ос-татковъ яйца послѣ выки-дыша (время точно не оп-редѣлено); выскабливаніе острой ложкой.	Выздор о в-леніе. Въ боль-ницѣ.
Апр.	С Евфросинія па мѣщанка. № 139.	33	Тоже.	Много-рожен.	Срочные роды; (умѣрен-но) плоско суженный тазъ. слабость потугъ; наложе-ніе щипцовъ на предлежа-щую низко стоящую го-ловку въ нѣсколько ко-сомъ ея размѣрѣ. Извле-чена живая дѣвочка сред-нихъ размѣровъ; пуповина одинъ разъ была обвита вокругъ шеи плода Раз-рывъ промежности 2-й сте-пени.	Помощни-ца — акушер-ка.
»	С Евфросинія ко мѣщанка. № 140.	23	Тоже.	II рож.	Восьмимѣсячная бере-менность; отеки ногъ. Лѣ-карственное лѣченіе.	
Май.	М Надежда ко духовн. зван. № 141.	25	Тоже.	I рож.	Преждевременные роды на 8-мъ мѣсяцѣ; родился живой младенець. Ходъ ро-довъ нормальный.	
»	Д Варвара ва крестьянка. № 142.	26	Д. Горца Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Мясистый заносъ (3 мѣ-сяца), гангреницирующій; кровоточить 2 1/2 недѣли. Удаленъ пальцемъ изъ матки. Однократное сприн-цованіе матки аq. sublimata (1 : 2000).	В ыздоров-леніе. А м б у л а-торно.
»	Р Наталія скал мѣщанка. № 143.	29	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Срочные роды; умѣренно плоско - суженный тазъ. <i>Высокіе пробные щипцы 2 раза</i> (около 20 трак. въ 2 приема), потомъ про-боденіе головки живаго плода и извлеченіе ея тупымъ акушерскимъ крюч-комъ, введеннымъ въ по-лость черепа. Младенець крупныхъ размѣровъ, осо-бенно головка его. Послѣдъ выжать.	В ыздоров-леніе безъ по-вышенн ой температуры, помогала аку-шерка; безъ х л о р оформ-наго наркоза.

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе
Май.	Лія П . . . ская евр. мѣщ. № 141.	33	Изъ г. Чернигова (временно въ г. Березнѣ Черн. уѣзда).	Много-рожен.	Не полный выкидышъ на 2 мѣсяцѣ беременности: остатки яйца удалены отчасти пальцемъ, отчасти выскабливаніемъ острой ложкой.	Въ больницѣ. Въ здоровленіе. Безъ хлороформнаго наркоза.
»	Александра Д ко мѣщанка. № 145.	25	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	II рож.	Четырехмѣсячная беременность. Хроническое малокровіе.	Определеніе срока беременности по желанію самой беременной.
»	Дарія К ко крестьянка. № 146.	32	Тоже.	Много-рожен.	Не полный выкидышъ 2-хъ мѣсячный. На выскабливаніе не согласилась; лѣкарственное лѣченіе.	Затянувшееся выздоровленіе
»	Татьяна Б ко крестьянка № 147.	21	Тоже.	I рож.	Шестимѣсячная беременность; катарръ влагалища и вульвы (острый); лѣкарственное лѣченіе.	Доносила до срока.
»	Маша Р ичь евр. мѣщ. № 148.	24	Д. Рогозки Городниц. уѣзда.	II рож.	Срочные роды; ходъ родовъ правильный. Послѣдъ выжать не удалось. Разрывъ промежности 2-й степени.	
Іюнь.	Евфросинія Б ко Мѣщ. № 149.	34	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Срочные роды (затянувшаяся); наложеніе щипцовъ на низко-стоящую предлагающую головку мертваго ребенка. Послѣдъ вышелъ безъ выжиманія.	Помогала простая повязка безъ хлороформнаго наркоза.
Іюль.	Эйдля Р ичь евр. мѣщ. № 150.	30	Тоже.	Много-рожен.	Неполный 3-хъ мѣсячный выкидышъ. Выскабливаніе слизистой оболочки матки.	Выздоровленіе; въ больницѣ, безъ хлороформнаго наркоза.
»	Марѳа С о крестьянка № 151.	25	Д. Рогозки Городниц. уѣзда.	Много-рожен.	Восьмимѣсячная беременность: кровотеченіе изъ матки; лѣкарст. лѣченіе.	Доносила до срока.
»	Соня Д инь Евр. мѣщ. № 152.	25	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Четырехмѣсячная беременность.	Определеніе срока по просьбѣ самой беременной.

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНІЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Юль.	Песя П . . . ская Евр. мѣщ. № 153.	20	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	II рож.	Срочные роды двойнями; слабость и болѣзненность потугъ; плотныя плодныя оболочки прорваны пальцами. 1-я дѣвочка родилась безъ хирургическаго вмѣшательства, а 2-я извлечена за ножку въ асфиксіи; послѣдъ перваго младенца былъ приросшій и отдѣленъ рукой. Два послѣда и 2 отдѣльныхъ оболочки. Головное и ножное положеніе.	
»	Соня Ф . . . инъ Евр. мѣщ. № 154.	25	Тоже.	II рож.	Срочные роды, атонія матки; наложеніе щипцовъ на низкостоящую подлежащую головку; удаленіе рукой изъ матки приросшаго послѣда.	
Авг.	Парасковія А ва дворянка № 155.	25	Тоже.	II рож.	Срочные роды; нормально. Послѣдъ выжать по Credé.	
»	Марьяна Ч окъ крестьянка № 156.	19	С. Локнистое Черниговск уѣзда.	I рож.	Восьмимѣсячная беременность. Сифилисъ вторичный. Лѣкарственное лѣченіе.	
»	Маріи С ая крестьянка № 157.	26	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Срочные роды, атонія матки; значительно плоско сжуженный тазъ; поворотъ на ножки и извлеченіе за обѣ ножки; перфорация головки послѣдующей (мертваго плода). Младенецъ (особенно головка) слишкомъ большихъ размѣровъ; послѣдъ выжать по Credé.	Большая умерла черезъ 3 дня послѣ родовъ. Причина смерти точно не опредѣлена (вѣроятно перитонитъ). Температура повышена. Помогала акушерка при извлеченіи. Выздоровленіе съ повышенной температурой. Брюхо младенца вдвое больше головки.
»	Макрина III ко крестьянка № 158.	23	Тоже.	Много-рожен.	Срочные роды; по рожденіи головки, ручекъ и плечиковъ, осталъная часть младенца произвольно (сокращеніями матки) не изгонялась и пришлось подъ хлороформнымъ наркозомъ извлечь съ большимъ трудомъ весь плодъ. У младенца была брюшная водянка и лѣвосторонняя паховая грыжа. Разрывъ промежности 3-й степени не полный. Развилась эндометритъ.	

Годъ и мѣсяць.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПІЯ.	Примѣчаніе.
Сент.	Марьяся Н ва Евр. мѣщ. № 159.	25	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много-рожен.	Срочные роды, — нормально. Послѣдъ выжать по Credé. Плоскій тазъ.	
Окт.	Х. Х. К ва крестыанка № 160.	25	Тоже.	I рож.	Срочные роды; воды прошли за сутки до пріѣзда врача. Атонія матки. Кожка на теменн головкн по направленію стрѣловиднаго шва до самыхъ костей черепа разорвана и края раны покрыты сѣроватымъ налетомъ; промежность разорвана до родовъ и рана покрыта грязнымъ налетомъ (всѣ манипуляціи бабокъ). Наложены щипцы. Послѣдъ выжать по Credé; однократное промываніе матки 4% растворомъ карболовой кислоты. Извлечена мертвая дѣвочка; плодныя оболочки въ періодѣ гніенія. Гнойный эндометритъ, воды издають запахъ сѣроводорода.	Помогала акушерка. Выздоровленіе съ повышенной температурой.
Нояб.	Валентина П да дворянка № 161.	44	Тоже.	Много-рожен.	Неполный выкидышь 6 недѣльный; остатки яйца удалены отчасти пальцемъ, а потомъ высклабиваніемъ острой ложкой.	На дому; помощница акушерка; безъ хлороформнаго наркоза. Выздоровленіе.
»	Геня К ская Евр. мѣщ. № 162.	29	Тоже.	Много-рожен.	Неполный выкидышь 2-хъ недѣля; кровотеченіе 2 недѣля; выслаблнваніе острой ложкой слизистой оболочки матки.	Выздоровленіе безъ повышенія температуры; больничное лѣченіе.
»	Фрейда Ф ва Евр. мѣщ. № 163.	35	Тоже.	Много-рожен.	Срочные затянувшіеся роды. Умѣренно - плоско суженный тазъ. Слабость потугъ. Наложеніе щипцовъ на подлежащую низкостоящую головку; младенецъ родился въ асфиксіи и оживленъ. Потуги болѣзненны.	

Годъ и мѣсяцъ.	Имя и сословіе.	Лѣта.	Мѣсто жительства.	Который разъ роды.	ТЕЧЕНИЕ РОДОВЪ И ИХЪ ТЕРАПИЯ.	Примѣчаніе.
Нояб.	Блюма К. . . . ичь Евр. мѣщ. № 164.	35	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Срочные роды двойнями; порокъ сердца и отвисшей животъ; ходъ родовъ нормальный; 2 дѣтскихъ мѣста и отдѣльные плодныя оболочки. Оба головныя положенія.	
»	Бася М. . . . ичь Евр. мѣщ. № 165.	4)	Низковка Сосницк. уѣзда.	Много- рожен.	Начинающійся (угрожающій) выкидышъ 3-хъ мѣсяцевъ (въ періодъ выдо- рвления отъ брюшнаго тифа). Лѣкарственное лѣченіе (<i>Viburnum prunifolii</i>) и лежаніе на спинѣ.	Кровотеченіе прекратилось и яйцо удержалось въ полости матки. Амбулаторно.
Декаб.	Анастасія К. . . . ва крестьянка № 166.	19	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	I рож.	Срочные роды, нормально; сильный отекъ дѣтородныхъ губъ до окончанія родовъ; пуповина 1 ^{1/2} четверти аршина длины.	
»	Сима З. . . . ва Евр. мѣщ. № 167.	23	С. Кучнновк. Городницк. уѣзда.	I рож.	Угрожающій выкидышъ 3-хъ мѣсячный, кровоточить и боли въ поясницѣ. Внутрь <i>Viburnum prunifolium</i> и лежаніе на спинѣ.	Амбулаторно. Пеходъ неизвѣстенъ.
»	Вѣра Б. . . . ая Духов. зван. № 168.	37	Г. Березна Черниговск. уѣзда.	I рож.	Срочные роды; нормально. Разрывъ промежности 2-й степени. Наложено 6 шелковыхъ швовъ; <i>prima intentio</i> .	
»	Х. Х. Ф. . . . ва Евр. мѣщ. № 169.	18	Тоже.	I рож.	Выкидышъ на 5 мѣсяцѣ; кровотеченіе изъ матки, острая анемія; зловонныя выдѣленія изъ матки. <i>Col-lapsus</i> . Внутрь <i>secale Cornutum</i> и <i>T-ra Moschii</i> .	Врачъ приглашенъ въ періодъ поднаго угасанія жизни больной. Смерть отъ остр. малокровія.
»	Марія Р. . . . ва крестьянка № 170.	43	Х. Мышевъ Черниговск. уѣзда.	Много- рожен.	Срочные роды; слабость потугъ; плодныя оболочки очень плотны и прорѣзаны ножницами; наложеніе щипцовъ на предлежащую низкостоящую головку. Пуповина обвита 1 разъ вокругъ шеи плода; младенецъ родился въ легкой асфиксіи и оживленъ. Удаленіе изъ матки рукой частично-приросшаго дѣтскаго мѣста. Длина пуповины—1 аршинъ.	