

15. Проф. П. И. Ковалевскій. *Послѣродовые психозы.* (Русская Медицина, 1894 г., №№ 7, 9, 10).

Руководствуясь взглядами различныхъ авторовъ, авторъ статьи старается систематизировать различные этиологическіе моменты, какъ предрасполагающіе къ послѣродовымъ психозамъ, такъ и производящіе послѣдніе. Первое мѣсто среди причинъ занимаетъ наслѣдственность,—причина предрасполагающая. Между предрасполагающими и производящими причинами, какъ нѣчто переходное, лежатъ душевныя волненія и нравственныя потрясенія. Наконецъ, среди вызывающихъ причинъ надо указать инфекцію и послѣродовыя болѣзни половыхъ органовъ (особенно часто *subinvolutio uteri*), а также автоинтоксикацію (напр. эклампсія, остеомалация). Перворождающія въ 2 раза чаще заболѣваютъ, чѣмъ многорожавшія. Статистика разныхъ лицъ и собственныя наблюденія автора даютъ поводъ признать за маніей и аменціей преобладающія мѣста въ ряду формъ послѣродовыхъ психозовъ. Помимо этихъ и другихъ, затяжныхъ формъ душевнаго разстройства, встрѣчаются еще острые, быстро преходящіе психозы. Наблюдаются, хотя очень рѣдко, случаи эпилептического помѣшательства, напр., случай дѣтоубійства, описанный *Добровольскимъ* (Арх. Психіатріи, 1893, 6). Въ значительномъ большинствѣ случаевъ послѣродовые психозы развиваются въ теченіе первыхъ двухъ недѣль послѣ родовъ. Въ *послѣднія* недѣли послѣродоваго періода предпочтительно развиваются такъ называемые психозы вырожденія (паранойя, истеричное помѣшательство). Психозы вырожденія даютъ худшее предсказаніе. Такое же предсказаніе даютъ психозы вообще у *многорожавшихъ*. Въ заключеніе авторъ описываетъ два случая послѣродовой аменціи: 1) Еврейка, 30 лѣтъ, съ психопатической наслѣдственностью; заболѣла на 6-й недѣлѣ послѣ четвертыхъ родовъ, вслѣдъ за случайнымъ нравственнымъ потрясеніемъ. Роды были довольно трудные, длились 12 часовъ и сопровождались значительной потерей крови. Черезъ 5 мѣсяцевъ выписалась вполне здоровой. 2) Женщина 20 лѣтъ, изъ семьи пьяницъ; заболѣла на 5-й день послѣ первыхъ родовъ (роды были трудные и сопровождались значительной потерей крови). Во время беременности бывали приступы тоски. Черезъ 3 мѣсяца больная выписалась почти совсѣмъ здоровой.

*Н. Какушкинъ.*