

16. Проф. П. И. Ковалевскій. Менструальное состояніе и менструальные психоза. (Архивъ Психіатріи и пр., 1894 г., № 1).

Авторъ прежде всего кратко рассматриваетъ вліяніе первыхъ менструацій и установившихся кровей на организмъ нервно здоровой женщины, замѣчая, что „менструальный періодъ здоровой женщины не есть болѣзнь, но не есть и полное здоровье“. Менструація въ такихъ случаяхъ въ большей или меньшей степени нарушаетъ равновѣсіе нервной системы у женщины. Вліяніе менструаціи на организмъ женщины съ нервнымъ предрасположеніемъ болѣе сложно. Въ этихъ случаяхъ особенно рѣзко сказывается вліяніе появленія первыхъ менструацій, когда достаточно бываетъ иной разъ ничтожнаго момента только, чтобы у дѣвушки развилась эпилепсія, истерія, предсердечная тоска и проч. Бываетъ и наоборотъ: наступленіе мѣсячныхъ улучшаетъ ходъ имѣвшагося уже нервного страданія, напр., хореи. Болѣе слабо выражается вліяніе каждой менструаціи, когда уже мѣсячныя установились, при чемъ болѣзненные мѣсячныя (amenorrhoea, metrorrhagia) вліяютъ на нервное состояніе женщинъ болѣе рѣзко.

Обычно у нервно-предрасположенныхъ женщинъ менструальный періодъ вызываетъ или разнообразныя нервныя расстройства (мигрень, слезливость, подавленность духа, судороги и пр.) или душевныя расстройства. Въ свою очередь душевныя расстройства сопровождаются очень часто расстройствами въ мѣсячныхъ очищеніяхъ, при чемъ взаимной зависимости между этими расстройствами нѣтъ, а есть зависимость и тѣхъ и другихъ расстройствъ отъ одной общей причины. Авторъ описываетъ три случая психическихъ обостреній въ теченіе менструальнаго періода и одинъ случай менструальнаго психоза, т. е. душевнаго расстройства, вызваннаго собственно менструаціей. Можно поставить въ сторонѣ отъ всѣхъ этихъ расстройствъ расстройства въ нервной и душевной сферѣ женщинъ, вызываемыя климактерическимъ періодомъ. Въ интенсивности и въ характерѣ этихъ расстройствъ имѣетъ значеніе не только нервная предрасположенность, но и характеръ прожитой жизни, со стороны главнымъ образомъ половой дѣятельности. Такъ особенно рельефно выдѣляется климактерій у дѣвственницъ, или у женщинъ, ведшихъ усиленную половую жизнь. Установился особый терминъ „климактерическое помѣшательство“, обнимающій всю группу разнообразныхъ душевныхъ расстройствъ, сопутствующихъ климактерію (наичаще паранойя, съ характеромъ эротизма). Въ рѣдкихъ случаяхъ климактерій улучшаетъ теченіе душевной болѣзни. Вообще, климактерическое

помѣшательство даетъ наихудшее предсказаніе. Въ заключеніе авторъ говоритъ, что въ судебно-медицинскомъ отношеніи важно знать, не совершенно ли данное преступленіе во время менструацій. Если да, то это служитъ для обвиняемой смягчающимъ обстоятельствомъ, ибо „менструальное состояніе“, даже вполне нервно-здоровыхъ женщинъ, есть благопріятная почва для разныхъ вѣдѣній и вліяній.

Н. Какушкинъ.

17. В. О. Котелянскій. Къ діагностикѣ вѣматочной беременности въ раннихъ стадіяхъ. (Записки Уральского Медич. Общества. II годъ, второй выпускъ. Екатеринбургъ, 1893 года, стр. 62).

Случай 1-й. Замужняя, 26 лѣтъ. Родила однажды. Жалоба—кровотеченіе, начавшееся недѣлю спустя послѣ срочныхъ мѣсячныхъ и продолжающееся 26 дней. До этого времени менструація была правильна. Пять недѣль замѣчается въ лѣвой нижней части живота растущая опухоль. Отчасти пипеткой, отчасти острой ложкой изъ полости матки извлечена часть содержамаго, показавшаго присутствіе лохейоцитовъ и децидуальныхъ клѣтокъ. Подозрѣніе на вѣматочную беременность подтвердилось чревосѣченіемъ, причемъ цѣликомъ удаленъ мѣшокъ (воронка, фаллопиева труба, сальникъ, стѣнка яичника). Выздоровленіе.

Случай 2-й. Дѣв. 29 л., родила однажды. 2 недѣли назадъ началось кровотеченіе послѣ 6 недѣльной менопаузы. Въ нижней части живота разлитой выпотъ, противъ котораго было направлено лѣченіе. Затѣмъ пипеткой и Боземановскимъ катетеромъ извлечена часть содержамаго полости матки, въ которомъ оказались децидуальные клѣтки и бѣлыя кровяныя тѣльца въ двухъ видахъ: маленькихъ зернистыхъ и большихъ, содержащихъ 1—3 ядра. Подозрѣніе на вѣматочную беременность подтверждено чревосѣченіемъ; вылуценъ цѣликомъ мѣшокъ, образованный правой трубой и широкой связкой (плодъ 4,2 сѣм.). Выздоровленіе.

Случай 3-й. Проститутка 18 лѣтъ, нерожавшая. Боли внизу живота и сукровичное отдѣленіе послѣ мѣсячныхъ, кончившихся 4 дня назадъ. Въ содержимомъ матки, извлеченномъ корнцангомъ и пипеткой, найдены элементы, тождественные съ вышеописанными. Слѣва отъ матки опухоль съ гусиное яйцо, оказавшаяся мѣшетчатою со стѣнкой изъ трехъ слоевъ: въ среднемъ звѣдообразныя клѣтки. Въ полости мѣшка—гной. Мѣшокъ лежитъ въ складкѣ широкой связки и образованъ отчасти воронкой трубы. Онъ удаленъ. Выздоровленіе.