

помѣшательство даетъ наихудшее предсказаніе. Въ заключеніе авторъ говоритъ, что въ судебно-медицинскомъ отношеніи важно знать, не совершенно ли данное преступленіе во время менструацій. Если да, то это служитъ для обвиняемой смягчающимъ обстоятельствомъ, ибо „менструальное состояніе“, даже вполне нервно-здоровыхъ женщинъ, есть благопріятная почва для разныхъ вѣдѣній и вліяній.

Н. Какушкинъ.

17. В. О. Котелянскій. Къ діагностикѣ вѣматочной беременности въ раннихъ стадіяхъ. (Записки Уральского Медич. Общества. II годъ, второй выпускъ. Екатеринбургъ, 1893 года, стр. 62).

Случай 1-й. Замужняя, 26 лѣтъ. Родила однажды. Жалоба—кровотеченіе, начавшееся недѣлю спустя послѣ срочныхъ мѣсячныхъ и продолжающееся 26 дней. До этого времени менструація была правильна. Пять недѣль замѣчается въ лѣвой нижней части живота растущая опухоль. Отчасти пипеткой, отчасти острой ложкой изъ полости матки извлечена часть содержамаго, показавшаго присутствіе лохейоцитовъ и децидуальныхъ клѣтокъ. Подозрѣніе на вѣматочную беременность подтвердилось чревосѣченіемъ, причемъ цѣликомъ удаленъ мѣшокъ (воронка, фаллопиева труба, сальникъ, стѣнка яичника). Выздоровленіе.

Случай 2-й. Дѣв. 29 л., родила однажды. 2 недѣли назадъ началось кровотеченіе послѣ 6 недѣльной менопаузы. Въ нижней части живота разлитой выпотъ, противъ котораго было направлено лѣченіе. Затѣмъ пипеткой и Боземановскимъ катетеромъ извлечена часть содержамаго полости матки, въ которомъ оказались децидуальные клѣтки и бѣлыя кровяныя тѣльца въ двухъ видахъ: маленькихъ зернистыхъ и большихъ, содержащихъ 1—3 ядра. Подозрѣніе на вѣматочную беременность подтверждено чревосѣченіемъ; вылуценъ цѣликомъ мѣшокъ, образованный правой трубой и широкой связкой (плодъ 4,2 сѣм.). Выздоровленіе.

Случай 3-й. Проститутка 18 лѣтъ, нерожавшая. Боли внизу живота и сукровичное отдѣленіе послѣ мѣсячныхъ, кончившихся 4 дня назадъ. Въ содержимомъ матки, извлеченномъ корнцангомъ и пипеткой, найдены элементы, тождественные съ вышеописанными. Слѣва отъ матки опухоль съ гусиное яйцо, оказавшаяся мѣшетчатою со стѣнкой изъ трехъ слоевъ: въ среднемъ звѣдообразныя клѣтки. Въ полости мѣшка—гной. Мѣшокъ лежитъ въ складкѣ широкой связки и образованъ отчасти воронкой трубы. Онъ удаленъ. Выздоровленіе.

Случай 4-й. Замужняя, 38 лѣтъ, нерожавшая. Затянувшіяся мѣсячныя (1½ мѣсяца), пришедшія въ срокъ. Микроскопическое изслѣдованіе содержимаго матки съ вышеописаннымъ результатомъ. При чревосѣченіи изъ правой широкой связки извлечена часть мѣшка, содержавшаго въ оболочкахъ (микроскопъ) ворсинки и эмбриональную ткань. Авторъ придаетъ большое значеніе микроскопическому изслѣдованію содержимаго матки при рѣшеніи вопроса о вѣматочной беременности и отмѣчаетъ въ такихъ случаяхъ постоянное присутствіе, кромѣ децидуальныхъ клѣтокъ, большихъ зернистыхъ, съ 1—3 ядрами, клѣтокъ, встрѣчающихся также всегда въ послѣродовыхъ отдѣленіяхъ. *Н. Какушкинъ.*

18. В. М. Онуфріевъ. Медицинскій отчетъ Екатеринбургскаго Родильнаго Дома, съ 1 сентября 1887 года по 1 сентября 1891 г. (Записки Уральск. Мед. Общ., II годъ, второй вып., приложение).

Этотъ обширный отчетъ захватываетъ дѣятельность за отмѣченный періодъ и родильнаго собственно отдѣленія, и гинекологическаго. Судя по описанію, родильный домъ устроенъ образцово, и дѣятельность его очень обширна и оживленна. За все время въ родильномъ отдѣленіи перебувало 2890 женщинъ, въ томъ числѣ роженицъ 1730 (первородящихъ 31,9%). Нормальные роды составили 64,6%; двойней 2,08%; тройней 0,05%. Выкидышей 7,2%. Эклампсія—въ 0,98% всѣхъ родовъ. Разрывовъ промежности 8,2%. Наложеніе щипцовъ примѣнено одинъ разъ на каждые 50 родовъ. Перфорации въ 4 случаяхъ; кесарское сѣченіе въ одномъ (родильница умерла отъ перитонита). Вообще операціи дали 3,4% смертности. Здоровыхъ родильницъ было 80,9%. Послѣродовыхъ заболѣваній 10,5%; случайныхъ заболѣваній 7,3% (смертн. 0,5%). Смертность отъ септицеміи 0,35%. Въ гинекологическомъ отдѣленіи больныхъ было за эти 4 года 501, изъ которыхъ оперировано было 207 человекъ. Изъ большихъ операцій сдѣлано: вылушеній матки черезъ влагалище 17, міомотомій 11, изсѣченій придатковъ 33, операцій при вѣматочной беременности 2, чревосѣченій по другимъ поводамъ 11. Всѣхъ умершихъ послѣ операцій было 8,8%. Амбулаторію при родильномъ домѣ посѣтили 4407 женщины, сдѣлавшія 10834 посѣщенія. При родильномъ домѣ существуетъ повивальная школа. Въ заключеніе нельзя не сказать, что отчетъ этотъ заслуживаетъ, по богатству своего матеріала, вниманіе всякаго гинеколога.

Н. Какушкинъ.