

живаешь постоянное соприкосновение послѣдней съ антисептической жидкостью. Въ хроническихъ случаяхъ, благодаря обилію складокъ, такой способъ даетъ худшіе результаты; въ подобныхъ случаяхъ, по мнѣнію автора, умѣстно предварительное выскабливаніе.

28. **Etienne Rollet. Traitement de l'urethrite blennorragique chez la femme.** (Gaz. de gynécol., 15 Janv. 1894). **О лѣченіи бленнорройнаго уретрита женщины.**

Авторъ подвергаетъ краткому критическому обзору средства, примѣняемыя при лѣченіи уретрита у женщинъ. Говоря о спринцованіяхъ, авторъ обращаетъ вниманіе на то, что зонды, употребляемые съ этою цѣлью, имѣютъ важное неудобство: спринцованію подвергается не только уретра, но и мочевоы пузырь. Во избѣжаніе этого неудобства, авторъ устроилъ специальный металлическій зондъ и съ этою же цѣлью видоизмѣнилъ зондъ *Perrer'a* изъ краснаго каучука. Металлическій зондъ имѣетъ на концѣ коническое утолщеніе, которое закрываетъ собою входъ въ мочевоы пузырь; впереди утолщенія имѣется широкое отверстіе, черезъ которое производится спринцованіе уретры. Видоизмѣненіе зонда *Perrer'a* состоитъ въ томъ, что отверстія, находящіяся на конечной выпуклости, передвинуты впередъ на 25 мм.

Жаботинскій.

29. **Lugeol. Noeud du cordon.** (Société de Gynécologie, d'Obstétrique et de Paediatrie de Bordeaux, Séance du 11 Juillet 1893 Gaz. hebdom. des Sciences Médicales de Bordeaux, № 1, 1894). **Узелъ пуповины.**

Авторъ сообщаетъ слѣдующій случай изъ своей практики:

На 7-мъ мѣсяцѣ беременности родился мертвый плодъ съ пуповиной стянутой узломъ. Судя по виду плода, моментъ его смерти могъ наступить дней десять тому назадъ, что, къ тому же, подтверждалось и анамнестическими данными: дѣйствительно, около этого времени мать перестала ощущать движенія плода. Къ этому же времени относится и сильный испугъ, который она испытала при видѣ пожара въ сосѣднемъ съ ея квартирой домѣ.

Беременность протекала вообще ненормально: въ послѣдніе мѣсяцы бывали частыя рвоты (иногда съ кровью), беременная жаловалась на боль и лихорадила.

Роды были очень легкіе и прошли быстро, отдѣленіе послѣда нормально; появившееся съ началомъ потугъ кровотеченіе прекратилось само собою.