

Онъ отрицаетъ также мнѣніе *Krönig*'а, что кислотность влагалища обуславливается нормально кислымъ отдѣленіемъ влагалища, констатированнаго, будто, имъ у новорожденныхъ. Секретъ послѣднихъ, по D., очень слабо-кислый, обусловленъ присутствіемъ CO_2 .

Отмѣчая неточности въ опредѣленіи патологическаго и нормальнаго секрета, D. особенно подчеркиваетъ могущую ввести въ заблужденіе почти постоянную стерильность влагалищнаго секрета, полученнаго *Krönig*'омъ. Это очевидно зависѣло отъ примѣненныхъ питательныхъ средъ, такъ какъ во влагалищѣ беременных масса палочекъ.

Имѣющій большое практическое значеніе выводъ *Krönig*'а, что *streptococcus pyogenes* никогда не наблюдался имъ въ вагинѣ беременных, D. считаетъ также недостаточно обоснованнымъ.

(Прибавлю, что изслѣдованіи референта почти по всѣмъ пунктамъ тождественны съ взглядами *Döderlein*'а). *В. Строгановъ.*

41. *Woerz. Eine Missbildung mit Amniosnabel, Ektopie der Blase, Symphysenspalt und Spina bifida. (Centralblatt für Gynäkologie, № I, 1894). Порочное развитіе съ амниотическимъ пупкомъ, эктопіей мочевого пузыря, расщепленіемъ симфизы и spina bifida.*

Въ клиникѣ проф. *Schaut*'ы здоровая женщина, имѣвшая уже 2-хъ здоровыхъ дѣтей, родила 8-ми мѣсячнаго мальчика съ слѣдующими пороками развитія. Внизу живота замѣчался, прежде всего, амниотическій пупокъ, величиною съ голубиное яйцо; черезъ тонкую оболочку пупка можно было ясно видѣть кишечную петлю. Снизу непосредственно примыкала эктропированная складчатая слизистая оболочка пузыря. На верхушкѣ одной изъ складокъ, справа, замѣчалось маленькое отверстіе мочеточника. По срединѣ мочевого пузыря воронкообразно углублялся и тамъ находилось отверстіе, откуда выдѣлялся меконіумъ. Въ срединѣ нижней окружности пузыря находился рудиментъ penis'а. Мошонка была расщеплена и покрыта нормальной кожей. Содержимаго въ ней точно констатировать не удалось. Заднепроходнаго отверстія не было.

На спинѣ ребенка, почти по средней линіи, находилась опухоль съ гусиное яйцо, съ ясной флюктуацией. Лонныя кости не были соединены. Размѣры таза новорожденнаго, при вѣсѣ въ 2520 гр. и длинѣ 47 сант., слѣдующіе:

D. sp. 8,6; D. cr. 8,4; D. tr. 9,2;

обыкновенно же у дѣтей подобнаго возраста:

D. sp. 7,2; D. cr. 7,6; D. tr. 8,5.

В. Строгановъ.