

roma uteri submucosum, subserosum et interstitiale. Содержимое лѣвой трубы, гнойнаго характера съ запахомъ, проникло въ полость брюшины чрезъ образовавшееся отверстие и вызвало смертельный перитонитъ. Фиброзные узлы по величинѣ своей были отъ горошины до каштана. Авт. видитъ въ фиброзныхъ узлахъ причину скопленій въ трубахъ и—въ оперативномъ вмѣшателствѣ, свасительное мѣропріятіе при pyosalpinx'ахъ. *Замининъ.*

49. **R. Müller und W. von Noerden. Theilweise Symphyseotomie statt Kaiserschnitt.** (Berliner klinische Wochenschrift, 1893, № 48). **Частичная симфизеотомія вмѣсто кесарскаго сѣченія.**

Авторъ приводитъ свой случай симфизеотоміи, который представляетъ интересъ, во первыхъ, потому, что дѣло ограничилось только разрывомъ lig. arcuati sup. и верхней  $\frac{1}{2}$  симфизы, во вторыхъ, потому, что операція произведена въ частной квартирѣ. Анамнезъ больной слѣдующій: 1-я беременность окончилась краніотоміей, 2-я—тоже, при чемъ произошелъ разрывъ промежности 3-й степени, (черезъ 3 мѣсяца—регинеопластика), 3-я—искусственные преждевременные роды въ началѣ 8-го мѣсяца; смерть плода; 4-я—тоже; 5-я—послѣдняя беременность—искусственные преждевременныя роды въ концѣ 32-й недѣли.

Не смотря на сильныя боли, головка не вставляется. Пробныя щипцы—безъ успѣха. Въ виду чрезвычайной чувствительности матки и ухудшенія сердцебіенія плода,—приступлено къ симфизеотоміи. Послѣ разрыва lig. arcuati sup. и  $\frac{1}{2}$  симфизы, подъ вліяніемъ сильныхъ болей, головка вступила въ тазъ и, безъ дальнѣйшаго увеличенія разрыва, извлечена щипцами. Младенецъ въ глубокой асфиксіи—не оживленъ. Послѣоперационное теченіе съ повышенной температурой, эндометритомъ и частичнымъ омертвѣніемъ маточной ткани, послѣдствіемъ чего—образованіе влажно-пузырнаго свища, впоследствии зашитаго. *Замининъ.*

50. **M. Treumann. Ueber Submucöse Myome.** (St.-Petersburg. med. Wochenschr., 1894 г., № 2). **О подслизистыхъ міомахъ.**

Послѣ краткаго очерка анатоміи и способовъ лѣченія подслизистыхъ міомъ авторъ описываетъ свои восемь случаевъ: 2 маточныхъ полиповъ, 5—шейныхъ міомъ и 1 подсывороточной міомы, случайно распознанной при чревосѣченіи. При лѣченіи примѣнялись обычные способы, при чемъ 2 раза пришлось прибѣгнуть къ акушерскимъ щипцамъ для извлеченія большихъ опухолей.

*Н. Какушкинъ.*