

53. Dührssen. Ueber Tubarschwangerschaft und die Behandlung der Blutungen in die Banchhöhle infolge von Tubarschwangerschaft. (Deutsche med. Wochenschrift., 1894 г., № 2 и 3). О трубной беременности и лечении кровотечений в брюшную полость при трубной беременности.

Авторъ настаиваетъ на необходимости чревосѣченія при всякомъ случаѣ внутрибрюшнаго кровотечения при трубной беременности. Въ случаяхъ, симулирующихъ кровоизліянія изъ трубы (напр. кровоизліянія въ полости кишекъ и желудка) разрѣзъ брюшныхъ стѣнокъ до брюшины даетъ возможность констатировать или исключить свободную кровь въ брюшной полости, благодаря просвѣчиванію брюшины. Чревосѣченія умѣстны и при замочной кровавой опухоли, ибо послѣдняя, разрываясь, даетъ часто вторичныя весьма опасныя кровотечения. Чревосѣченія во всѣхъ подобныхъ случаяхъ слѣдуетъ дѣлать тамъ, гдѣ больная находится въ моментъ кровоизліянія, конечно, при соответствующей обстановкѣ. На основаніи личнаго опыта, между прочимъ, въ двухъ случаяхъ, описанныхъ въ этой статьѣ, авторъ горячо рекомендуетъ примѣненіе предложеннаго Wyder'омъ (Arch. f. Gynäk., Bd. 41, H. 1 и 2) выпрыскиванія солянаго раствора до операции (по автору, въ клѣтчатку межлопаточной области, въ количествѣ около 1 литра). Такое выпрыскиваніе, примѣненное авторомъ въ одномъ случаѣ (описаннаго въ статьѣ) послѣ операціи, не привело ни къ чему, и больная погибла, по мнѣнію автора, благодаря вліянію хлороформа на обезкровленный организмъ. Въ 2-хъ остальныхъ (изъ описанныхъ пяти) имѣются особенности: въ одномъ изъ нихъ былъ трубный абортъ съ кровоизліяніемъ въ брюшную полость, въ другомъ были обильныя кровотечения изъ матки, распознана ошибочно міома; чрезъ влагалище вылучена матка, беременная разорванная труба и мѣшокъ haemato-celis. Заболѣваніе слизистой трубы (перелой) авторомъ отмѣчается, какъ важный этиологическій моментъ въ развитіи трубной беременности. Въ противоположность Hecker'у (Monatschrift. f. Geburtshilfe, Bd. 13), въ одномъ случаѣ автора, трубная беременность развилась скоро послѣ нормальныхъ родовъ. Причину разрыва трубы авторъ въ одномъ случаѣ видитъ въ проростаніи трубныхъ стѣнокъ ворсинками хоріона, въ другихъ—въ кровоизліяніяхъ въ плодномъ яйцѣ съ растяженіемъ стѣнокъ трубы. Н. Какушкинъ.