

57. P. Zweifel. Eine neue Vereinfachung der Stumpfbehandlung bei der Myomektomie. (Centralbl. f. Gynäk., 1894 г., № 14, с. 321). **Новое упрощение способа ухода за ножкой при миомэтомии.**

Послѣ обычной перевязки широкихъ связокъ съ передней поверхности опухоли, геср. матки, отсекаруется брюшинный лоскутъ, основаніемъ книзу, величиной соответственно толщинѣ шейки, и у основанія лоскута сквозь толщу шейки проводятся сагитально и фронтально катгутовые лигатуры, при затягиваніи которыхъ шейка дѣлится на 3—4 перевязанныхъ участка. Затѣмъ матка надъ перевязанными лигатурами отрѣзается и культи покрывается обычнымъ путемъ заранѣ образованнымъ брюшиннымъ лоскутомъ. Питаніе въ перевязанномъ отрѣзкѣ матки скоро, какъ показало изслѣдованіе автора одного случая, окончившаго смертью, восстанавливается. По этому способу авторъ сдѣлалъ 43 операции съ однимъ смертнымъ случаемъ (отъ заворота кишекъ). Всего авторомъ произведено 92 миомогистерэктоми и 2 миомотомии съ 3 смертными исходами (3,2%). Авторъ обращаетъ вниманіе на слѣдующую статистику, взятую у *Spinelli*. 775 операций миомэктоми, сдѣланныхъ различными авторами по старому способу, данному *Schröder*'омъ и *Hofmeier*'омъ, имѣли 25,6% умершихъ; способъ съ эластическимъ жгутомъ (127 случаевъ) далъ 24% смертности; изъ 86 же оперированныхъ безъ жгута съ брюшиннымъ закрытіемъ культи умерло всего 5,2%.

Н. Какушкинъ.

58. Brohl. Eine Hernia Uteri bei Pseudohermaphroditismus femininus. (Deutsche med. Wochenschr., 1894 г., № 15, с. 338). **Маточная грыжа при ложномъ женскомъ двунастіи.**

Субъектъ 36 лѣтъ, съ бородой и мужскимъ голосомъ, съ длинными волосами и женскою грудью *правильно менструирующій*, имѣетъ penis, хорошо развитой (длиной въ 6,5 снтм., во время эрекции 11 снтм.), подъ которымъ находится отверстие мочеиспускательнаго канала, а затѣмъ далѣе кзади входъ во влагалище съ дѣвственной плеерой. Малыя губы плохо развиты, большія достаточно. Въ толщѣ лѣвой большой губы грыжевая опухоль съ маткой и яичникомъ, выпавшая недавно и не поддававшаяся вправленію. Она причиняетъ больной сильныя боли. Подъ наркозомъ тѣло матки (двурогая, съ правильно развитыми яичниками и трубами) отрѣзано отъ шейки и культи вшита въ паховое кольцо. При этомъ тщательнымъ изслѣдованіемъ констатировано присутствіе у больной яичекъ, сѣменныхъ пузырьковъ и простаты.

Н. Какушкинъ.