

РЕФЕРАТЫ.

Обзоръ русской акушерско-гинекологической литературы.

100. Г. А. Соловьевъ. Къ вопросу о маляріи при беременности и послѣ родовъ. (Врачебныя Записки, 1894, № 5).

По наблюденіямъ автора, приступы малярійной лихорадки сопровождаются схваткообразными маточными болями, въ запущенныхъ же случаяхъ приостанавливаются также движенія плода. Врачами, практикующими въ малярійныхъ мѣстностяхъ, констатируется до 60% преждевременнаго прерыванія беременности подъ вліяніемъ маляріи, при чемъ беременность прекращается легче въ поздніе сроки, чѣмъ въ ранніе, т. е. чаще происходятъ преждевременные роды, чѣмъ выкидыши. Хининъ, хотя и вызываетъ маточныя сокращенія, но самъ по себѣ вызвать преждевременныхъ родовъ не можетъ,—данный-же соответственнымъ образомъ съ цѣлью предупредить лихорадочный приступъ, можетъ предотвратить преждевременные роды. Плодъ *sub malaria* или умираетъ, или же, родившись живымъ, носитъ слѣды малярійнаго худосочія (увеличеніе селезенки, пигментация и т. д.) и вскорѣ погибаетъ. In *puerperio* малярія сказывается задержкой въ обратномъ развитіи матки и убылью или полной потерей молока. Что касается дифференціального діагноза, то явленія маляріи во время беременности и въ послѣродовомъ періодѣ можно смѣшать съ явленіями пизлита или пизміи.

Въ заключеніе авторъ приводитъ три случая маляріи изъ собственной практики (2 случая во время беременности и 1 случай въ послѣродовомъ періодѣ), гдѣ хининъ и мышьякъ дали благоприятные результаты.

Н. Рачинскій.