

менѣ практичны. Въ весьма рѣдкихъ случаяхъ фиксированнаго перегиба кзади приходится производить *кастрацію* или полную *экстирпацию матки*. (Къ ортопедическому и оперативнымъ способамъ лѣченія слѣдуетъ прибавить еще *гимнастическій* способъ—укрѣпленіе мышечно-связаннаго аппарата матки по *Thure Brandt* у помощью такъ называемаго *подниманія матки* съ цѣлью укрѣпленія крестцово-маточныхъ и круглыхъ связокъ. *Примѣч. рефер*).

*Н. Рачинскій.*

105. **М. П. Яковлевъ. Второй случай операціи Рого при разрывѣ матки во время родовъ.** (Проток. Тамб. Мед. Общ., 1893 г., № 5—12, с. 175).

5—рага, 25 лѣтъ, (размѣры таза: 18, 22, 26). Срочные роды начались болѣе сутокъ назадъ; нѣсколько часовъ назадъ потуги сразу прекратились, причемъ выступили рѣзко явленія упадка силъ. Констатированъ разрывъ матки съ выходомъ плода въ брюшную полость. Чревосѣченіе показало, что головка плода была въ маткѣ. Разрывъ въ ниже-переднемъ отдѣлѣ матки. Матка удалена послѣ наложенія жгута. Культи перевязана въ два пучка и шита въ нижній уголъ брюшной раны; art. spermaticae et uterinae перевязаны отдѣльно. Смерть. Вскрытіемъ выяснено, что перет нутой жгутомъ оказалась задняя периферія шейки, противъ разорваннаго мѣста. Разрывомъ полость шейки сообщается съ брюшной полостью. Свободная кровь въ брюшной полости. Полнокровіе внутреннихъ органовъ. Дряблость селезенки и мутность печени и почекъ.

*Н. Какушкинъ.*

106. **С. К. Оленинъ. Hysteropexia abdominalis anterior при полномъ выпаденіи матки.** (Проток. Тамбовск. Мед. Общ., 1893 г., № 5—12, с. 179).

Два случая: 1) Крестьянка 30 л., родила 3 раза, послѣ послѣднихъ родовъ (4 года назадъ) лихорадила, съ того времени больна: полное выпаденіе матки съ выворотомъ влагалища; промежность цѣла. Три швами матка фиксирована въ нижнемъ углу раны (брюшной). Черезъ 1/2 года выпаденія не было. 2) Мѣщанка 30 л., многорожавшая; давно ли имѣетъ выпаденіе матки (полное, какъ и въ первомъ случаѣ), неизвѣстно. Безъ успѣха примѣнены были colporrhineo-graphia и lifting. Сдѣлана hysteropexia. Въ послѣоперационное время—грыжа бѣлой линии, при операціи которой, чрезъ 4 1/2 мѣсяца, констатировано „солидное“ срощеніе передней поверхности матки съ брюшной стѣнкой.

*Н. Какушкинъ.*