59. Roettinger. Hyperemesis gravidarum. (Aertzliche Rundschau, 1894 г., № 11, стр. 163). Чрезмёрная рвота беременныхъ.

Говоря вообще объ этомъ заболъвании, авторъ подробно описываетъ свой случай, касающійся второбеременной 32 льтъ. забольвшей рвотой на третьемъ мьсяць беременности. Изъ мьстныхъ патологическихъ явленій у больной были найдены только эрозіи шейки матки, которыя были легко излічены. Рвота, несмотря на примъненіе многихъ средствъ, продолжалась и втеченіе трехъ м'всяцевъ крайне истощила больную. Больная (нервная женщина, съ нервною, психопатическою наслъдственностью) начала жаловаться на сокращенія кишекъ и желудка въ обратномъ направленіи (rückwärts). Тогда авторъ, давъ больной опійной настойки, внушилъ ей, что у нея ощущенія обратнаго движенія кишекъ и желудка и рвота прекратятся. Рвота прекратилась безвозвратно, и беременность обончилась впоследствии правильно двумя доношенными мальчиками. Сопоставляя свой случай съ наблюденіями С. Хазана (Cntrlbl. f. Gynäk., 1887 г.), Kaltenbach'a, Muret (Deutsche med. Wochenschr., 1893 г.) и друг., авторъ приходить къ заключенію, что чрезмірная рвота беременных весть психоневрозъ, развивающійся на соотвѣтствующей почвѣ (у женщинъ съ извъстнымъ предрасположениемъ) подъ вліяниемъ различныхъ соматическихъ причинъ: иск ивленій матки, растяженій ея полости, желулочно-кишечныхъ разстройствъ и проч.

Н. Какушкинь.

60. Konikow. Zur Lehre von der Entwickelung des Beckens und seiner geschlechtlichen Differenzirung. (Archiv für Gynaekologie, Bd. XLV, Hft. 1). Къ ученію о развитіи таза и его дифференцировки въ зависимости отъ пола.

Авторъ дѣлаетъ первую попытку не умозрительнымъ, а эмпирическимъ путемъ разрѣшить спорный вопросъ о томъ, какіе моменты обусловливаютъ собою форму костнаго таза. Произведенныя имъ съ этою цѣлью систематическія наружныя измѣренія таза у 120 индивидуумовъ обоего пола и всѣхъ возрастовъ отъ одного года до двадцати лѣтъ, привели къ слѣдующимъ результатамъ. На развитіе формы таза всегда вліяютъ одновременно нѣсколько факторовъ, степень дѣйствія которыхъ однако не всегда одинакова, такъ что въ каждомъ данномъ возрастѣ удается уловить преобладающее вліяніе одного изъ нихъ. Такъ, впродолженіи перваго года жизни, когда о дѣйствіи тяжести тѣла еще нѣтъ рѣчи, ростъ костнаго таза происходитъ исключительно въ силу