

то родоразрѣшеніе должно имѣть мѣсто *per vias naturales* помощію наложенія щипцовъ или посредствомъ перфорациі. б) Если плодъ головою или же цѣликомъ попалъ въ брюшную полость, то необходимо немедленно приступить къ лапоротоміи и, по удаленіи плода черезъ брюшные стѣнки, соединить края разрыва швомъ. в) Даже послѣ родоразрѣшенія *per vias naturales* полезно сдѣлать лапоротомію и соединить края разрыва швомъ; только при неблагопріятныхъ для операціи условіяхъ слѣдуетъ прибѣгнуть къ дренажу, не произведя предварительно ирригаціи. г) При сильно разможенной маткѣ и наступленіи симптомовъ септического эндометрита слѣдуетъ предпочесть операцію *Porro*.

Хазанъ.

64. **Wehle. Die Walcher'sche Hängelage und ihre praktische Verwerthung bei geburtshülflichen Operationen.** (Archiv für Gynäkologie, Bd. XLV, Hft. 2). **Висячее положеніе Вальхера и его примѣненіе при акушерскихъ операціяхъ.**

Открытіе *Вальхера*, заключающееся въ томъ, что при висячемъ положеніи ногъ *conj. vera* у беременныхъ почти на цѣлый сантиметръ больше, чѣмъ при приведенныхъ къ животу колѣнахъ, нашло по автору блестящее практическое примѣненіе при операціяхъ, произведенныхъ въ Дрезденской акушерской клиникѣ, съ октября 1892 г. по іюнь 1893 г. За эти $\frac{3}{4}$ года увеличился какъ процентъ живорожденныхъ дѣтей, такъ и $\%$ произведенныхъ при узкомъ тазѣ поворотовъ въ ущербъ другимъ болѣе опаснымъ способамъ родоразрѣшенія. W. поэтому горячо рекомендуетъ пользованіе при акушерскихъ операціяхъ висячимъ положеніемъ и выражаетъ надежду, что мѣра эта существенно повліяетъ на ученіе о поворотѣ при узкомъ тазѣ.

Хазанъ.