

Изъ засѣданій Совѣта врачей Казанской губернской земской больницы 3 іюня 1894 г.

1) Д-ръ *И. М. Львовъ* показалъ 10 лѣтнюю дѣвочку, которой онъ 4 недѣли назадъ произвелъ *чревостыченіе по поводу туберкулезнаго перитонита*. Больная была переведена въ его отдѣленіе съ установленнымъ уже діагнозомъ. Дѣвочка была очень слаба, существовали отеки всего тѣла и значительный ascites; моча нормальна, легкія здоровы—бациллъ туберкулезныхъ не найдено въ мокротѣ, а равно и въ асцитической жидкости, которой за 3 недѣли передъ тѣмъ было вынуждено 1000 грамм. Жидкость эта была нейтральной реакціи, уд. в. 1020, желтовато-мутная, содержала бѣлые и красные кровяные шарики и эндотеліальныя клѣтки,—въ ней бациллъ также не найдено. У больной высокая температура и одновременно существуетъ хроническая малярія 3-хъ дневнаго типа съ сильно увеличенными печенью и селезенкой. Окружность живота наибольшая=84 ст., а на уровнѣ пупка=76 ст. до парацентеза живота. При операціи оказалось: значительно развитый слипчивый хроническій перитонитъ ниже colonis transversi, и выше его по отдѣленіи сращеній вся брюшина, покрывающая верхнюю и переднюю стѣнки colonis transvers, duodeni, ventriculi, частію восходящей толстой и нѣкоторыхъ тонкихъ кишекъ, усѣяна мелкими туберкулезными бугорками,—таковыхъ не было на печени и селезенкѣ. Операція состояла въ отдѣленіи сращеній между кишками и обильномъ—троекратномъ промываніи полости брюшины растворомъ 1 : 2000 з chloriodi съ послѣдующимъ зашиваніемъ на глухо полости живота.

Послѣоперационный періодъ безъ осложненій. Дѣвочка значительно окрѣпла,—водянки живота и отековъ нѣтъ. Общее состояніе здоровья вполне удовлетворительное.

2) Д-ръ П. Я. Тепловъ показалъ препаратъ $3\frac{1}{2}$ месячной трубной правосторонней беременности, полученный чревостыченіемъ, произведеннымъ д-ромъ И. М. Львовымъ у больной 27 лѣтъ. Диагностика заранѣе установлена была точно; беременность еще продолжалась. Больная эта ранѣе рожала 1 разъ,—послѣ родовъ не болѣла. За время беременности 3 раза были сильныя боли внизу живота, не подолгу, часовъ по 6—12, наступавшія сразу, безъ предвѣстниковъ, матка была увеличена согласно сроку въ 3— $3\frac{1}{2}$ мѣсяца. Операция безъ осложненій. Труба цѣлою полностью удалена послѣ предварительной перевязки сосудовъ. На препаратъ обращаютъ на себя вниманіе слѣдующіе факты: а) имѣются 3 отдѣльных разрыва стѣнки трубы безъ разрыва оболочекъ съ кровотеченіями въ полость задняго дугласа, отверстія не шире толщины гусиного пера; б) стѣнка трубы не толще тонкаго листа почтовой бумаги; в) къ маткѣ лежалъ послѣдъ и затѣмъ уже плодъ совершенно живой съ признаками жизни, но съ сильно измененной треугольной и конической головой отъ давленія на нее стѣнками трубы и ткани послѣда. Отпадающія оболочки вышли на 4-й день послѣ операціи цѣлыми, представляя полный снімокъ внутренней поверхности матки. Послѣоперационный періодъ безъ осложненій. Больная поправилась. *Ив. Львовъ.*