

РЕФЕРАТЫ.

Обзоръ акушерско-гинекологической литературы:

а) Русской.

65. В. П. Красноглазовъ. Къ этиологіи вагинита у проститутокъ. *Corpus alienum vaginae*. (Проток. Московск. Венерологич. и Дерматолог. Общ. Томъ II, стр. 77).

Въ заднемъ сводѣ влагалища у проститутки найдено резиновое кольцо, усаженное по наружному краю резиновыми-же зубчиками. По формѣ своей кольцо это болѣе всего похоже на шестерню въ системѣ зубчатыхъ колесъ. *Н. Какушкинъ.*

66. А. И. Лянцъ. Случай *molluscum fibrosum (cutis pendula)*. (Проток. Московск. Венеролог. и Дерматолог. Общ. Томъ II, стр. 12).

У крестьянки 19 лѣтъ, рожавшей, существуетъ около 3 лѣтъ опухоль, исходящая ножкой изъ нижняго отдѣла лѣвой большой губы. Она бугристая, дольчатая, съ мужской кулакъ. Длина ея 18 снтм., ширина 21 снтм. Чувствительность (кожная) опухоли весьма мала, доходящая до полной анестезіи въ нижнихъ отдѣлахъ. Опухоль удалена. *Н. Какушкинъ.*

67. А. Н. Бабаевъ. Электро-массажъ и упрощенный электродъ-перчатка. (Проток. И. Кавказскаго Мед. Общ. 1894 г., № 18, стр. 546).

Съ цѣлью совмѣстить дѣйствіе электричества и массажа авторъ надѣваетъ на руку сначала гуттаперчевую перчатку, а сверху обыкновенную нитяную, находящуюся въ сообщеніи съ металлическимъ браслетомъ, надѣваемымъ на обычное мѣсто. Браслетъ

соединяется проводникомъ съ электрической машиной. Такой электродъ-перчатка (стоющій 4 рубля) заслуживаетъ испытанія въ гинекологической практикѣ.

Н. Какушкинъ.

68. С. Н. Совѣтовъ. Матеріалы къ вопросу о скопчествѣ. (Измѣненія молочной железы при удаленіи соска). Диссертация. Сиб. 1894 г.

Къ сожалѣнію, эта диссертация слишкомъ мало даетъ матеріаловъ къ разъясненію вопроса, насколько удаленіе соска—дѣйствительно въ смыслъ оскотченія. Да и мѣстныя измѣненія железы при удаленіи соска прослѣжены и описаны далеко не всесторонне. На своихъ опытахъ съ 5 собаками и 1 кошкой авторъ получилъ и отмѣтилъ слѣдующія данныя: функція жлезъ *не всегда* нарушается при удаленіи *верхушки* соска (не болѣе $\frac{1}{2}$ высоты); если удаленъ сосокъ *при основаніи*, выводные протоки *всегда* заростають; въ основѣ молочной железы, при зарощеніи протоковъ, развивается медленно протекающій воспалительный процессъ, причемъ железистые элементы атрофируются и вся молочная железа уменьшается въ объемѣ. Такая железа можетъ служить удобной почвой для развитія ретенціонныхъ кистъ.

Н. Какушкинъ.

69. Проф. П. И. Ковалевскій. Душевное состояніе беременныхъ и психозы беременности. (Вѣстн. Общ. Гигіены, Суд. и Практ. Медицины. 1894 г., мартъ).

Послѣ литературно-историческаго очерка ученія о психозахъ во время беременности, родовъ и послѣродоваго періода, авторъ касается вопроса о частотѣ этихъ, такъ называемыхъ родильныхъ, психозовъ. На 161 роды здоровыхъ женщинъ приходится одинъ случай душевнаго заболѣванія. На 11 душевно-больныхъ приходится одинъ случай родильнаго психоза, наичаще послѣ родовъ и во время роды. Психозы во время беременности наиненѣе часты. Присутствіе въ половыхъ органахъ плоднаго яйца и механически, и рефлекторно и благодаря потребности въ питательныхъ веществахъ вызываетъ въ центральной нервной системѣ нѣкоторыя разстройства, главнымъ образомъ въ питаніи элементовъ; совмѣстно съ этимъ мысль о будущихъ родахъ и о ребенкѣ создаетъ особое душевное состояніе беременной, то угнетенное, то жизнерадостное; въ общемъ во время беременности получается напряженіе жизнедѣятельности всѣхъ системъ организма и нервная система ставится въ неустойчивыя условія существованія. Помимо общеизвѣстныхъ нервныхъ разстройствъ, во время бере-